



KONGL.
VETENSKAPS-
AKADEMIENS
HANDLINGAR,
FÖR ÅR 1845.



STOCKHOLM, 1847.
P. A. NORSTEDT & SÖNER,
Kongl. Boktryckare.

HANDLING

AKADEMISKE
VETENSKABER



STOMMEL 1012

**Om Indianstammarna i Plata- och
Oriental-Republikerna jemte beskrif-
ning och ritning af en till Sverige
hemförd individ af Pulches'-
stammen**

af

J. TARRAS.

Kongl. Svensk och Norsk General-Konsul i Montevideo.

Till Akademien inlemnad den 12 Mars 1845.

Tab. I, II.

Vid Plataflodens upptäckt af DON JUAN DIAS DE SOLIS, år 1512, beboddes de länder som gränsa till denna flod, af många olika Indianstammar. Floden kallades på infödingarnes språk Parana-Guazu, som betyder en flod lik hafvet. Samma namn hade den ända till norra delen af Paraguay, och utgjorde under ett namn de tre närvarande floderne Plata, Paraná och Paraguay. De historiska skrifter, hvilka jag haft tillfälle att se, beträffande upptäckten af Platafloden och dess kolonisering, lemna ej någon bestämd eller fullständig kännedom rörande de särskilta folkstammarna för denna trakt eller underrättelse om deras familjförhållanden och släktskap med hvarandra. Denna har ock troligtvis ej kunnat med säkerhet utredas, till följd af de beständiga krig, som jemt ägde rum emellan upptäckarna och ur-inväanarna, hvilka,

kanske annars sins emellan fiendtlige, med glömska af egna tvister, förenade sig emot den gemensamma fienden. Vid flera tillfällen ingingo dock åtskillige stammar förbund med Spaniorerna och stridde med dem emot andra Indianstammar med hvilka de kommit i delo. De förste Historieskrifvarne voro endast Missionärer eller Prester, och deras meddelanden rörde hufvudsakligen de framsteg som gjordes i religion och civilisation. Dessa meddelanden afsändes till moderlandet och hafva, med få undantag, ej blifvit offentliggjorde. De innehöllo vanligen endast strödda uppgifter om stammarne i ett och annat af de distrikter, som Missionärerna hade valt till fält för sin verksamhet. Då man betraktar tillika, att de öfrige underrättelserna bestodo i rapporter öfver krigshändelserna, aflemnade af befälhafvarne för trupper, hvilka jemt lågo i krig med infödingarne; att de måste lita på trovärdigheten af deras officerares och soldaters ut-sägor; att de fingo jemt flytta från ett ställe till ett annat, oroade af desse samma stammar, samt att de europeiska krigarne voro okunniga om landets geografi och invånarnes språk, hade sina blickar mest fästade på upptäckten af ädla metaller, samt nästan ständigt måste tänka på egen säkerhet, försvar och lifnäring, så återstod för dem ganska ringa tillfälle till historiska undersökningar rörande deras fienders genealogi och släktförvandtskap. Under sådana omständigheter är det ej underligt, om många misstag och många olika omdömen uppstått, och att underrättelserna äro stridande mot hvarandra. Nämde orsaker, förenade med oafbrutet fortfarande, hätska, till fullständigt utrotande ledande krig, hvilka fortsattes ända till 1832, hafva till stor skada för

framtida forskningar i den amerikanska ethnografien förstört de bästa källorna.

Skulle man emellertid, efter de strödda urkunder, som äro tillgänglige, uppgöra en ethnografisk tafla öfver dessa stammar, så blefve den dock alltid ofullständig, och på intet sätt tillförlitlig, såsom till en stor del byggd på gissningar. För det närvarande äro få af dessa amerikanska Spartaner qvar; hela stammar äro utrotade, och de flesta af de nu existerande äro mer eller mindre förändrade, så väl till karakter och utseende som lefnadssätt, dels genom deras underkufvande och förvandling ifrån fria menniskor till slafvar, och dels till följd af deras omvändelse till christendomen, samt deraf uppkomna förbindelser och umgänge med de inflyttade Europeerna. Endast få återstå således, och af dessa utgöra Pampas-Indianerna den enda kända nu existerande stam, som ej blifvit underkufvad eller till någon del civiliserad. I den såkallade "el grand Chaco" eller det skogbeväxta landet emellan Santa Fé och Paraguay, på vestra sidan af Paraná-floden, finnas dock enligt uppgift omkring 300 särskilda Indianstammar, hvilka anses vara öfverlevvor af de fordna ur-invånarne, som dit hafva tagit sin tillflykt. Äfven dessa vildar äro så godt som alldeles okände, då endast en och annan af dem någon gång vågar träda i gemenskap med de christne. En och annan Indian från el grand Chaco kommer till Assumpcion, hufvudstaden i Paraguay, men med denna stad har man ej på längre tid, tills helt nyligen, haft någon gemenskap; Indianerna sjelfve äro utom dess mycket inbundne. Ingen christen eller hvit, som vågat sig in i deras gebiet har, så vidt man vet, någonsin återkommit. Det enda man kun-

nat erfara af de Indianer som någon gång begifvit sig utom gebietet, är att nästan alla stammarne jemt ligga i ett oförsonligt krig med hvarandra, samt att landet skall innehålla stor rikedom så väl af ädla metaller som stenar, jemte en outtömlig rikedom på de dyrbaraste trädslag, medicinska örter, rötter och gummi-sorter.

De mest trovärdiga uppgifter gifva vid handen, att, vid upptäckten af Platafloden, stammarne kring denna flod kunde fördelas i tre nationer, nemligen: "Charruas" i söder, "Guaranis" i norr, samt "Araucanos" i sydvest.

I. Till Charruas-Indianerna höra, så vidt man vet, utom de egentliga Charruas, äfven Chayos och Chanas samt de mindre stammarne "Guenoas, Martidanes, Mboanes, Yaros, Minoanes, Caaiguas, Bajaez och Tapes.

Att en stor del af dessa, i synnerhet de sednast nämde, endast vore afskilda grenar af de större stammarne, kan man med temlig säkerhet påstå, och att de, då de vid sina afsöndringar flyttade till andra trakter samt kommo i beröring med för dem förut okände folkslag, så väl vänskapliga som fiendtliga, småningom kunnat förlora en del af hufvudstammens karakter och språk, är ej otroligt, ehuru bevisen ej äro fullt säkra. Af alla dessa stammar bebodde hufvudsakligen de tre första eller Charruas, Chayos och Chanas den nuvarande Uruguayska Republikens område; de öfrige uppehöll sig mera i det inre af landet.

"Charuas" innehade hela kusten ifrån nordöstliga sidan af Maldonado ända till Uruguayflodens stränder.

"Chayos" var en gränsstam, som uppehöll sig omkring östliga stränderna af Uruguayfloden och var allierad med Charruerna.

Stammarne "Chanás och Mboanes" bebodde vid Spaniorernas ankomst öarne i floden Uruguay vid Rio Negros utlopp.

"Guanoas" och "Martidanes" innehade landet emellan Uruguay- och Paranáfloderna; de drefvo en tid handel med Portugiserna, sedan desse hade anlagt staden Colonia del Sacramento, samt emottogo af dem sablar och lansar för den hjälp de lemnade dem att stjäla hudar från de Spanska egendomarne. De voro fiender till stammarne Yaros och Minoanes, hvilka, ehuru de i forntiden hade haft sitt tillhåll emellan floderna Paraná och Uruguay, dock ofta passerade den senare floden. De inföllo i östra Uruguayiska området år 1730 för att börja ett krig emot Spaniorerna derstädes, men återvände 1732 till sina gamla bostäder.

Minoanes-stammen hade samma språk, bruk, seder samt krigiska karaktär som Charruas, med hvilka den i det längsta bibehöll sin allians. Det är ock troligt, att de en gång hade utgjort ett enda folk.

Caaiguas voro en släktafdelning af Minoanerna, beboende trakten emellan Uruguay- och Paranáfloderna, vid gränsen af Paraguayske Missionerna eller i nuvarande provinsen Corrientes; de anses hafva utgjort moderstammen från hvilken de fleste öfrige Platastammarne utgått.

Om dessa stammars språk känner man föga, men till följe af några likheter med *Guarani*-tungomålet, har den tanka uppstått, att det samma utbildats från detta. Man uppgifver sålunda, efter Pater JOSE DE ISAUALDE, att det

vore en dialekt af Guaraní-språket, som förnåmligast skiljer sig derifrån genom bristen på första bokstäfverna i orden.

År 1622 hade *Chanas*-Indianerna infunnit sig på slätterna söder om staden San Salvador; de funno emedlertid här ett hårdt och envist motstånd i närmast angränsande byar och måste, förföljde af Charuanerna, återgå till sina öar, då de sökte Spanska Regeringens beskydd samt blefvo af denne anförtrorde åt Missionärerna.

Stammen Chayós omnämnes föga i de äldsta berättelserna öfver dessa landsträckor. ANGELIS är af den tanken, att de utgöra samma stam, som Yaros, med hvilken den har blifvit förvexlad, då dess namn betyder på Guaraní-språket: "den som slösar eller förstör", hvarmed torde förstås att dessa Indianer slösa med och förderfva sin egendom, i stället att fara i härnad och lefva på andras bekostnad. Yaros-Indianerna hafva occuperat samma landsträcka ännu år 1716.

Charuanerna hafva under tre århundraden gjort sig ryktbare, utgörande de grymmaste, mest vilde och otämjbara stammar på östra sidan af Platafloden. Deras strid börjades med den förste upptäckaren JUAN DIAZ DE SOLIS, och slutades först med deras utrotande. Från SOLIS död, ända till stammens undergång, hafva de under tvenne århundraden spridit krig, förstörelse och förskräckelse i landet. I början af vårt århundrade hade de sin vistelseort vid gränsen af Brasilien, emellan källorna af elfvarne Cuarehim och Ybirapitámini, hvarifrån de gjorde sina infall på Banda-Orientalis område. Brigadier-Generalen Don FRUCTUOSO RIVERA, President i Uruguayiska Republiken, utrotade dem äntligen år 1831 så fullständigt, att man tviflar om i detta ögonblick

några få individer återstå af detta, en gång så fruktade folk. Deras namn utmärker deras historia, ty Charrua betyder på Guarani-språket "vi äro oroliga och vredgade". *Cha* betyder vi, *rru*, vrede. Måne om sin frihet, afstodo de aldrig från att strida för densamma och för återställandet af sina ursprungliga besittningar. Tusentals grafvar hafva under trenne århundraden blifvit öppnade för, och tillslutna öfver deras skaror, som i vester stridde mot eröfrarne och deras afkomlingar, och i öster mot "Mamaluco"-stammen, samt den med denna allierade "Tupio"-stammen äfvensom mot "Arachanes", deras oförsonligaste fiender, bestående af Guarani-Indianer ifrån Rio Grande, som icke böra förväxlas med Arraucanos.

Beständigt sysselsatte med krig och begifne på plundring, undervisade de sina söner, i sättet att begagna sig af fördelarne i deras strider, men gjorde dem tillika till olyckliga offer för deras envishet och begär att hämnas öfvervåldet, samt för deras kärlek till friheten. Så stor var Charuanernes fiendskap emot Arrachanerna och Orientaliska Gebietets invånare, att begge stammarne äro utrotade utan att hafva försonat sig under de strider de båda måst utstå, så väl emot de Spanska som emot de Portugisiska anfallen. Orsaken, som uppgifves till detta oförsonliga hat, är så obetydlig, att den ej förtjenar nämnas. Rätta anledningen bör troligen sökas i grymheten af deras karakter, i det barbariska tillstånd, hvaruti de lefde, samt i deras vana vid plundringar.

Man säger, att de varit menniskoätare; men det enda kända exempel härpå är, att de förtärde Solis döda kropp, och detta enda fall synes mig lemna blott ett bevis på deras vildhet,

hämdbegär och oförsonlighet emot sina fiender, till och med efter döden. RUY DIAZ DE GUZMAN säger i sin Argentina, att de lefde på fiske och jagt, samt att, ehuru de voro förskräckliga i striden, voro de menskliga emot de öfvervunne. Denna sednare uppgift är dock stridande emot deras kända karakter, deras bruk och lefnadssätt. Pampas-Indianerna, hvilka mest likna Charruerna i allt, gifva ännu i dag aldrig pardon åt någon fiende, som faller i deras händer. CEUTENARA säger, att då någon släkting dog, var det bruket att stympa sig, (de afskuro neml. en finger för hvar släkting som dog), och AZARA påstår, att i början af detta århundrade, bruket ännu existerade ibland dem; vid hvarje nära släktings död afskars ett fingerled.

De målade, eller rättare tatuerade sig med flere färgor, men isynnerhet med blått. Så snart någon fara visade sig, upptändes eldar, då alla samlade sig väpnade, der de bemärkt den första elden. Dessa tecken till möte kan man anse som ett slags telegraf, hvilken, allt enligt det antal gånger den tändes eller släcktes, gaf tillkänna vigten och ändamålet hvarföre tecknet gafs. Ehuru ofullständig denna telegraf varit, så har den för dem troligtvis varit tillräcklig med deras inskränkta idéer. Hvarje eld man observerade vid deras bostäder, betydde vanligen ett matlag eller gift par.

De lefde tillsammans i familjer, beroende af höfdingarne. De firade bröllop, begrofv och ärade sina döda. I hettan af striderna, gjorde de allt möjligt för att frälsa liken af kamrater, i afsigt att dölja förlusten för fienden. Det är emellertid tvifvel underkastadt, anmärker LOZANO, då han talar om Indianerna i

allmänhet, huruvida de firade verkligt bröllop eller ej. En sak som har blifvit mycket disputerad ibland Missionärerna, men som ej är tvifvel underkastad, är, att de lefde med så många concubiner som hvar och en kunde underhålla. Dessas antal uppgick ända till femtio och derutöfver. Ett större antal kvinnor ansågs öka männens välde, gaf respekt och myndighet, tillfredsställde deras vilda könsdrift och befordrade deras gränslösa begär efter rusgifvande drycker. Dessa drycker tillverkades af kvinnorna af Maiz, vilda bär, rötter och honung. Denna sednare finnes till öfverflöd i skogarne, utan att fordra någon biskötsel. Af dessa materialier bereddes en dryck som var så rusgifvande, att den som förtärde densamma, förföll i en dvala under tjugufyra timmar utan att äga mera rörlighet än en stock. Bandet, som förenade dem med deras kvinnor, var ej starkt, ty mannen kunde skilja sig ifrån dem, emot en afgift till kvinnans släktingar, liksom de togo nya, likaledes mot en dylik lösepenning till dessas anhöriga. Deras vapen bestodo af lansar, kastspjut och "la bola arrojadiza" eller slängkulorna. Kastspjutet var ofullkomligt, ty dess spetsar voro af ben, några af koppar och jern, andra blott af träd, hvilket var brändt i elden för att göras hårdare. Endast skickligheten, hvarmed de sköttes, kunde göra dem fruktansvärda. Sednare begagnade de stål och jern, fastbindande vid ändarne spetsar af värjor, knifvar och andra stycken jern, hvarmed de försågo sig under sina plundringar. Då hästarnes antal hade tilltagit, begagnade de sig äfven af deras biträde i sina krig.

Deras anfall på de europeiska anläggningarne skedde om natten vid fullmåne. De tände eld

på alla hus, röfvade och plundrade allt hvad de kunde medtaga, mördade männerna samt förde qvinnor och barn i fångenskap. Detta intygas af alla, utom af RUY DIAZ DE GUZMAN, den förste som beskref Plataflodens upptäckt och besittningstagandet af dess områden. Hans yttrande om deras mensklighet mot fångar beror förmodligen på bristande kännedom om dem.

Deras styrelse bestod endast uti deras Tuhicchós eller chefer öfver åttatio till hundra familjer, hvilka äfven under fred voro mycket ansedde och respekterade. Detta chefskap var ärftligt, medförande ett slags adelskap, som grundade sig derpå, att deras förfäder förvärfvat sig vasaller eller styrt folkstammar. Det ärfdes af den förstfödde, men utan mehn för de andra, hvilka äfven kunde upphöja sig till chefer öfver några få, i fall deras våltalighet var tillräckligen hänryckande för att vinna anhängare.

Då krig utbröt, samlades alla cheferna hos en bland de förnämsta ibland dem, och öfverbefälet bestämdes genom val. Ceremonierna börjades med drickning af betydliga quantiteter "Chicha", en dryck som tillverkades af Maiz samt skidorna Algarrobbo (Johannisbrödet). En hopknådad massa af dessa vegetabilier sattes i jäsnings under en tid af 20 dagar eller en månad. Under denna tid berättade de för hvarandra sina bragder och segrar, visade sina ärr och skildrade de fiender som de hade öfvervunnit man mot man i tvekamp. Dessa samtal fortforo ännu lifligare sedan Chicha var färdigt. Deras skryt var större eller mindre, allt efter den quantitet Chicha de hade druckit, eller den verkan det hade på deras hufvuden. Den som blef vald till chef, blef genast åtlydd af de öf-

rige Cazikerna och deras stammar. Honom tillhörde det att föranstalta om församlandet af stridsmännen, genom eldar, kring den punkt hvarest den första elden tändes.

LOZANO beskriver i sin ännu otryckta historia öfver Paraguay, Rio de la Plata och Tucuman, Chichans verkningar på Indianen på följande sätt: "Några af dem, säger han, börja genom bettan och kraften af detta vin, att sjunga förskräckligt i de falskaste toner; andra gråta på det mest ömkliga sätt, några skrika, andra sucka djupt, här springa de, der hoppa de, och alla försöka sig i de öfningar, som mest anslå deras håg, samt med en lätthet och ifver, som skulle gifva anledning tro, att de ej endast voro yra i hufvudet, utan att de verkligen voro galne. De efterapa djurens läten, ryta, gnälla, hvissla, tjuta, skälla, gnägga och härma foglarnes sånger i den mest ohyggliga förvirring".

Någon öfverdrift i LOZANOS beskrifning äger ej rum, ty jag har en gång varit i tillfälle att bevista ett dylikt dryckeslag, ehuru i mindre skala, och hvarvid det tillgick nära nog på samma sätt.

Sällskapet bestod af omkring nio personer; de voro af de vänlige eller tamde Pampas-Indianerna. Ändamålet med deras besök i Buenos Ayres var ej af allmänheten känt. Alla önskade veta om det var af artighet eller nyfikenhet, eller för att handla, eller om något politiskt var med i spelet; men ingen fick veta något, utom det, att den högste vederbörande på stället, "General Rosas", bestod kalaset. De hade först varit på uppvaktning hos honom, och att de blifvit väl emottagne, hvad än ändamålet med deras besök var, bevisades genom den förvandling

som de hade undergått vid detsamma. De ingingo som gamla, och utkommo som nya varelser, åtminstone till den yttre människan. De hade nemligen blifvit beskänkte med för dem nya kläder, ehuru dessa redan hade varit såsom odugliga af deras ägare kasserade, men troligen bevarade för ett sådant tillfälle. De voro församlade på en stor gård eller Barrack och sutto i en cirkel på deras Ponchos hvilka voro utbreddes på marken. Ej ett ord sades, ej en min vexlades eller förändrades, alla blickar voro fästade på marken framför dem. Småningom började en och annan att sucka, suckarne öfvergingo till fuktiga ögon och dessa till tårefloder, då slutligen ett högljudt gråt börjades samt slutades med klagan med ett ohyggligt skrål; detta omvexlade nu med skrikande, tjutande och vrålande, några sjöngo, andra gáfvo krigstecknet. Mina öron tilläto mig ej att vara längre qvar vid detta spektakel, men jag erfor af andra, som dröjde, att de spelande slutligen kommo i extas och ingingo till de största ytterligheter, då Polisen tillkom, visade bort åskådarne och tillstängde portarne till Barracken, samt tilläto dem att i enslighet rasa ut. Största delen af grannskapet hade ingen ro nästan hela natten, och om morgonen lågo Indianerna kringspridda på marken såsom slagtade kreatur.

Charruernas krigsrustning bestod i kastspjutet, lansen, snaran och slängkulorna. Omkring midjan bars en bred gördel af strutsfjädrar, och öfver axlarne hängdes en hud; i sednare tider begagnades ett kort förkläde af kalf- eller fölskinn, i stället för strutsfjädersbältet. Som de lefde af fiske och jagt, så är det naturligt att de

de ej hade fasta bostäder, utan måste göra flyttningar, när det ena eller andra födoämnet saknades. Dessa flyttningar verkställdes alltid af qvinnorna, somingo bära hela bördan af allt arbete, det måtte vara af hvad slag som helst. Med ett ord, deras qvinnor voro deras lastdragare, byggmästare, hästskötare &c.

Att de egt en religion är otvifvelaktigt, ty ännu har man ej upptäckt något folkslag utan en sådan, och det vore dessutom stridande emot Guds allvisa lagar. Att denna religion varit enkel, kan äfven antagas, ty deras begrepp måste hafva varit enkla, inskränkta och outvecklade; hvarföre jag anser de äldste historieskrifvarnes enkla uppgifter vara de sannaste.

Enligt dem bestod Charruernas religion uti erkännandet af tvenne väsenden, ett godt och ett ondt. Det goda väsendet kallades Tupá, och det onda Anang. De ägde mera vördnad för det sednare än för det förra. Tupá är bildadt af förundranspartikeln *tu*, och frågo-ordet *pá*, "Ah! hvem är du?" Anang kommer af *ana* jag springer, och *ang* själen. Det betyder alltså: Jag springer eller förföljer själarne, och uttrycker det onda väsendets makt öfver menniskan. Detta var egentligen Guaranistammens religion, och troligtvis af Charruernas hämtad från dem, då namnet på de båda väsenden är på Guaranispråket. Således kan man äfven antaga att den var den rådande, åtminstone norr och öster om Platafloden.

Till Charruastammen anser jag äfven böra räknas tvenne stammar söder om Platafloden som vanligen räknas till Araucanos, nemligen *Ranquelches* och *Puelques*, emedan dessa, så väl till

utseende som lynne, språk, seder och bruk mest likna Charruas. Jag upptager dem emellertid äfven under Araucanerna.

2. Guaranistammen, som bebodde östra sidan af Platafloden, var redan från äldsta tider den största af alla, och utgör ännu i Paraguay och Brasilien ett betydande folkslag. Dess land låg nordost ifrån Platafloden och sträckte sig ifrån det inre af Brasilien, vid ungefär 29° sydlig latitud, vester ut till Uruguayfloden i nordliga delen af Uruguayska området, och nordligt till Paraguay. Guaranis namn förekommer ofta i historien, men de anföras ej såsom utmärkta krigare, och ej såsom oroliga, kringvandrande landstrykare, utan såsom ett stilla, fridälskande och arbetsamt folkslag. Deras språk är det fullkomligaste af alla de Amerikanska Indianspråken. Många af dess ord begagnades af de stammar, hvilkas språk ej var så rikhaltigt, när de ej ägde några egna motsvarande. Detta har gifvit historieskrifvare anledning att påstå det flere stammar vore med dem beslägtade. Missionärerna funno ibland Guaranis ett rikt fält för sin verksamhet och gjorde på mindre tid större, varaktigare och vidlyftigare eröfringar åt Spanska kronan, än alla densammas arméer. Guaranis voro de förste som antogo christendomen, och de bibehöllo den äfven. De kunde emellertid ej hoppas att under krigsoroligheterna få helt och hållet lefva i fred; ty då Spaniorerna äfven hade att strida emot deras, den tiden oförsonliga fiender, Portugisererna, med hvilka de jemt voro i krig, om ägande rätten till den ena eller andra landsträckan, som af dem blifvit eröfrad, sökte de sina allierade ibland Guaranis och tvingade dem att deltaga i kriget. Missionärernas rapporter till Biskopen i

Assumpcion i Paraguay (den först anlagda staden i dessa länder och hufvudsätet den tiden för Regeringen) äro fulla af klagomål öfver de hinder, som uppkommo till följe af dessa stridigheter vid spridandet af christendomen och civilisationen. Men oaktadt detta, uttryckte de dock alltid sin tillfredsställelse deröfver, att de mötte mindre svårigheter än hos andra stammar, och att deras framsteg voro öfver förmodan stora.

I detta ögonblick består största delen af folkmängden i Paraguay af deras afkomlingar, och deras språk är det gångbara. Spanska läres väl i skolorna, likasom alla förordningar utkomma på detta seduare språk, dock är Guaranispråket landets allmänna umgängesspråk.

De såkallade paraguayska så väl som uruguayska Missionerne äro befolkade af Guaranis, som äro bosatte i byar, hafva sina kyrkor och prester samt sysselsätta sig med jordens odling.

3. Den tredje större stammen eller den som bebodde landet i vester och söder om Platafloden, "*Araucanos*" eller de såkallade *Pampas-Indianerna* anses som grenar eller afdelningar af den stora stam af samma namn, som har sitt rätta hemvist i södra delen af Chili, på vestra sidan af Cordillererna. *Pampas-Indianerna* indelas vanligtvis i fyra stammar, hvilka alla anses vara afkomlingar af *Araucanerna*, eller tillhörande denna stam. De kallas "*Puelches*", "*Ranquelches*", "*Pequenches*" och "*Gueliches*".

Puelches-Indianerna bebo östra delen af provinsen Buenos Ayres ifrån 36° syd till gränsen af Patagonien, och ifrån 58° till 64° vestlig longitud. Detta kan man egentligen kalla för deras gebiet, men de ströfva ibland vida öfver dessa gränсор, och hafva visat sig till och med vid

portarne af Buenos Ayres. "Ranquelches"-Indianerna bebo en lika sträcka vester ut till Cordillererna och under samma latituds paralleler. Dessa tvenne stammar äro liksom Charruas, vilka, krigiska och otillgängliga för civilisation. "Pequenches"-Indianerna bebo östra sidan af Cordillererna och "Gueliches" den sydvestra delen af Pampasslätterna.

Man antager vanligen att dessa fyra folk tillhöra en stam, men jag tror mig icke böra instämma i denna åsigt, emedan de visa ganska stor olikhet i lynnen så väl som i bruk och seder. Att "Pequenches" och "Gueliches"-Indianernas grenar äro af Araucanska stammen kan man för visst antaga. Deremot anser jag Puelches och Ranquelches rätteligen vara utgreningar af Charruas, som bebott östra sidan af Platafloden, hvilka under förföljelser eller inbördes krig blifvit drifne öfver Paranáfloden, hvarest de dragit sig söder ut för att bibehålla sin sjelfständighet. Man har äfven ansett dem ifrån början hafva utgjort en särskild stam, under namn af "Querandis".

I anseende till deras karakter, bruk och seder, öfverensstämma de fullkomligt med Charruerna.

Då i mitt fädernesland flere naturforskare sysselsätta sig med ethnografiska undersökningar och intresset för kännedomen om den nya världens ur-invånare i samma mån stegras, som flere och flere spår efter desamma försvinna, så ansåg jag mig, i den mån tillfället medgaf, böra skaffa ett bidrag till historien om de otaliga stammarne af Amerikas ur-invånare.

År 1832 företog sig Presidenten ROSAS ett utrotningskrig emot de vilda stammarne i Plata-

confederationens stater; männerna föllo för seger-
vinnarnes vapen, qvinnor och barn togos till
fånga och utlemnades till de christna invånarne
att användas såsom tjenare. Jag uppdrog åt en
Sjökapten som med sitt fartyg besökte de sydli-
gaste hamnarne i unionen, att inlösa en gosse
och en flicka för min räkning. Det lyckades ho-
nom endast att få en 12-årig flicka i staden Pa-
tagones, och äfven denna endast emot ett ganska
högt pris; gossarne höllos i så högt värde, att
Kaptenen icke ansåg sig kunna på detsamma in-
gå. Jag har sedan låtit föra denna flicka till
Sverige, att för Kongl. Vetenskaps-Akademien upp-
visas. Professor A. RETZIUS har besörit en gips-
afgjutning af hennes hufvud, och Kammarjunka-
ren VON WRIGHT har förfärdigat det porträtt af
samma flicka, som bifogas denna uppsats. Då
detta skrives, i Juni 1843, är flickan, enligt upp-
gift, 13 år. Vid upptagandet af de mätningar
som härhos bifogas, har jag blifvit biträdd af
Professor RETZIUS; utseende och dimensioner äro
följande: Till växten är hon liten, mager, men
temligen stark; bröstet platta, ej utvecklade;
axlar och bäcken af föga vidd. Hudens färg grå-
brun, håret svart glänsande, groft, tagellikt, rakt
och temligen långt, tjockleken af hvarje hår 4
millim. Hårgränsen går långt ned på pannan och
till sidorna ända in på yttre ändarne af ögonbry-
nen. Pannan liten, smal, öfver ögonbrynens
yttre hälft mot tinningarne mycket hopknipen.
Ögat mindre convext än i allmänhet hos Euro-
peen, ögonlocköppningarne äfven små; ögonbryn
temligen starka, smärta, gå dels tillsammans öf-
ver näsroten, dels öfvergå de utåt i hufvudets
hårgräns; ögonlocksbåren mycket glesa, korta;
Iris af en jemn svartbrun yta; pupillerna, äf-

ven i skymning, små. Näsroten bred, något platt; näsan låg, rak, kort, något platt, näsborrornes vingar breda; näsryggens sidor fortsättas i planer som öfvergå i kinderna utan böjning; kindkullarne stora, kantiga; under dem fortsätta sig kinderna mot hakan i en rät vinkel, nästan som hos lapparne; hakan smal, munnen mycket framstående; läpparne stora; öronen små, utstående. Hufvudskålen liten, kort, nacken platt; hjessknölarne stora, höga, pannknölarne små. Hårgränsen går i långa spetsar nedåt kindbenen, ända till midten af underkäkens uppstigande gren. Hufvudskålen företeer mycken likhet med den af en lappländare, äfven ansigtet skiljer sig från dessa nästan endast genom den utskjutande (prognathiska) munnen. Det ses här af att denna bildning af hufvudet hör till den som Hr RETZIUS kallat den *brachycephaliskt-prognathiska*.

Hufvudets längd från glabella till tuber occip. 0,170 meter; höjd 0,140; bredd af pannan 0,102; hufvudskålens bredd öfver vårtutskotten 0,125; öfverkäkens höjd från näsroten till alveolarranden 0,062; öfverläppens höjd 0,025; höjden af underkäkens uppstigande gren 0,054; underkäkens höjd från hakan till processus alveolaris 0,035; underläppens höjd 0,040; ansigtsbredden mellan okbågarna 0,122; interorbitalvidden 0,035; — hela kroppens längd från hjessan till hälen 1,457; axelbredden 0,333; längd af öfverarmen 0,301; framarmslängd 0,230; längd af metacarpus 0,055; långfingrets längd 0,096; lillfingrets längd 0,055; tummens längd 0,055; bäckenets bredd öfver höftkammarna 0,402; lårbenens längd 0,407; tibiae längd 0,353; fotens längd 0,207. Oaktadt denna flicka redan som litet barn kommit i de christna invånarnes händer, så var hon vid ankomsten till

Montevideo så godt som ännu vild, i afsaknad äfven af de allmännaste begrepp. Hennes hela klädsel bestod i ett öfver axlarna kastadt, tunt bomullstygstycke, och när hon på min bekostnad försågs med kläder, så ville hon helst begagna dem att hänga på sig på samma sätt. I Göteborg lemnade jag henne att uppfostras af min der boende syster. Hon visade i början intet spår till läraktighet, utan var fullkomligen liknörd för alla tillfällen, som erbjödos att antaga ett civiliseradt skick, äfvensom att inhämta färdighet i fruntimmersslöjder. Längre var hon mycket lömsk och visade ej sällan håg att vildt öfverfalla den med hvilken hon var missbelåten, men vågade ej att skrida till utbrott, af fruktan för öfvermakten. Efter ihållande och ospard möda, antog hon dock ett mer och mer civiliseradt skick, lärde något svenska, äfvensom söm, och lärde småningom att fatta den undervisning i religionen som blef henne meddelad.

Tab. I och II.

- fig. 1. Puelches-flickan Rufina, sedd i profil.
 — 2. ————— en face.
 — 3. Hufvudets omkrets sedd ofvanifrån.



Nya Svenska Homoptera,

beskrifna af

CARL H. BOHEMAN.

Till Akademien inlemnad den 21 Maj 1845.

Hemipter-klassen har, under en tid af omkring 80 år eller sedan LINNÉ 1761 utgaf sista editionen af sin Fauna Svecica, inom fäderneslandet endast blifvit bearbetad af vår såsom Dipterolog utmärkte Professor FALLÉN, som i flera afhandlingar sökt sprida ljus äfven inom denna del af Sveriges Fauna, samt sednast af Professor ZETTERSTEDT i dess Insecta Lapponica.

LINNÉ uppgaf af den grupp bland Hemipterna, som man benämndt Homoptera, endast 24 arter såsom Svenska. Dessa ökades af FALLÉN till 84 och af ZETTERSTEDT ytterligare med 26 arter, så att hela det hittills kända art-antalet uppgår till 110.

Vid ordnandet af Riks-Musei Entomologiska samlingar hafva flera utmärkta, dels alldeles obekanta, dels för Skandinavien nya Homopter-arter förefunnits, för hvilka jag ansett mig i närvarande afhandling böra närmare redogöra, så mycket hellre, som något mer omfattande arbete öfver dessa djur, inom fäderneslandet icke så snart torde vara att förvänta.

1. *Eupelix spathulata*: oblonga, testacea; capite plano, foliaceo, latitudine postica longiore, margine fusco-punctato; hemelytris griseis, nervis disci medio nonnihil infuscat. ♀ Long. 6 millim.

Eupelix id. GERM. Faun. Ins. Europ. XX. n:o 25. — BURM. Gen. Ins. II. tab. *Eupelix* n:o 6. BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 155, n:o 1. Habitat in Westrogothia rarissime. Dom. J. W. DALMAN.

Magnitudo et statura *E. cuspidatae*, sed capite multo longiore, tantummodo ad marginem acutum obsolete fusco variegato, ab illa mox distinguitur. Caput sub-triangulare, latitudine postica nonnihil longius, supra deplanatum, foliaceum, apice reflexum, postice praesertim carinatum, ad marginem acutum obsolete fusco-variegatum, subtus planum, pallidum; fronte angusta, tumida, versus angulum anticum acute carinata; oculis prope basin capitis insertis, lateralibus, parvis, sub-ovatis, modice convexis, glaucis. Antennae breves, inferne in fronte siti, testaceae, seta fuscescente. Thorax capite angustior, longitudine duplo latior, antice utrinque leviter oblique truncatus, medio paulo productus, postice in medio profunde emarginatus; angulis anticis rotundatis, posticis oblique truncatis; supra nonnihil convexus, inaequalis, transversim rugulosus, testaceus, carinis tribus instructus, nempe una in medio et altera utrinque intra marginem lateralem. Scutellum sat magnum, triangulare, ante apicem linea transversa, utrinque abbreviata impressum, testaceum, immaculatum. Hemelytra deflexa, abdomine vix longiora, apice anguste rotundata, dilute grisea, sub-diaphana, nervis elevatis, in medio disci nonnihil infuscat. Alae albae, hyalinae, nervis pallide fuscis. Corpus subtus pallide flavum, segmento primo abdominis basi transversim infuscato. Pedes pallide flavi, impunctati; tibiis posticis remote breviter spinulosi.

2. *Deltocephalus* (*Cicada* Fall.) *calceolatus*: breviusculus, sordide pallidus, capite triangulater acute producto, supra dilute brunneo, linea media margineque albidis; fronte dilute fusca, utrinque pallide lineata; thorace brunneo, albido quinque lineato; hemelytris fusco-albidoque variegatis; pedibus nigro-maculatis, posticis tibiis intus linea articulis tarsorum 2 ultimis nigris. ♂♀. Long. 5 millim.

Habitat in gramine ad Tollare in Wermdön d. 28 Junii 1846 sat copiose lectus; in Westrogothia et Norvegia alpina ante plures annos specimina nonnulla inventa.

Statura omnino *D. Bohemani* ZETT. saepe tamen nonnihil major et crassior, colore alio, thorace dilute brunneo, albido quinque lineato, tarsis posticis, metatarso excepto, nigris, ab illo mox distinctus. Caput a latere superiore visum sub-triangulare, planum, postice late emarginatum, dilute brunneum, linea media longitudinali margineque albidis; fronte declivi, dilute fusca, utrinque crebre transversim flavo-lineata, lineis undulato-arcuatis, inferne longitudine sensim decrescentibus, medio linea longitudinali, superne abbreviata, pallida; ore flavo; oculis lateralibus, ovatis, modice convexis, fuscis, flavo-marginatis. Thorax brevis, transversus, antice late rotundatus, postice leviter emarginatus, supra paulo convexus, dilute brunneus, lineis quinque longitudinalibus albidis, una in medio et binis utrinque, magis approximatis. Scutellum sat magnum, breviter triangulare, planum, pallidum. Hemelytra abdomine paulo longiora, apice late rotundata, sordide pallida, nervis albidis, dorso et disco areas oblongas margineque apicali sub-quadratas, omnes fusco-marginatas, includentibus, margine

exteriori ultra medium albedo. Alae hyalinae, rubro virideque micantes. Pectus flavum, obsolete nigro-variegatum. Abdomen nigrum, margine anoque flavis; genitalibus feminae sordide flavis, utrinque macula vaginaque dilute fuscis. Pedes pallidi, anteriores femoribus nigro-maculatis; postici femoribus extus tibiisque intus linea nigra; tarsis anterioribus pallidis, unguis fuscis, posticis nigris, metatarso flavo.

Observ. Colore valde variat. Nuper exclusus corpore toto pallido, signaturis et nervis albidis tamen perspicuis; maculae femorum vario modo confluant et abdomen, margine excepto, saepe totum nigrum evadit, genitalibus feminae tunc flavis, confertim nigro-marmoratis.

3. *Deltocephalus formosus*: breviusculus; capite obtuse triangulariter producto, albo, supra maculis binis fulvis; thorace albo, fulvo 6 maculato; fronte transversim fusco-lineata; hemelytris lacteo-fusco-flavoque variegatis; pedibus pallidis, nigro-maculatis. ♂♀. Long. 3—4 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 155, n:o 2.

Hab. in gramine locis uliginosis mens. Julii et Augusti in Smolandia ad Anneberg passim; in Bottnia boreali ad Råhäcken, nec non in Lapponia ad Quickjock rarius.

Statura et similitudo *D. ocellaris*, sed dimidio fere major, magis pictus, vertice minus acuto, fronte parce nigro-variegata, pedibus dilutioribus, tarsis posticis distincte nigro-annulatis, ab illo bene distinctus. Caput supra sub-triangulari, angulo antico quam in *D. ocellari* obtusiore, unde caput brevius apparet, medio tenuiter carinatum, pallide flavum vel album, maculis dua-

duabus, transversis, interdum obsoletis, fulvis; fronte colore variabili, pallida; interdum mox infra verticem lineis tantum binis, transversis, fuscis, saepe vero nigro-variegata, area tamen media flava; oculis lateralibus, ovatis, modice convexis, nigris vel glaucis. Antennae tenues, basi testaceae, seta capillari, extrorsum tenuiore, fusca. Thorax brevis, transversus, postice subtruncatus, supra paulo convexus, albus, postice maculis quatuor, rotundis, transversis, interdum confluentibus et antice binis, fulvescentibus. Scutellum sat magnum, breviter triangulare, apice acutum, supra paulo convexum, flavo-testaceum, basi utrinque macula fulvescenti, medio linea transversa tenui, utrinque abbreviata. Hemelytra abdomine vix longiora, apice late rotundata, sordide flava, maculis ocellaribus oblongis et circularibus lacteis, brunneis vel fuscis, hinc inde nigro-marginatis, pulchre picta; pone medium marginis exterioris macula sub-obliqua et arcu intrapicali obscurioribus saepe notata. Alae albae, apice leviter infuscae. Corpus subtus nigrum, abdomine utrinque segmentisque ultimis apice anguste flavis; genitalibus feminae basi apiceque flavis, apice setosis, vagina semper nigra. Pedes flavi, vel a basi fere ad apicem nigri, vel parce et obsolete nigro-maculati; tibiis anticis immaculatis, posterioribus ad basin spinularum nigropunctatis; tarsis flavis, posticis nigro-annulatis.

4. *Deltocephalus frigidus*: breviusculus, pallidus, subtus coeruleo-ater; capite triangulariter acute producto, supra cum thorace obsolete fusco-variegato; fronte brunnea, pallide lineata; hemelytris pallidis, obsolete fusco-maculatis, margine exteriori a basi ultra medium albido; pedibus nigro-variegatis. ♂♀. Long. 2 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 156, n:o 3.
 Habitat in alpe Walli prope Quickjock d.
 20 Jul. — 6 Aug. In locis humidis planitie alpinae 2—3000 pedes supra mare elevatae, in gramine, minus frequenter.

Affinis certe *D. pulicari*, nonnihil tamen major, capite acutius triangulari, elytris obsolete fusco-maculatis, ab illo differt. Caput breve, supra paulo convexum, angulo antico quam in *D. pulicari* minus producto sed acutiori, supra plus minusve distincte fusco-variegatum; fronte nigro-fusca vel brunnea, utrinque transversim pallide lineata lineaque longitudinali media concolore; genis immaculatis, sordide flavis; oculis lateralibus, ovatis, nigro-fuscis. Antennae mediocres, pallide flavae, seta capillari fusca. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis lateralibus posticis oblique truncatis; supra modice convexus, obsolete transversim strigosus, sordide testaceus, nitidus, plus minusve distincte fusco-variegatus. Scutellum triangulare, pallidum. Hemelytra incumbentia, apice rotundata, pallide flavo-grisea, maculis oblongis, obsolete, fuscis notata, margine exteriori a basi ultra medium albo. Corpus subtus coeruleo-atrum, lateribus pectoris et apicibus segmentorum abdominalium anguste flavis; genitalibus feminae pallide flavis, inferne nigro-irroratis, vagina nigro-fusca. Pedes pallidi; femoribus basi plus minusve infuscatis; tibiis posticis saepe fuscis, interdum intus nigro-lineatis, extus nigro-punctatis; tarsis apice infuscatis.

Variat capite, thorace hemelytrisque obscure fusco-variegatis.

5. *Deltocephalus bipunctipennis*: angustus, flavescens; capite triangulariter modice producta;

hemelytris laetius flavescenti-hyalinis, intra apicem maculis duabus, oppositis, nigro-fuscis; margine exteriori maculis tribus albidis decorato; abdomine marginibus plagaque dorsali nigris; femoribus supra obsolete nigro-lineatis; tarsis posticis nigro-annulatis. ♂. Long. 3 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 156, nro 4.

Habitat in gramine loco paludoso ad Skuggan prope Holmiam d. 20 Aug. E Gottlandia a Dom. ZETTERSTEDT communicatus.

D. assimili ♂ magnitudine aequalis, signaturis hemelytrorum a confinibus facile distinctus. Caput breve, crassum, quam in *D. assimili* brevius et magis obtuse triangulariter productum, flavum, nitidum, immaculatum; oculis lateralibus, sub-ovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae capite cum thorace parum longiores, testaceae, seta capillari, extrorsum fuscescente. Thorax latitudine postica duplo brevior, antice late rotundatus, postice vix emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; vix transversim strigosus, flavescent, sub-nitidus. Scutellum sat magnum, triangulare, colore thoracis, stria pone medium tenui, transversa, utrinque abbreviata, impressum. Hemelytra deflexa, corpore nonnihil longiora, apice late rotundata, laete flavescenti-hyalina, nitida, intra apicem maculis duabus, oppositis, nigris, una in margine interiore oblonga et altera in margine exteriori subrotunda, ramulo fusco usque ad medium apicis sursum continuata. Praeterea in margine laterali pone medium maculae tres et in disco versus apicem puncta nonnulla albo pellucida conspiciuntur. Corpus subtus flavum; abdomine marginibus tenuiter, plaga dorsali et genitalibus apice macula sub-triangulari, nigris, illa linea media tenui flava divisa. Pedes

graciles, flavescentes; femoribus anticis supra obsolete fusco-lineatis; tibiis posticis nigro-punctatis; tarsis ejusdem paris nigro-annulatis, unguibus omnium fuscis.

6. *Athysanus* (*Cicada* Fall.) *argentatus*: oblongus, pallidus; capite obtuse triangulari, arcu intra-oculari nigro-fusco; fronte dilute brunnea, lateribus transversim pallide lineata; thorace utrinque lineis duabus abbreviatis scutelloque linea media et alia utrinque brevi fuscis; hemelytris oblique fusco-lineatis, margine exteriori antice pallide sulphureo; femoribus tibiisque nigro-punctatis; tibiis posticis intus nigro-lineatis. ♂♀. Long. 7 millim.

Cicada argentata. FABR. Ent. Syst. IV. p. 38, 47. — Syst. Rhyng. p. 77, 72.

Jassus argentatus. BURM. Gen. Ins. fasc. II.

Jassus interstitialis. GERM. Mag. IV. p. 90. n. 27.

Athysanus argentatus BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 156, n:o 5.

Mas. nonnihil minor, abdomine subtus nigro-trivittato, vitta media latiore.

Femina: abdomine subtus nigro-trivittato, vittis lateralibus saepe angustis, media interdum abbreviata; genitalibus pallide flavis, vel fusco-maculatis; vagina dilute brunnea.

Habitat loco paludoso in gramine prope Holmiam ad Skuggan mense Aug., a Dom. SUNDEVALL detectus; deinde eodem loco a me etiam inventus.

Magnus in hoc genere. *Acucéphalo rustico* ♀ nonnihil major. Caput breve, latum, apice obtuse triangulare, pallide griseo-flavum; vertice linea transversa antrorsum nonnihil arcuata, interdum postice lineola tenui longitudinali adfixa, nigro-fuscis; fronte dilute brunnea, utrinque trans-

versim pallide lineata; oculis lateralibus, subovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae mediocres, basi testaceae, seta capillari, fusca. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique sub-truncatis, supra transversim strigosus, pallidus, utrinque lineolis duabus, remotis, basi apiceque abbreviatis, longitudinalibus, fuscis. Scutellum magnum, triangulare, linea media ad apicem fere continuata, aliaque utrinque tenuiore, abbreviata, nigro-fuscis, antice per thoracem translucens. Hemelytra incumbens, apice anguste rotundata, longitudine abdominis, pallida, lucida, lineis quinque vel sex obliquis, interdum obsoletis margineque interiore fusco-brunneis; margine exteriori a basi longe ultra medium pallide sulphureo. Corpus subtus pallide flavum; abdomine supra lineis tribus et subtus totidem nigris ornato, vitta media latiore, in femina saepe basi apiceque abbreviata. Pedes pallide flavi; femoribus extus a basi ultra medium seriebus duabus et punctis saepe confluentibus, nigris; tibiis posticis extus punctis, intus linea nigris; tarsis apice infuscatis.

7. *Athysanus Quadrum*: ZETT. brevis, subtruncatus; niger, subnitidus, capite, thorace scutelloque flavo-variegatis; hemelytris vitta cuneata, basali, obliqua, plagaque inaequali pone medium albidis; pedibus nigris, geniculis omnibus, tibiis tarsisque anterioribus pallidis (♂); aut pallidus, capite thorace scutelloque brunneo-variegatis; fronte utrinque transversim fusco-lineata; hemelytris dilute brunneis, signaturis albidis ut in mare; pedibus pallidis, femoribus infuscatis (♀). ♂♀. Long. 5 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 157, n:o 6.

Habitat mensib. Aug. et Septemb. in pratis ad Medhamra et Gusum (WAHLBERG) Ostrogothiae; in Djurgården prope Holmiam et in alpe Dovre Norvegiae, rarius.

Individuis majoribus *A. plebeji* vix longior, sed robustior, pro sexu colore valde varians. *Mus*. Caput breve, latum, apice obtuse triangulare, nigrum, signaturis variis flavidis notatum, nempe utrinque in fronte lineolis transversis, plus minusve distinctis, medio interdum confluentibus, inter oculos arcu transverso et in margine posteriori maculis duabus sub trigonis, itidem saepe confluentibus; genis flavis, inferne nigris, ibique puncto flavo insignitis, rostro nigro, basi utrinque flavo-maculato; oculis ovatis, modice convexis, glaucis. Antennae mediocres, basi pallidae, seta capillari, fusca. Thorax brevis, transversus, apice late rotundatus, basi leviter emarginatus, angulis posticis oblique truncatis, supra paulo convexus, transversim crebre strigosus, sub-nitidus, niger, antice punctis duobus, lineola longitudinali media antrorsum abbreviata maculisque quatuor sub-triangularibus, transversis, intra marginem posticum, flavis. Hae signaturae interdum vario modo confluent ut thorax flavus nigro-variegatus apparet. Scutellum sub-triangulare, nigrum, utrinque vitta longitudinali flava decoratum, vel flavum, nigro-variegatum. Hemelytra incumbencia, apice late rotundata, abdomine nonnihil longiora, sub-nitida, nigra, a basi ad medium marginis interni vitta sub-cuneata, plaga transversa, difformi pone medium lineisque duabus brevibus juxta scutellum, albidis. Alae dilute coerulescenti-caesia. Corpus subtus atro-coerulescens, abdomine margine laterali anguste flavo. Pedes nigri, geniculis om-

nibus, tibiis tarsisque anterioribus pallide flavis, posticis infuscatis.

Femina mare nonnihil robustior, pallida; capite, thorace scutelloque dilute brunneo-variegatis; fronte utrinque transversim brunneo lineata, hemelytris abdomine brevioribus, dilute brunneis, signaturis albis ut in mare sed majoribus; alis albidis, hyalinis, nervis apiceque infuscatis; corpore subtus pallido, plus minusve nigro-variegato. Pedibus pallide flavis; femoribus latere interiori obsolete, tibiis posticis intus evidentius fusco-lineatis, illis pro insertione spinarum nigro-punctatis.

8. *Athysanus picturatus*: breviusculus, pallidus; capite nigro-maculato; thoracis maculis quinque scutelloque una itidem nigris; hemelytris oblique nigro-fusco lineatis; femoribus nigro-annulatis. ♂♀. Long. 3—3½ millim.

Cicada picturata. SAHLB. Acta Fennica. I. p. 89.

Athysanus picturatus BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 157, n:o 7.

Mas: minor; ventre parce nigro-variegato; genitalibus pallidis.

Femina: major; ventre nigro tri-vittato; genitalium valvulis nigro-marginatis, vagina dilute brunnea.

Habitat locis aridis in gramine prope Holmiam ad Skuggan et Bellevue mensib. Augusti et Sept. passim.

Statura fere *A. plebeji* ejusque individuis minoribus magnitudine aequalis. *A. lineigero* ZETT. etiam affinis, sed dimidio major et aliter coloratus. Caput supra maculis 4 majoribus, rotundatis, in quadrangulum positis, maculas 2 minutas includentibus, maculaque utrinque minori supra

antennae basin ad oculum; inferne maculis 3 magnis, transversim positis, exteriore utrinque sub oculo, media in rostro, saepe divisa, maculisque 2 aliis in rostro cum priori longitudinalibus, et annulo denique in genis ad insertionem pedum anticorum; oculis angulato-rotundatis, modice convexis, nigro-fuscis, antice et inferne late flavo-marginatis. Antennae basi pallidae, seta sat longa, capillari, fusca. Thorax brevis, transversus, antice sub-rotundatus, basi leviter, late emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; transversim obsolete strigosus, sub-nitidus, pallidus, maculis quinque nigris, duabus in margine antico, saepe in arcum confluentibus tribusque quarum intermedia maxima, dorsalibus, rotundatis, interdum plus minusve connexis. Scutellum triangulare, pallidum, macula in medio baseos nigra. Hemelytra incumbientia, apice late rotundata, abdomine vix vel parum longiora, sub-nitida, pallida, sutura anguste lineisque quatuor fusco-nigris, quarum interior a basi juxta scutellum ad medium marginis interni oblique descendit, secunda et tertia itidem a basi ex eodem puncto exeunt a se invicem divergunt, secunda apice versus tertiam inflectitur et ramulo brevi assurgit, tertia non longe a basi in duas dividitur quae non procul ab apice hemelytrorum rursus connectuntur. Alae maris leviter infuscae, feminae albae, apice tantum fuscae. Corpus subtus in mare nigrum, lateribus segmentorumque apicibus anguste pallidis; in femina plus minusve pallido nigroque variegatum, saepe nigro trivittatum; abdomine supra in utroque sexu nigro-caesio, apici macula transversa flava. Pedes pallidi; femoribus anterioribus versus apicem nigro-annulatis, anticis intus maculis duabus ejusdem

coloris; tibiis posticis nigro sub-lineatis; tarsis fuscescentibus.

9. *Thamnotettix* (*Cicada* FALL.) *flaveola*: oblonga, dilute sulphurea; capite obtuse triangulari; oculis nigro-fuscis; hemelytris flavo-pellucidis; abdomine dorso, subtus in medio baseos lineaeque angusta, utrinque, laterali nigris (♂) aut lutescente, immaculato (♀); femoribus anterioribus supra tibiisque posticis extus nigro-punctatis; tarsis apice fuscescentibus. ♂♀. Long. 4—4½ mill.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 157, n:o 8.

Habitat in gramine locis paludosis mensib. Augusti et Septemb. prope Holmiam ad Fiskar-torpet, rarius.

Magnitudo et statura *T. striolae*. Caput crassum, apice obtuse triangulare, supra paulo convexum, totum dilute sulphureum, sub-nitidum, suturis maris fuscis; ocellis duobus parvis, nigris, interdum obsoletis; oculis lateralibus, subovatis, glaucis. Antennae longitudine fere dimidii corporis, basi flavae, seta extrorsum fuscescente. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice leviter, late emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, subtilissime transversim strigosus, sub-nitidus, dilute sulphureus. Scutellum sat magnum, triangulare, apice acutiusculum, concolor. Hemelytra deflexa, abdomine longiora, apice anguste rotundata, flavescencia, lucida, in femina nonnihil dilutiora. Alae dilute flavescences, nervis subfuscis. Corpus sulphureum, in femina immaculatum, vagina dilute fusca; in mare abdomine supra late, subtus in medio vitta basali maculisque 4 sub-triangularibus, longitudinalibus, magnitudine sensim decrescentibus, nigris. Pedes saturate flavi, femoribus anterioribus saepe obsolete

nigro-lineatis; tibiis posticis pro insertione spinarum remote nigro-punctatis; tarsis apice fuscescentibus.

10. *Thamnotettix paludosa*: anguste oblonga, supra pallido fuscoque variegata; capite obtuse triangulari; fronte nigra, transversim flavo-lineata, medio linea longitudinali flava; genis supra flavis, inferne nigris, interdum flavo-maculatis; rostro nigro, basi macula magna, didyma, flava; hemelytris lineis obliquis, fuscis, duplicatis, hinc inde anastomosantibus; abdomine nigro, sulphureo-marginato; pedibus pallidis, nigro-variegatis. ♂♀. Long. 4½—5 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, n:o 9.

Habitat in gramine locis paludosis ad Carlberg prope Holmiam mense Augusti, rarius.

Magnitudo et fere statura *T. subfusculae*, nonnihil tamen gracilior et aliter colorata. Caput crassum, antice obtuse triangulare, flavum, nigro-variegatum, nempe prope apicem linea transversa, subarcuata, intra basin litura parva, semicirculari lineaque tenui longitudinali in medio, nigris; fronte nigra, lateribus lineis transversis, lineola media longitudinali maculaque parva ad oculos, flavis; genis flavis, inferne nigris, ibique saepe in medio macula rotunda flava notatis; rostro nigro, basi macula utrinque majori, oblongo-quadrata flava; oculis ovatis, modice prominulis, in mortuis glaucis. Antennae longitudine capitis cum thorace, basi testaceae, nigro-annulatae, seta fusca. Thorax latitudine multo brevior, apice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra modice convexus, vel flavus, vario modo nigro-maculatus, vel niger, antice flavo-marginatus lineaque media longitudinali pallida saepe insignitus. Scutellum triangu-

lare, flavum, basi nigro-maculatum, maculis lateralibus majoribus, triangularibus, medio punctis duobus parvis, transversis et pone illos non procul ab apice macula transversa, apice emarginata, vel interdum divisa, itidem nigris. Hemelytra deflexa, abdomine longiora, apice anguste rotundata, sordide pallida, margine laterali apiceque dilutiora, lineis obliquis duplicatis, hinc inde anastomosantibus, fuscis. Alae albae, nervis fuscis. Corpus subtus nigrum, pectore anguste-abdomine late sulphureo-marginatis; segmentis duabus penultimis in mare flavis, medio atro-maculatis; genitalibus feminae flavis, vagina nigro-fusca. Pedes pallidi; femoribus basi plus minusve fusco-variegatis; tibiis anterioribus extus interdum fuscolineatis, posticis nigro-punctatis; tarsis fusco-annulatis.

11. *Thamnotettix antennata*: anguste oblonga, pallide testacea; capite obtuse triangulari, maculis apicis 4 vel 6 minutis, obsoletis, fuscis et duabus majoribus ad antennarum basin, nigris; antennis longitudine fere hemelytrorum; hemelytris pallide-testaceis; abdomine nigro, flavo-marginato; femoribus anticis inferne linea fusca; tibiis posticis extus nigro-punctatis, intus linea nigra notatis; tarsis posticis fusco-annulatis. ♂♀. Long. 5 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, n:o 10.

Var: β capite antice tantum punctis duobus fuscis.

Habitat in gramine locis paludosis ad Annehund prope Holmiam mense Augusti, rarius.

Statura *T. 4-punctatae*, dimidio major, antennis longissimis a confinibus facile distincta. Caput crassum, obtuse triangulare, pallide testaceum, apice punctis 4 vel 6 parvis, fuscis, trans-

versis, exterioribus interdum deficientibus, ad suturam inter genas et rostrum prope insertionem antennarum macula majore, nigra; oculis ovatis, modice convexis, glaucis. Antennae longitudine fere hemelytrorum, basi flavescentes, seta tenui, capillari, fusca. Thorax brevis, transversus, apice late rotundatus, postice leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, transversim vix strigosus, sub-nitidus, pallide testaceus. Scutellum triangulare, pallide testaceum, basi utrinque macula parva fulva. Hemelytra deflexa, abdomine dimidio longiora, apice anguste rotundata, sub-nitida, pallide testacea. Corpus subtus nigrum, pectore abdomineque late, segmentis abdominis apice in mare anguste flavo-marginatis; segmento penultimo in mare flavo, nigro tri-maculato; genitalibus feminae pallidis, vagina nigra. Pedes pallidi; femoribus anticis inferne tibiisque intermediis extus linea tenui fusca notatis; tibiis posticis extus crebre nigropunctatis, intus linea tenui, concolore; tarsis posticis fusco-annulatis.

12. *Thamnotettix Cyane*: angusta, coerulescenti-caesia; capite obtuse triangulari, supra maculis quinque parvis antennarumque basi flavis; fronte, genis, corpore subtus pedibusque flavo-variegatis; hemelytris margine pallidoribus, macula ante medium, laterali, cana, ornatis. ♂♀. Long. 4—5 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, n:o 11.

Habitat in foliis Nymphaeae ad Annelund prope Holmiam mense Augusti semel sat copiose inventa.

Longitudo *T. cruentatae* sed gracilior. Species pulchra, signaturis valde varians. Mas femina semper minor et obscurior. Caput crassum,

sum, obtuse triangulare, coerulescenti-caesium, supra maculis flavis variegatum, binis scilicet in margine postico, linearibus, transversis, duabus in medio verticis, itidem transversis et quinta intra apicem, parvis, rotundis, saepe obsoletis et interdum omnino evanescentibus; fronte vel coerulescenti-caesia, ad basin rostri macula flava, vel utrinque transversim flavo-lineata; genis flavis, inferne saepe infuscatis; inter oculos ocellis duabus, albis distinctis; oculis sub-ovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae capite cum thorace nonnihil longiores, basi flavae, seta capillari, fusca. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, obsolete coriaceus, coerulescenti-caesius, maculis nonnullis flavis, saepe vix observandis, ornatus. Scutellum sat magnum, triangulare, coerulescenti-caesium, vel immaculatum, vel flavo-trimaculatum. Hemelytra deflexa, abdomine dimidio longiora, apice anguste rotundata, coerulescenti-caesia, saepe pallide marginata et obsolete lineata, margine laterali in medio macula oblonga, cana. Alae dilute fuscae, nervis obscurioribus. Corpus subtus coeruleo-atrum, flavo-variegatum; genitalibus feminae flavis, lamellis fusco-variegatis, vagina nigro-fusca. Pedes pallide flavi; femoribus apicem versus, tibiis tarsisque vario modo fusco-variegatis.

13. *Thamnotettix atricapilla*: oblonga, flavescens; capite sub-rotundato, verticis apice fronteque nigris, linea interrupta intra oculari lineisque utrinque transversis frontis flavis; hemelytris dilute flavo-pellucidis, apice leviter infuscatis; pectore abdomineque medio nigris; femoribus basi obsolete nigro-punctatis. ♀. Long. 5 mill.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 158, n^o 12.
In gramine loco paludoso ad Anneberg Smolandiae mense Augusti semel lecta.

Statura et summa similitudo *T. striolae* ejusque individuis majoribus nonnihil major. Caput antice magis obtusum, sub-rotundatum, fronte verticeque obscurioribus, abdomine latius flavo-marginato, ab illa distincta. Caput crassum, antice sub-rotundatum, supra parum convexum, flavescens; vertice nigro, linea intra oculari e punctis parvis flavidis; fronte nigra, apicem versus utrinque lineolis transversis, inferne linea brevi, longitudinali, flavis; genis flavis, suturis punctoque minutissimo utrinque infra oculum, nigro-fuscis; oculis ovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae capite cum thorace paulo longiores, fuscae. Thorax latitudine multo brevior, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, subtilissime transversim strigosus, pallide flavus. Scutellum triangulare, similiter coloratum. Hemelytra sub-deflexa, abdomine longiora, apice anguste rotundata, dilute flavescentia, sub-pellucida, apice ipso leviter infuscata. Alae albidae, nervis haud infuscatis. Corpus subtus flavum, pectore medio, ventre abdominisque dorso nigris, segmento ultimo et genitalibus flavis, vagina nigra, apice dilute ferruginea. Pedes pallide flavi; femoribus basi obsolete nigro-punctatis.

14. *Thamnotettix 5-notata*: angusta, flavo-virescens; capite obtuse triangulari, supra maculis 5 rotundis, tribus posterioribus minoribus scutellique 2 nigris; fronte vel immaculata (♂), vel inter antennis plaga sub-quadrata, inferne emarginata, nigra (♀); hemelytris obsolete fusco-lineatis; corpore nigro, anguste flavo-marginato; fe-

moribus basi tibiisque anterioribus extus nigro-lineatis; tibiis posticis intus linea, extus punctis nigris notatis. ♂♀. Long. 5 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 159, n:o 13.

Habitat in gramine locis paludosis mense Augusti 1835 in Dalecarlia, rarius.

Magnitudo, statura et similitudo *T. quadri-punctatae*, signaturis capitis et hemelytrorum, ab illa differt. Caput crassum, obtuse triangulare, supra fere planum, sub-nitidum, flavo-virescens, in apice verticis maculis duabus majoribus, rotundatis tribusque versus basin, transversis, minoribus, nigris; fronte in mare immaculata, in femina inter antennis plaga sub-quadrata, inferne emarginata, nigra; genis flavis, immaculatis; oculis sub-ovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae longitudine fere dimidii corporis, flavae, articulo apicali nigro, seta extrorsum fuscescente. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, obsolete transversim strigosus, flavo-virescens, non procul ab apice punctis duobus vel quatuor minutissimis, obsoletis, nigro-fuscis. Scutellum triangulare, flavo-virescens, utrinque macula parva, rotunda, fusca, sub thorace fere occultata, insignitum. Hemelytra deflexa, abdomine dimidio longiora, apice anguste rotundata, flavo-virescentia, a basi ultra medium plus minusve distincte fusco-lineata, margine laterali apiceque fere pellucida. Alae albae, nervis dilute fuscis. Corpus nigrum, pectore abdomineque anguste flavo-marginatis; genitalibus feminae nigro-fuscis. Pedes pallide flavi; femoribus basi tibiisque anterioribus extus fusco-lineatis; tibiis posticis intus linea, extus punctis pro

insertione spinarum nigris; tarsis posticis subtus infuscat.

15. *Thamnotettix intermedia*: angusta, flava; capite obtuse triangulari, maculis verticis septem inaequalibus, nigris, quatuor anterioribus majoribus, fere confluentibus, tribus posterioribus parvis, intermedia obsoletiori; fronte vel immaculata (♂), vel utrinque nigro-lineata (♀); scutello basi nigro tri-maculato; corpore nigro, segmentorum apicibus angustissime flavidis; femoribus basi nigro-variegatis, tibiis posticis intus linea, extus punctis nigris notatis; tarsis posticis fusco-annulatis. ♂♀. Long. 4 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 159, n:o 14.

Habitat in gramine locis paludosis; ad Råbäcken Bottniae borealis, ad Quickjock et in Dalecarlia mense Augusti, parce.

Statura et summa similitudo *T. 4-notatae*, signaturis capitis, ab illa mox dignota. Caput crassum, apice obtuse triangulare, supra paulo convexum, parum nitidum, flavum, maculis septem nigris notatum, scilicet inter oculos in margine antico verticis quatuor, transversis, majoribus, fere connexis, mediis semilunatis et pone illas tribus, minutis, intermedia obsoletiori, transversim locatis; fronte maris immaculata, feminae utrinque in medio breviter, transversim nigro-lineata; genis flavis, suturis infuscat; oculis subovatis, modice convexis, glaucis. Antennae longitudine fere dimidii corporis, basi flavae, apice fuscescentes. Thorax brevis, transversus, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis, supra paulo convexus, obsoletissime transversim strigosus, subnitidus, flavo-virescens. Scutellum triangulare, flavo-virescens, basi maculis tribus, saepe sub

thoracis margine retractis et apicem versus cruce tenui impressa, nigris. Hemelytra deflexa, abdomine fere dimidio longiora, apice anguste rotundata, nitida, sordide flava, apice magis hyalina, nervis pallidioribus. Alae albidae, nervis dilute fuscis. Corpus subtus nigrum, pectore ventrique et interdum segmentis abdominis apice anguste flavo-marginatis; genitalibus feminae pallidis, subtus in medio cum vagina infuscat. Pedes flavi; femoribus basi plus minusve nigro-variegatis et inferne similiter lineatis; tibiis posticis intus linea, extus punctis nigris notatis; tarsis subtus infuscat.

16. *Thamnotettix adumbrata*: angustior, pallida; capite sub-triangulari, nigro sex-maculato, thorace linea antice abbreviata, postice in scutellum continuata hemelytrorum sutura et vitta longitudinali, postice abbreviata, nigro-fuscis; corpore subtus in medio baseos lineaque utrinque laterali nigris; pedibus nigro-lineatis et punctatis. ♂♀. Long. $3\frac{1}{2}$ millim.

Cicada adumbrata. SAHLB. Acta Fennica. I, p. 91.

Thamnotettix id. BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 159, n:o 15.

Habitat in gramine locis aridis; ad Skuggan prope Holmiam mense Augusti sat frequenter.

T. 7-notata vix longior, sed nonnihil robustior. Caput antice sub-triangulare, crassiusculum, supra paulo convexum, pallidum, sub-nitidum, maculis nigris notatum, una scilicet in vertice ad marginem posticum, sat magna, tribusque in apice verticis, transversim positae, rotundatae, media interdum inferne bifida et in frontem continuata; ad suturam denique inter genas et rostrum, infra insertionem antennarum macula

utrinque oblonga; oculis sub-ovatis, nigris, in mortuis glaucis. Antennae basi flavescentes, seta capite cum thorace longiore, fusca. Thorax antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; pallidus, subnitidus, subtiliter transversim strigosus et antice utrinque stria brevi impressa; linea media, longitudinali, antice abbreviata et per totum scutelli longitudinem continuata nigro-fusca. Scutellum triangulare, pallidum. Hemelytra deflexa, corpore nonnihil longiora, apice late rotundata, cinereo-pellucida, margine laterali nervisque albidis; vitta longitudinali disci a basi ultra medium continuata, sutura et interdum margine apicali fuscis. Corpus pallidum, abdomine nigro, supra marginibus et feminae vitta media subtus dimidio apicali cum genitalibus utriusque sexus pallidis. Pedes pallidi, plus minusve distincte nigro-punctati, postici subtus nigro-lineati.

17. *Typhlocyba* (*Cicadula* ZETT.) *Wahlbergi*: angusta, pallide flava; capite rotundato; vertice, thoracis medio scutellique basi macula communi, magna, sub-rhombea, fusca notatis; hemelytris plaga dorsali, communi, dilute fusca; tarsis apice nigris. ♀. Long. 4 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, n:o 16.

Habitat in foliis Fraxini ad diversorium Ingared inter Gothoburgum et Alingsåsiam mense Julii sat copiose. Pro more conspicerum arbores circumvolat; in Scania a Dom. C. J. SUNDEVALL etiam lecta.

Species pulchra et distinctissima. Magnitudo *Typhl. smaragdulae*. Caput breve, crassum, apice rotundatum, supra modice convexum, pallide flavum; vertice medio plaga magna, antice rotundata, fusca, linea longitudinali obscuriori divisa;

oculis sat magnis, lateralibus, sub-ovatis, glaucis. Antennae pallide flavae. Thorax latitudine media dimidio brevior, antice rotundatus, postice late, sat profunde emarginatus, angulis basalibus oblique truncatis; supra modice convexus, subtiliter transversim strigosus, pallide flavus, dorso plaga magna antice nonnihil angustata, fusca, decoratus. Scutellum magnum, triangulare, dilute fusco-brunneum, apice flavum. Color verticis, thoracis scutellique fuscus, maculam magnam, rhombeam, communem, format. Hemelytra elongata, abdomine dimidio longiora, apice anguste rotundata, pallide flava, sub-pellucida, nitida, fere in medio dorsi plaga sat magna, transversa, communi, fusca. Alae albae, pellucidae, nervis haud infuscatis. Corpus undique pallide flavum. Pedes graciles, pallide flavi; tarsi apice nigrofusci.

18. *Typhlocyba mollicula*: angusta, pallide flava; capite triangulariter producto; pectore antice utrinque macula sub-triangulari nigra; hemelytris pellucidis; abdomine plaga magna dorsali nigra, subtus flavido, segmentorum basi anguste nigris; tarsi apice fuscescentibus. ♂♀. Long. 3 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, n:o 17.

Habitat in Smolandia ad Anneberg in copula capta; prope Holmiam ad Haga rarius.

Typhl. citrinellae ZETT. proxima et illa longitudine fere aequalis, nonnihil tamen robustior, colore magis flavescente, maculis pectoralibus, abdomine supra nigro, ab affiniibus facile dignoscitur. Caput breve, crassum, apice triangulariter productum, totum pallide flavum, immaculatum; oculis lateralibus, sub-ovatis, glaucis. Antennae capite cum thorace parum longiores,

pallide flavae, seta extrorsum fuscescente. Thorax latitudine dimidio brevior, antice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, obsolete transversim strigosus, sub-nitidus, pallide flavus. Scutellum magnum, sub-triangulare, similiter coloratum. Hemelytra angusta, deflexa, abdomine dimidio longiora, apice anguste rotundata, pallide flavescentia, sub-nitida, pellucida. Alae albae, nitentes, nervis concoloribus. Corpus subtus flavum; pectore utroque ante insertionem pedum anticorum macula sat magna, triangulari, nigra; abdomine supra in dorso nigro, marginibus lateralibus et subtus flavo, segmentorum ventralium apicibus in mare omnibus, in femina basalibus tantum nigro-marginatis; genitalibus flavis. Pedes graciles, pallide flavi, tarsi apice dilute fuscescentibus.

19. *Typhlocyba Coronula*: angusta, pallide flava; capite obtuse triangulariter producto, supra in medio macula magna, antice attenuata, medio constricta, coroneiformi, nigro-fusca; thorace linea media postice evanescente scutelloque maculis tribus basalibus apiceque nigro-fuscis; hemelytris flavo-pellucidis; abdomine dorso nigro; pedibus immaculatis; tarsis apice fuscescentibus. ♀. Long. $2\frac{1}{2}$ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, n:o 18.

Habitat in Smolandia ad Anneberg rarissime.

Parva. *Typhl. tenellae* nonnihil minor, gracilior. Caput breve, crassum, apice triangulariter productum, pallide flavescent; vertice medio macula magna, coroneiformi, antice angustata, ibique evidenter constricta, nigro-fusca; oculis lateralibus, sub-ovatis, modice convexis, glaucis. Antennae capite cum thorace nonnihil longiores, testaceae,

seta extrorsum dilute fuscescente. Thorax latitudine dimidio brevior, antice rotundatus, postice sub-truncatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, obsolete transversim strigosus, pallide flavus, medio lineola longitudinali, antice nonnihil abbreviata postice evanescente, nigro-fusca. Scutellum magnum, triangulare, pallide flavum, basi maculis tribus subtriangularibus, media majore apiceque nigro-fuscis. Hemelytra deflexa, corpore dimidio longiora, apice anguste rotundata, pallide flava, sub-pellucida. Alae albiae, apice metallice splendentes. Corpus subtus flavum, abdominis dorso nigro; genitalibus feminae flavis, vagina apice dilute infuscata. Pedes graciles, pallide flavi; tarsi apice fuscescentibus.

20. *Typhlocyba pullula*: angusta, supra pallida; capite obtuse triangulari, supra fusco-variegato; fronte utrinque breviter fusco-lineata; rostro fusco; thorace antice obsolete fusco-bimaculato, scutello maculis 2 basalibus et tertia apicali, nigris; hemelytris pellucidis; corpore nigro, subtus apicibus segmentorum flavo marginatis; tarsi apice fuscescentibus. ♂♀. Long. $2\frac{1}{4}$ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 160, n:o 19.

Habitat in gramine pratorum Oelandiae mense Julii, rarius.

Inter minoribus hujus generis *Typhl. vittatae* magnitudine aequalis. Caput crassum, obtuse triangulare, supra paulo convexus, pallidum, antice fusco-adumbratum, arcu utrinque inter oculos lineaeque basali media longitudinali fuscis; fronte dilute flava, utrinque transversim crebre et breviter fusco-lineata, lineis tamen interdum fere confluentibus; genis immaculatis; rostro leviter infusato; oculis sub-ovatis, modice con-

vexis, nigris. Antennae capite cum thorace non-nihil longiores, basi pallide flavae, seta basi incrassata, extrorsum fuscescente. Thorax sat brevis, antice rotundatus, postice evidenter, late emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, obsoletissime transversim strigosus, medio saepe dilute infuscatus, non procul ab apice punctis binis, sub-approximatis, transversis, saturatoribus, interdum obsoletis. Scutellum triangulare, fere planum, macula utrinque basali, sat magna, subtriangulari et alia minori, in ipso apice, nigris. Hemelytra deflexa, abdomine longiora, apice anguste rotundata, pallida, sub-pellucida, certo situ pulchre cyaneo-micantia. Alae albae, nervis dilute fuscis. Corpus subius nigrum, pectore abdomineque lateribus et segmentorum apicibus flavo-marginatis; genitalibus feminae nigro-fuscis, valvulis inferne dilutioribus. Pedes pallidi; tibiis posticis pro insertionem spinarum obsolete nigro-punctatis; tarsis apice fuscescentibus.

21. *Typhlocyba parvula*: angusta, pallida; capite rotundato, supra maculis duabus, magnis, rotundatis, nigris; genis inferne rostroque nigro-fuscis; thorace pallide fusco, antice flavo-marginato; scutello nigro bi-maculato; hemelytris subhyalinis, margine interiore leviter infuscatis; corpore nigro, abdomine anguste flavo-marginato; tarsis apice fuscescentibus. ♂. Long. 2½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, n:o 20.

In gramine ad Holmiam semel lecta.

E minoribus. *Typhl. tenellae* affinis, nonnihil minor, capite tantum nigro bi-maculato, fronte non fusco-lineata, ab illa facile distincta. Caput crassum, breve, apice rotundatum, pallide flavum, in margine antico inter oculos maculis duabus

transversis, sat magnis, rotundis, nigris; fronte non lineata; genis inferne rostroque nigro-fuscis; oculis lateralibus, ovatis, modice prominulis, nigris. Antennae capite cum thorace longiores, basi flavae, seta ad medium incrassata, dein leviter fuscescente. Thorax latitudine multo brevior, antice sub-rotundatus, postice fere truncatus, angulis baseos obtusis; supra paulo convexus, subtilissime transversim strigosus, pallide fuscus, antice flavo-marginatus. Scutellum sat magnum, triangulare, pallide flavum, maculis duabus basilibus, sub-triangularibus, nigris. Hemelytra deflexa, abdomine dimidio longiora, apice anguste rotundata, pallida, sub-hyalina, margine interiore leviter infuscata. Alae albae, metallice splendentes. Corpus subtus nigrum, abdomine tenuiter flavo-marginato. Pedes graciles, pallide flavescentes, immaculati; tarsis apice fuscescentibus.

22. *Typhlocyba Zetterstedti*: angusta, flavo-virescens; capite sub-rotundato, supra nigro bimaculato; thorace maculis septem, scutelloque tribus nigris; hemelytris oblique fusco-lineatis; corpore subtus nigro, segmentis apice flavis; pedibus dilute flavis, tibiis posticis obsolete nigropunctatis, tarsis apice infuscatissimis. ♂♀. Long. 4—4½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, n:o 21.

Habitat in foliis Tiliae parvifoliae ad Åkerström Bahusiae mens. Jul et Aug. passim. Prope Holmiam ad Bellevue in foliis Alni glutinosae.

Typhlocybae elegantulae haud longior, sed nonnihil robustior. *T. urticae* primo intuitu similis, sed dimidio major et ab illa abunde distincta. Caput breve, crassum, apice sub-rotundatum vel angulariter obtuse nonnihil productum, supra paulo convexus pallide flavum, antice inter

oculos maculis duabus magnis, rotundatis, nec non in medio marginis posterioris macula parva triangulari, nigris; fronte flava, immaculata, suturis interdum infuscatis; genis in mare immaculatis, in femina saepe macula rotunda mox infra oculos, nigra, notatis; oculis lateralibus, sub-ovatis, glaucis. Antennae longitudine capitiz cum thorace, basi pallide flavae, seta extrorsum fuscescente. Thorax latitudine dimidio brevior, apice rotundatus, postice late, leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, subtilissime transversim strigosus, pallide flavus, maculis septem nigris decoratus, nempe duabus in margine antico, rotundis, interdum obsoletis, quinque fere in medio, transversis, lateralibus parvis, obsoletis, media oblonga, margine antico nonnihil magis approximata. Scutellum magnum, triangulare, flavum, basi maculis duabus magnis, triangularibus et intra apicem macula transversa, angulata, nigris, apice ipso flavo. Hemelytra deflexa, corpore dimidio longiora, apice rotundata, sub-nitida, flavo-virescentia, lineis longitudinalibus tribus fuscis, quarum prima seu interior prope scutellum, basi abbreviata, longe ante medium marginis excurrit, secunda a basi fere ad medium marginis interiore ducta, ibique cum prima confluenta, tertia in disco, a basi longe ultra medium continuata; apice ipso plus minusve leviter infuscata. Alae subhyalinae, nervis dilute fuscis. Corpus subtus nigrum, flavo variegatum et marginatum, genitalibus feminae nigro-fuscis, vagina basi ferruginea, apice testacea. Pedes graciles, pallide flavi; tibiis posticis pro insertionem spinarum obsolete nigro-punctatis, tarsis apice fuscis.

23. *Typhlocyba aureola*: angusta, pallide flava; capite rotundato, supra maculis 2 magnis, rotundatis, postice sub-approximatis, nigris; suturis intra frontem et genas late nigris; thorace apice maculis 2 vel 4, exterioribus magnis, scutelloque maculis 2 basalibus, nigris; hemelytris disco maculis irregularibus, pallide fuscis maculisque 2 nigris, una rotundata, ante medium, dorsali, altera pone medium, ad marginem anteriorem; corpore nigro-flavoque variegato, apicibus segmentorum flavis; tarsis apice nigro-fuscis. ♂♀. Long. 3½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, n:o 22.

Habitat ad Anneberg Smolandiae mense Augusti, rarius.

Statura et summa similitudo *Typhl. auratæ*, sed semper minor, thorace latiore, brevior, maculis lateralibus minoribus, apice magis distantibus, ibique non introrsum dilatatis, ab illa differre videtur. Caput crassum, apice rotundatum, supra paulo convexum, pallide flavum, parum nitidum, intra marginem posticum, maculis duabus magnis, rotundis, sub-obliquis, posterius saepe approximatis, nigris; fronte immaculata, infra oculos in futura vitta apicem versus attenuata, nigra; oculis lateralibus, sub-ovatis, modice prominulis, glaucis. Antennae testaceae, seta basi incrassata, extrorsum fuscescente. Thorax latitudine postica dimidio brevior, antice rotundatus, basi sub-truncatus, angulis baseos oblique truncatis; supra modice convexus, vix transversim strigosus, pallide flavus, in margine antico utrinque macula sat magna, rotunda, postice non dilatata et in medio marginis interioris punctis 2 parvis, approximatis, nigris. Scutellum sat

magnum, triangulare, nigrum, medio linea longitudinali apiceque flavis. Hemelytra deflexa, abdomine dimidio longiora, apice late rotundata, pallide hyalino-flava, lucida; macula oblonga, ante medium suturae et altera mox pone medium marginis exterioris, nigro-fuscis; vitta disci inaequali et fascia transversa intra apicem, pallide fuscis. Corpus subtus nigrum, lateribus pectoris segmentisque abdominis apice anguste flavis; genitalibus maris flavo-variegatis, feminae valvulis inferne flavo-marginatis. Pedes graciles, pallide flavi; tibiis posticis longe spinosis; tarsis apice dilute infuscatiss.

24. *Bythoscopus falcifer*: oblongus, capite late rotundato, macula utrinque verticali et altera ad basin rostri atris, linea longitudinali ad oculos, fronte rostroque signaturis nigris; thorace fusco, vitta media maculisque pallide flavis; scutello nigro, antice in medio signis duabus falciformibus, margine laterali lineaque apicali flavis; hemelytris sordide hyalinis, nervis sat validis, nigro-fuscis, plaga dorsali ante medium, arcu pone medium maculisque minoribus disci albis; pedibus pallidis, femoribus maculis, tibiisque lineis nigro-fuscis; tarsis fusco-annulatis. ♂♀. Long. 6 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 161, no 23.

Mas: obscurior, antennarum clava atra, seta brevi terminata; fronte inferne vitta utrinque in rostro continuata, nigra.

Femina: antennis setaceis; fronte inferne nigro-irrorata, signo in basi rostri forma soleae ferrae.

Habitat in Populo Tremula ad Gusum mensibus Julii et Augusti, passim, Dom. P. F. WAHLBERG.

Magnitudine fere *B. liturati*, sed posterius paulo magis attenuatus, signaturis capitis, thoracis scutellique, a conspeciebus facile et bene distinctus. Caput latum, crassum, late rotundatum, pallidum, a parte antica visum, utrinque linea ad oculum, velut maculis tribus raro quatuor, plus minusve confluentibus, formata, nigro-fuscis, in femina dentata; macula utrinque verticali et altera ad basin rostri, parvis, rotundatis, atris; plaga magna media, verticali, dilute fusca, inferne rotundata, superne bifida, interdum praesertim in femina obsoleta; fronte inferne in mare vitta utrinque in rostrum continuata, nigro-fusca, in femina transversim fusco-variegata, ad basin rostri signo forma soleae ferreae notata; genis pallidis, medio longitudinaliter dilute infuscatis; oculis lateralibus, modice convexis, nigro-fuscis. Antennae breves, pallidae. Thorax latitudine postica duplo brevior, antice rotundatus, postice leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra parum convexus, fuscus, vitta media sat lata, antice nonnihil abbreviata, ibique saepe arcu tenui maculisque nonnullis lateralibus plus minusve distinctis et interdum confluentibus, pallidis. Scutellum triangulare, nigrum, antice in medio signis duabus falciformibus, margine laterali a basi ultra medium lineaque longitudinali, apicali, pallide flavis. Hemelytra deflexa, apicem versus attenuata, abdomine dimidio longiora, sordide hyalina, situ diverso pulchre aureo-vel cyaneo-nitentia; nervis sat validis, inaequaliter infuscatis; plaga ante, arcu pone mediam longitudinem; maculisque in disco tribus vel quatuor longitudinalibus, minoribus, albis. Plaga interdum magna, nigro-fusca, in medio dorsi, communis, adest. Alae albae, hyalinae, nervis dilute fuscis. Corpus

pallidum; pectore nigro, segmentis abdominis plus minusve nigro-tinctis, in individuis obscurioribus, nigris, apice tenuiter pallidis. Pedes pallidi; femoribus plus minusve infuscatiss; tibiis nigro-fusco lineatis tarsisque fusco-annulatis.

25. *Jassus Tiliae*: breviusculus, brunneus (♂), aut pallide testaceus (♀); capite thoraceque lutescentibus, hoc ante marginem thoracis non prominente, illo antice obtuse triangulariter producto, scutello magno, triangulari, immaculato; hemelytris tenuiter nervosis. ♂♀. Long. 5—5½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 162, n:o 24.

Habitat in foliis *Tiliae*, mens. Julii et Augusti ad diversorium Ingared non procul ab Alingsåsiam; ad Åkerström Bahusiae vulgaris, nec non ad Holmiam parce lectus.

Jasso fruticola nonnihil longior at multo crassior, capite ante marginem thoracis non prominente ut et colore, a conspiciendis facile distinctus. Caput deflexum, subtiliter confertim punctulatum, medio carinula longitudinali, parum elevata, utrinque abbreviata; totum luteum, subnitidum, immaculatum; ocellis distinctis; oculis sub-rotundatis, lateralibus, modice prominulis, glaucis. Antennae infra oculos foveis profundis sitae, breviusculae, flavae, seta haud infuscata. Thorax latitudine plus duplo brevior, antice obtuse triangulariter productus, postice late aequaliter emarginatus, angulis baseos sub-oblique truncatis; lutescens, parum nitidus. Scutellum magnum, triangulare, subtiliter crebre punctulatum, ante apicem arcuatim impressum, apice carinatum, in mare obscure in femina dilute testaceum. Hemelytra incumbentia, abdomine dimidio lon-

giora, apice late rotundata, obscure testacea, interdum obsolete fusco-irrorata et apice ad suturam infuscata (♂), vel dilutius testacea, subpellucida (♀); nervis distinctis, sub-elevatis concoloribus. Alae albae, nervis dilute infuscatis. Corpus subtus in mare nigro-fuscum, flavo-variegatum, in femina testaceum, immaculatum. Pedes flavi; tibiis posticis extus canaliculatis, bifariam nigro-punctatis; tarsis apice infuscatis.

26. *Jassus scutellatus*: brevior, crassus, pallido fuscoque variegatus; capite obtuse triangulari, vertice nigro-maculato, genis pone oculos macula triangulari, nigra; scutello pallido, basi sub thoracis margine utrinque macula triangulari, nigra, antice conjuncta; hemelytris pallide fusco-griseis, valide nervosis; tibiis posticis extus macula parva nigra. ♂♀. Long. 4—5 millim.

Jassus id. Dom. ZETTERSTEDT in litt. — BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 162, nro 25.

Habitat in Scania; a Dom. ZETTERSTEDT et SUNDEVALI benevole communicatus.

Statura crassa praecedentis, sed semper nonnihil minor. *J. fruticola* vix longior sed multo robustior, signaturis valde varians; pictura scutelli, ab affinibus bene distinctus. Caput breve, crassum, pallide flavum, confertim punctulatum, maculis quatuor parvis, quadratim dispositis, scilicet 2 in vertice et 2 inferne intra oculos, infra illas lineolis binis, brevibus, obliquis, magis approximatis, nigris; maculis in fronte, maris praesertim, interdum vario modo confluentibus, plagam magnam flavo-variegatam efficientibus; genis flavis, pone oculos macula triangulari, nigra notatis; oculis sub-trigonis, modice prominulis, glaucis. Antennae infra oculos foveolis sat profundis insertae, breviusculae, basi flavae, extror-

sum fuscrescentes. Thorax latitudine duplo brevior, apice obtuse triangulariter productus, postice leviter emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra modice convexus, sat crebre evidenter punctulatus, sordide flavus, dorso plus minusve fusco-irroratus, utrinque versus apicem macula oblonga, nigro-fusca; interdum obscure fuscus, parce flavo-variegatus. Scutellum sat magnum, triangulare, apice acutiusculum, flavum, utrinque in basi macula sat magna, triangulari, antice conjuncta, nigra, medio litura ancoraeformi, vel interdum stria tantum transversa impressa, punctisque duobus ante illam parvis, transversis, fuscis. Hemelytra abdomine longiora, apice late rotundata, pallide fusco-grisea, sub-hyalina, nervis validis, elevatis, fuscis. Corpus subtile pallidum, nigro-variegatum; abdomine in mare nigro, segmentis apice flavo-marginatis; in femina flavo, nigro-marginato, in utroque sexu supra nigro, segmentis apice flavis. Pedes pallide flavi; tibiis posticis extus in basi macula parva et intus saepe linea brevi, nigra, notatis; tarsis apice infuscatis.

27. *Jassus Rubi*: brevior, crassus, pallidus; capite obtuse triangulari, maculis septem genisque pone oculos macula triangulari, nigris; thorace margine antico utrinque macula sinuata nigra; scutello utrinque macula basali, sub-triangulari, vitta media postice abbreviata, punctisque duobus nigris; hemelytris fusco-brunneis (♂), vel pallidis, sub-hyalinis (♀), tenuiter nervosis; tibiis posticis basi extus macula parva nigra. ♂♀. Long. 3½—4½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 162, n:o 26.

Var. β. maculis tribus intra ocularibus confluentibus. ♂.

Var. γ. maculis tribus intra ocularibus et duabus in apice frontis confluentibus; scutello nigro, utrinque flavo-marginato punctisque duobus parvis transversis flavis; hemelytris medio pellucidis. ♂.

Var. δ. caput ut in var. γ. signaturis nigris scutelli confluentibus.

Var. ε. caput ut in var. γ; scutello nigro, flavo-marginato, apice flavo, nigro bipunctato; hemelytris ut in a.

Habitat in foliis Rubi idaei ad Åkerström et Marstrand (WAHLBERG) Bahusiae mens. Julii et Augusti sat frequenter; in Smolandia ad Anneberg parce, in Westrogothia semel captus; in Ostrogothia ad Gusum Dom. WAHLBERG.

Affinis certe praecedenti, sed semper minor, signaturis capitis et scutelli, nervisque tenuioribus, ab illo certe distinctus. Caput breve, crassum, obtuse triangulare, subtiliter crebre punctulatum, pallidum, maculis nigris saepe confluentibus variegatum, scilicet duabus non procul a basi, sat magnis, rotundis, 2 parvis in medio frontis, maculam magnam inter se includentibus, infra illas binis aliis, sat magnis, magis approximatis, inferne acuminatis; genis pone oculos macula subtriangulari, nigra, notatis; oculis sub-trigonis, modice convexis, glaucis. Antennae infra oculos foveolis sat profundis insertae, breviusculae, flavae, seta dilute fuscescente. Thorax latitudine duplo brevior, antice obtuse triangulariter productus, basi sat profunde emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra modice convexus, subtiliter, confertim, oblique aciculatus, sub-nitidus, pallide flavus, apice maculis quinque, transversis, antice saepe confluentibus, nigris. Scutellum sat magnum, triangulare, apice acutiuscu-

lum, pallide flavum, basi utrinque macula sat magna, vitta media apice abbreviata, maculisque duabus parvis, rotundis, transversis, in medio positis, nigris. Hemelytra abdomine nonnihil longiora, apice late rotundata, in mare fusco-brunnea, in femina pallida, sub-hyalina, nervis elevatis, tenuibus, concoloribus. Corpus nigrum, pallide-variegatum; genitalibus in utroque sexu pallidis. Pedes flavi; tibiis posticis extus ad basin macula parva, nigra; femoribus interdum obsolete nigro-variegatis; tarsis apice fuscis.

28. *Jassus Alni*: oblongus, rufo-brunneus; capite obtuse triangulariter producto, basi carinato, maculis 2 magnis, pallidis, punctis 4 parvis, antice inferne linea tenui, obliqua, rostroque basi punctis 2 minutissimis, nigris; thorace utrinque in margine antico nigro-maculato, postice pallido-marginato; scutello rufo, punctis 2 parvis, nigris; hemelytris basi circa scutellum, plaga dorsali media et altera laterali versus apicem, albidis; tibiis posticis extus nigro-lineatis et punctatis. ♂♀. Long. 5—5½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 163, nro 27.

Var. β. hemelytris pallidis, sub-pellucidis, nervis fuscis. ♂♀.

Habitat in foliis *Alni glutinosae* sat frequens; in Smolandia ad Anneberg; in Westrogothia et ad Holmiam mensibus. Jul. et Aug.; in Scania. Dom. SUNDEVALL; in Ostrogothia ad Gusum Dom. Prof. WAHLBERG.

Statura et summa similitudo *J. fruticolae*, sed semper fere dimidio major; signaturis capituli scutellique ut et habitatione, certe ab illo distinctus. Caput breve, crassum, obtuse triangulariter productum, subtiliter confertim punctatum; vertice breviter carinatum, rufo-brunneum,

inter oculos plaga transversa, dilute flava, maculis utrinque 2 longitudinalibus, et inferne lineolis 2 brevibus, obliquis, magis approximatis, nigris; rostro basi punctis binis, minutissimis, nigris; genis pallide flavis, immaculatis; oculis sub-trigonis, modice convexis, dilute brunneis. Antennae breves, infra oculos foveolis sat profundis insertae, pallide flavae, seta extrorsum fuscescente. Thorax latitudine duplo brevior, antice obtuse triangulariter productus, postice late emarginatus, angulis baseos oblique truncatis; supra paulo convexus, confertim, transversim rugulosus, dorso carinula obsoleta instructus, rufo-brunneus, sub-opacus, utrinque in margine antice pone oculos maculis 2 vel 3 parvis, nigris. Scutellum sat magnum, triangulare, apice antiusculum, rufum, medio maculis 2 parvis, transversis, rotundatis, approximatis, nigris, pone illas linea transversa, utrinque abbreviata, impressa. Hemelytra abdomine nonnihil longiora, apice late rotundata, rufo-brunnea, sub-nitida, basi circa scutellum, macula parva, oblonga, communi, dorsali plagaque laterali versus apicem, albido pellucidis; nervis elevatis, sat validis, fuscis. Alae sordide albae, nervis dilute fuscis. Corpus subtus pallide testaceum, supra cum genitalibus ferrugineum; vagina feminae nigro-fusca. Pedes testacei; femoribus interdum extus tenuissime tibiisque posticis evidenter nigro-lineatis; tarsis apice infuscatis.

29. *Jassus fuscinervis*: oblongus, griseo-fuscus; capite acutius triangulariter producto, sordide flavo, maculis quinque nigris; scutello nigro-fusco; hemelytris nervis transversis mediis fortius infuscatis; corpore subtus flavo-variegato (♂), vel flavo immaculato (♀); pedibus pallide testaceis, tibiis posticis extus basi macula parva,

nigra, notatis; tarsis apice fuscis. ♂♀. Long. 5 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 163, n:o 28.

Habitat in foliis Betulae albae mensibus Jul. et Aug. ad Anneberg Smolandiae minus frequens; in Ostrogothia ad Gusum Dom. WAHLBERG.

Magnitudo, statura et affinitas *J. fruticolae*, capite antice acutius triangulariter producto ut et signaturis aliis, ab illo bene distinctus. Caput breve, crassum, apice acute triangulariter productum, confertim punctulatum, basi carinula brevi, longitudinali, instructum, sordide flavum, intra marginem posticum maculis tribus, transversis, media majori, margine basali nonnihil magis approximata, et in medio frontis maculis duabus, minoribus, sub-approximatis, nigris; genis flavis, in medio macula rotunda, nigra; oculis sub-trigonis, modice convexis, nigris. Antennae infra oculos foveolis sat profundis insertae, breviusculae, flavae, seta fuscescente. Thorax latitudine duplo brevior, antice triangulariter, obtuse productus, postice late, sat profunde emarginatus, angulis basalibus oblique truncatis; supra paulo convexus, subtiliter, confertim ruguloso-punctatus, medio longitudinaliter, tenuiter carinatus, griseo-fuscus, utrinque in margine antico pone oculos macula transversa, obscuriore, margine postico saepe dilutiore. Scutellum sat magnum, triangulare vel nigro-fuscum, immaculatum, vel obsolete brunneo-bivittatum. Hemelytra corpore nonnihil longiora, apice late rotundata, dilute fusca, nervis mediis transversis fortius infuscatis. Alae albido-hyalinae, metallice nitentes, nervis dilute fuscis. Corpus subtus in mare nigrum, flavo-variegatum, in femina flavum, pectore nigro-va-

riegato; supra in utroque sexu nigrum; genitalibus feminae fuscis, subtus pallido marginatis, vagina ferruginea. Pedes flavi; tibiis posticis extus basi macula parva nigra; tarsis apice infuscatis.

30. *Delphax speciosa*: oblonga fusca; thorace, scutello medio, antennis pedibusque pallidis; scutello magno, apice valde producto; hemelytris pellucidis, macula sub-cuneata basali, fascia semicirculari pone medium maculaque parva dorsali, nigro-fuscis; tarsis anterioribus infuscatis. ♂. Long. 5½ millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 165, n:o 29.

In gramine loco uliginoso, ad litus maris in Insula Wermö prope Tollare, specimen unicum d. 28 Junii 1842 lectum.

Species pulchra et distinctissima. *Asiracae crassiornis* mari primo intuitu similis, longior tamen et gracilior, antennarum structura, vertice magis producto, ab illa abunde distincta. Caput mediocre, supra fere planum, dilute fuscum, postice pallidius, vertice quam in *A. crassiorni* angustiori, magis producto, sub-rotundato, supra apicem versus paulo elevato, tri-carinato, carinis lateralibus obliquis, in fronte continuatis; fronte deflexa, plana, fusca; oculis rotundatis, modice convexis, nigris, infra ad insertionem antennarum emarginatis. Antennae seta excepta, longitudine capitis cum thorace, sordide pallidae; articulo primo anguste obconico, secundo cylindrico, supra tuberculato, primo nonnihil longiore et crassiore, truncato, seta apicali, capillari, fuscescente. Thorax brevis, transversus, postice leviter emarginatus, pallidus, utrinque infuscatus. Scutellum latitudine brevior, apice bi-sinuaturn, lobo medio retrorsum valde producto, acutiusculo; parum con-

vexum, antice medio obsolete carinatum, pallide flavum, linea media et apice albescentibus, lateribus infuscatis. Hemelytra incumbentia, corpore fere duplo longiora, apice late rotundata, pallida, pellucida, sub-nitida, macula basali, longitudinali, sub-cuneiformi, postice truncata, mox pone medium fascia semicirculari, margine exteriori orta, ad interiorem oblique ducta apicemque cingente, et macula denique parva elongata, dorsali, in medio posita, nigro-fuscis; striga praeterea angusta, obliqua, fusca, ante apicem alae, in medio fere speculi, a fascia apicali inclusa. Alae albidae, nervis fuscis. Corpus subtus nigro-fuscum, segmentis basalibus utrinque macula flava notatis angustaeque flavo-marginatis. Pedes pallidi; femoribus linearibus, sulcatis, obsolete fusco-lineatis; tibiis rectis, anterioribus simplicibus, posticis extus dentibus binis et calcare apicali longiore, intus apice appendice magno crasso, acutiusculo, instructis; tarsis anterioribus infuscatis.

31. *Delphax limbata*: oblonga, pallide flavo; capite obtuso et thorace brevi, flavis, cum scutello brunneo tricarinatis, hemelytris albidis, pellucidis, punctis nervorum fasciaque incurva, semicirculari, pone medium maculaque parva oblonga, dorsali, fusco-umbrinis; abdomine nigro-fusco, lateribus flavo-maculato. ♀. Long. 3½ mill.

Delphax limbata FABR. Ent. Syst. IV, 6, 21.
— Syst. Rhyngot. p. 84, n:o 5 (Sec. Mus. FABRICII). — GERM. Mag. III, 20, 2.

Delphax anceps. GERM. Mag. IV, 105, 10.

Delphax signifera. BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 164, n:o 30.

Habitat

Habitat rarius in gramine locis uliginosis; in Smolandia ad Anneberg mense Augusti; in Bahusia ad Åkerström etiam lecta.

Statura praecedentis, sed fere duplo minor. Caput sat latum, antice late rotundatum, flavo-testaceum, postice nonnihil elevatum, obsolete bifoveolatum, antice tri-carinatum, carinis in fronte deflexa, continuatis; rostro nigro-fusco; oculis ovatis, modice convexis, glaucis, infra ad insertionem antennarum sat profunde emarginatis. Antennae longitudine capitis cum thorace, pallide flavae, articulo primo secundo nonnihil brevior et tenuiore, sub obconico, secundo cylindrico, supra tuberculis parvis, obtusis, verruciformibus obsito, apice truncato, seta capillari, fusca. Thorax brevissimus, postice in medio leviter emarginatus, angulis lateralibus sub-rotundatis; supra paulo convexus, medio carina recta et utrinque alia obliqua, obsolete, interstitiis leviter impressis, sub-nitidus, flavo-testaceus. Scutellum magnum, latitudine thoracis, apice profunde bisinuatatum, lobo medio producto, apice rotundato; fere planum, distincte tricarinatum, dilute brunneum, medio dilutiori. Elytra incumbētia, abdomine duplo fere longiora, apice anguste rotundata, alba, pellucida, nervis sat validis, punctis crebris, umbrinis obsitis; in medio dorsi macula parva, oblonga, communi et mox pone medium fascia semicirculari, a margine exteriorē orta ad interiorē oblique ducta apicemque fere cingente, fusco-umbrinis; nervis apice etiam fuscedine cinctis. Alae albae, pellucidae, nervis dilute fuscis. Corpus subtus nigro-fuscum; pectore flavo-variegato; abdomine utrinque flavo maculato; ge-

nitalibus piceis. Pedes pallide fusci, interdum dilutiores vel pallido-variegati.

32. *Delphax perspicillata*: breviuscula, pallide flava; antennarum articulo primo brevissimo; oculis, macula magna genarum, aliaque parva thoracis, laterali, rotundis, nigris; hemelytris longitudine abdominis, albis, apice anguste obsolete infuscatis, nervis elevatis, immaculatis. ♀. Long. 2 millim.

BOHEM. Vet. Akad. Öfvers. 1845, p. 164, n:o 31.

Habitat in gramine locis uliginosis; ad Anneberg Smolandiae rarius mensib. Aug. et Septembr; in Bahusia ad Åkerström specimen unicum etiam inventum.

Parva, breviuscula. Caput latitudine fere thoracis, antice late rotundatum, supra fere planum, obsolete tricarinatum et bifoveolatum; pallide flavum, infra oculos in genis macula sat magna, rotunda, nigra; fronte convexa, medio obsolete carinata; rostro inflexo, pallide flavo; oculis magnis, ovatis, convexis, nigris, infra ad insertionem antennarum profunde emarginatis. Antennae longitudine capitis, articulo primo secundo duplo brevior et nonnihil angustior, secundo cylindrico, laevi, apice truncato, seta tenui capillari, fusca, antenna longior. Thorax brevissimus, postice in medio late rotundato-emarginatus, angulis lateralibus, sub-rotundatis; modice convexus, tricarinatus, carina media recta, lateralibus sub-obliquis; pallide flavus, in angulo laterali baseos macula minore, nigra, ornatus. Scutellum magnum, sub-triangulare, apice utrinque emarginatum, lobo medio valde producto, acuto; fere planum, tricarinatum, dilute flavum. Hemelytra incumbencia, longitudine abdominis, apice

late rotundata, albido-hyalina, apice ipso saepe angustissime, obsolete infuscata; nervis elevatis, immaculatis Alae incompletae, albae. Corpus subtus dilute flavum, abdomine supra plus minusve infuscato; vagina nigra. Pedes graciles, pallide testacei, immaculati; tibiis posticis basi, medio et apice obtuse dentatis.

D. guttulae GERMAR valde affinis, statura minori, ventreque pallido, immaculato, ut videtur diversa.

late retundata, albedo-hyalina, apice ipso saepe
 angustissima, obsolete inflexa; nervis elevatis
 immixtulis. Alae immixtulis, albedae. Corpus
 subius dilute hyalinum, ad apicem saepe plus mi-
 nuere inflexum, apice nigro. Pedes hyalini.
 pedibus brevibus, immixtulis, articulis brevibus
 ungue et apice apice brevibus.

D. genitalis breviter, vix albidus, alatus
 minor, ventrale pallide, immixtulis, ut videntur
 diversis

Försök till bestämmande af chromens atomvigt;

af

N. J. BERLIN.

Till Akademien inlemnad den 14 Januari 1846.

Talet 351.815, hvilket man hittills ansett uttrycka denna metalls atomvigt, är beräknadt från ett för ungefär 28 år sedan af Frih. BERZELIUS *) anställt försök, hvarvid 10 gr. salpetersyrad blyoxid, dekomponerade med neutralt chromsyradt kali, gäfvo 9.8772 chromsyrad blyoxid, och af 10 gr. chromsyrad blyoxid erhöles 2.425 chromoxid.

Nyligen har PELIGOT **), vid en undersökning af vissa chromoxidulsalter, trott sig finna, att denna atomvigt vore för hög, och att den rätta sannolikt låge mellan 325 och 335. Med anledning häraf anmodade mig Frih. BERZELIUS att försöka säkrare bestämma chromens atomvigt genom analys af silfveroxidens föreningar med chromsyra. Hufvudresultaterna af de försök jag i detta afseende anställt har jag redan haft tillfälle ***) meddela Kongl. Akademien; en mera detaljerad redogörelse för dessa försök får jag härmed aflemna.

Min första omsorg vid dessa försöks anställande, blef att bereda neutralt chromsyradt kali

*) Afhandl. i Fysik, Kemi och Mineralogi, V, 477.

**) Annales de Chimie et de Phys., XII, 528.

***) Öfversigt af K. Vet. Akad. Förhandl., 1845, 90.

i rent tillstånd för att sedan, genom dess dekomposition med salpeterssyrad silfveroxid, erhålla den för försöken nödiga föreningen fri från alla främmande inblandningar. För detta ändamål omkristalliserades i handel förekommande surt chromsyradt kali flera gånger, upplöstes åter i vatten och försattes med en lösning af chromsyrad baryt i chromsyra; den filtrerade lösningen blandades med en lösning af rent kolsyradt kali i öfverskott, beredt genom bicarbonatets glödning, och afdunstades till torrhet, hvarefter saltmassan omkristalliserades så länge moderluten innehöll spår till kolsyradt kali. Det erhållna saltet återupplöstes i vatten, befriades från möjligen vidhängande chlor genom digestion med chromsyrad silfveroxid och underkastades ånyo repeterade omkristalliseringar genom frivillig afdunstning.

Det på detta sätt renade chromsyrade kalit visade, reduceradt med svafvelsyra och alkohol, icke det ringaste tecken till chlorhalt, ej heller kunde svafvelsyras närvaro deri upptäckas med baryt, sedan detsamma blifvit reduceradt med chlorvätesyra och alkohol.

Det tvåfaldt chromsyrade kalit erhöles af det i handel förekommande, hvilket renades med sur chromsyrad baryt och sur chromsyrad silfveroxid samt förnyade omkristalliseringar.

Neutral chromsyrad silfveroxid beredd af i vatten upplöst neutralt chromsyradt kali, hvilket blandades med en lösning af salpeterssyrad silfveroxid, som blifvit beredd af på våta vägen reduceradt och väl utkokadt silfver samt smält till den fria syrans förjagande. Den bildar ett kermesfärgadt pulver, som, gnidet med en hård kropp, antager en grönbrun halfmetallisk färg; är vattenfri och smälter vid börjande rödglödningss-

hetta till en grön, metalliskt glänsande, i brottet kristallinisk massa, utan att sönderdelas, så vida upphettningen sker, hvarken i glaskärl eller så, att lamplågan kan verka reducerande. Upphettad i glaskärl, sönderdelas den vid beröringsytan redan innan $+200^{\circ}$, hvarvid chromsyradt alkali bildas. Af chlorvätesyra eller chlormetallens lösningar sönderdelas den ögonblickligen. Upphettad i vätgas, reduceras den till en blandning af chromoxid och metalliskt silfver; är den förut uppbettad till omkring $+70^{\circ}$ då välgasen får börja inverka, så sker reduktionen under eldfenomen.

Tvåfaldt chromsyrad silfveroxid faller såsom ett cinoberrött pulver, då en lösning af tvåfaldt chromsyradt kali sättes till en lösning af salpetersyrad silfveroxid; hafva föreningarna en viss grad af utspädning eller äro de varma, afskiljes saltet under form af små brunröda, glänsande kristallnålar. I vatten löses detta salt något, men undergår tillika en sönderdelning, så att chromsyra bildas och en motsvarande kvantitet neutralt salt bildas; för hvilken orsaks skull det svårligen kan fås fullkomligt rent, så vida man icke lyckas erhålla detsamma i större kristallnålar, hvilka genom hastig afsköljning och utprässning kunna befrias från moderlut. Det är vattenfritt och tål upphettning till öfver $+100^{\circ}$, utan att sönderdelas, men innan börjande rödglödgningshetta smälter det under utveckling af syrgas till en blandning af chromoxid och neutralt salt, som vid högre temperatur sönderdelas till chromoxid och metalliskt silfver.

Alldenstund det neutrala silfversaltet vid reduktion i vätgas förlorar fem åttendedelar af sin syrehalt, försökte jag först att bestämma chro-

mens atomvigt på det sätt, att en afvägd portion af detta salt lindrigt upphettades i en ström af vätgas, vätgasen efter försiggången reduktion utdrefs af kolsyregas, och denna af torr luft, hvar efter återstoden vägdes. I fem på detta sätt utförda försök med 3 till 4 gram i sender, erhöles följande tal för syreförlusten i procent: 11.340, 12.049, 11.893, 11.760 och 11.952. Mot atomvigten 351.8 svarar syreförlusten 11.896, och mot atomvigten 328.39, syreförlusten 12.030. De funna, från hvarandra för mycket afvikande talen, härrörde dels från svårigheten att väga den reducerade återstoden, som med största begärlighet kondenserar gaser i sina porer, dels derifrån, att vid den temperatur, hvarvid reduktionen försiggår, silfveroxid smälter in i glaset och chromsyradt alkali tillika bildas. Metoden öfvergafs därför, och detta så mycket hellre, som fyra enheter i tredje enheten af syreförlusten svara mot en enhet i atomvigten, och således hvarje det minsta observationsfel yttrar ett för stort inflytande på hufvudresultatet.

Nu återstod endast att bestämma silfversaltets halt af chrom och silfver, den förra under form af oxid, den sednare under form af chlorsilfver. För detta ändamål inlades i en behörigen turerad långhalsad glaskolf en viss mängd chromsyrad silfveroxid, hvars vikt bestämdes efter torkning vid $+100^{\circ}$, hvarefter saltet öfvergjöts med en blandning af chlorvätesyra och alkohol. Chromsyrans reduktion försiggick nästan ögonblickligen, men beforderades dock ytterligare, för att undvika hvarje halt af fri chlor i vätskan, genom ett dygns digestion, hvarefter en grönblå lösning af chromchlorid erhöles, jemte en fällning af chlorsilfver. Den förra afsifonerades

från den sednare, som genom förnyade pågjutningar af vatten, omskakning och afsifonering fullkomligt aftvättades. För att vid denna afsifonering och uttvättning förebygga hvarje förlust, förfors dervid på följande sätt: kolsvens mynning förseddes med en, på tvenne ställen genomborrad kork; genom det ena af dess hål nedfördes till en viss punkt i vätskan det kortare benet af en glassifon med fin kaliber; genom det andra infördes det ena benet af ett kort, i rät vinkel böjdt glaströr, genom hvilket luft medelst blåsning inprässades i kolsven, till dess sifonen var fylld, och således kunde af sig själf uppfylla sitt ändamål. För att, sedan sifonen slutat verka, påfylla kolsven med vatten utan att rubba apparaten, förenades det kortare, nyss omnämnda röret, med ett annat rätvinkligt böjdt rör, hvars längre ben fördes genom korken på en med vatten till hälften fylld flaska, djupt under vattenytan; genom samma kork gick äfven ett kort, rätvinkligt böjdt rör, genom hvilket luft inprässades öfver vattnet i flaskan, till dess en tillräcklig qvantitet deraf öfvergått i kolsven, hvarvid tillika iaktogs, att för hvarje ny pågjutning litet mera vatten tillsattes än vid den föregående. Det efter sju till åtta pågjutningar fullkomligt uttvättade, men genom ljusets inverkan något mörknade chlorsilfret befuktades med några droppar kungsvatten, och torkades på ett mörkt ställe, så att det blef snöhvitt, samt smältes derefter och vägdes med kolsven.

Den afsifonerade lösningen af chromchlorid afdunstades jemte tvättvattnet till en ringa volum, blandades med ammoniak i öfverskott, afdunstades till torrhet och öfvergjöts med kokande vatten, hvarefter det afskiljda chromoxid-

hydratet upptogs på filtrum, glödgades och vägdes. Filtrum var af det bästa Lessebo-papper, vägdt, och vigten af dess aska derefter beräknad.

Jag kan vid detta tillfälle icke underlåta att fästa uppmärksamheten på den stora begärighet, hvarmed glas, äfven en slät yta deraf, kondenserar vatten ur luften. En fullkomligt torr och öfver svafvelsyra afsvalnad glaskolf tilltager, under de första 5 till 10 minuterna den tillbringar på vågskålen, i vikt med 4—5 milligram och derutöfver; hvarföre, då sådana vid en vägning användas, de böra få stå på vågen till dess konstanta vigtsresultater erhållas.

Vid fem på ofvan omtalade sätt utförda försök erhöles följande resultater. Det till försöken I, II och III använda silfversaltet var framställt vid olika tillfällen med kalisalt af olika kristallisationer; till försöket IV var det utfäldt med salpetersyrad silfveroxid i öfverskott. Till försöket V användes sur chromsyrad silfveroxid i temligen stora kristallnålar.

	Silfversalt i gram.	Funnet Chlorsilfver.	Funnen Chromoxid.
I	4.668	4.027	1.0754
II	3.4568	2.983	0.796
III	2.506	2.1605	0.577
IV	2.153	1.8555	0.4945
V	4.3335	2.8692	1.530

Från dessa data kan chromens atomvikt på trenne olika sätt beräknas, nemligen 1:o från förhållandet mellan kvantiteterna af det använda saltet och det funna chlorsilfret, vid hvilket be-

räkningssätt emellertid observationsfelen komma att yttra sitt största inflytande, alldenstund den chromsyrade silfveroxidens atomvigt först måste beräknas, och den fjerde siffran uti dess tal blir den tredje i hufvudresultatets; 2:o af den använda saltquantitetens förhållande till den funna chromoxiden, enligt æqvationen $x = \frac{bc}{a-b}$, hvari x = chromoxidens halfva atomvigt, a = silfversaltets och b = chromoxidens quantitet, samt c = 1599.66 eller det tal, som, sammanlagdt med chromoxidens halfva atomvigtstal, ger den chromsyrade silfveroxidens atomvigt; och 3:o från förhållandet mellan chlorsilfrets och chromoxidens vigtsquantiteter. Det sista beräkningssättet ger de så väl sinsemellan som med medeltalet af alla bäst öfverensstämmande talen.

Chromens atomv. beräknad från förhållandet mellan
(Ag = 1349.66; Cl = 443.28).

	Silfversalt och Chlorsilfver.	Silfversalt och Chromoxid.	Chlorsilfver och Chromoxid.	Medeltal.
I	328.67	328.838	328.80	328.769
II	328.06	328.55	328.438	328.349
III . . .	330.00	328.49	328.836	329.108
IV . . .	330.75	326.956	327.827	328.511
V	329.155	327.437	328.042	328.217
Medeltal	329.327	328.054	328.388	328.59

Medium af dessa femton atomvigtstal är således 328.59, som så föga afviker så väl från 328.39, hvilket i Årsber. 1845, p. 36, är upp-

taget, som från 328.87 *), hvilket finnes upptaget i atomvigtstabellerna i tredje delen af BERZELIUS' Lehrbuch d. Chemie, femte upplagan, att någon ändring i det sednare så mycket mindre torde böra komma i fråga, som sjelfva sättet för atomvigtens bestämmande icke synes medgifva någon särdeles säkerhet på första decimalen.

De från försöket IV dragna resultaten äro visserligen så afvikande både sinsemellan och från de öfriga, att dem icke borde tilläggas lika vikt med de andra; men ehuru deras borttagande skulle gifva medeltalet för hvarje series resultater ett vackrare utseende, hafva de dock på slutresultatet ett så ringa inflytande, att detta, om de borttogos, endast skulle blifva 328.61 i stället för 328.59.

För att om möjligt finna orsaken till olikheten mellan dessa försöks resultater och det, som Frih. BERZELIUS vid sina försök erhållit, dekomponerades neutralt chromsyradt kali med salpetersyrad blyoxid, hvarvid bestämdes huru mycket af det ena saltet som fordrades till det andras fullständiga utfällning. Då blysaltet utfälldes med chromsyradt kali, erhöles atomvigten i ett försök under 323; då deremot blysaltet sattes till kalisaltet, erhöles atomvigten 342. I båda fallen hade således en mindre qvantitet af det fällande saltet åtgått, än som svarade mot atomvigten 328. Dervid inträffade tillika att, då den i det sednare försöket erhållna fällningen upptogs på filtrum och tvättades, tvättvattnet antog en gul färg och innehöll chromsyradt kali. Häraf synes att, åtminstone vid en viss koncentrationsgrad

*) Bör rätteligen vara 328.857 och är medeltalet af 329.327 och 328.388.

grad hos saltlösningarna, en portion af någotdera saltet utfälles, jemte den chromsyrade blyoxiden.

Då en mycket utspädd lösning af chromsyradt kali fälldes med en dylik af salpetersyrad blyoxid, hade en fullkomlig utfällning, såsom det syntes, egt rum, då så mycket af blysaltet tillkommit, som svarade mot atomv. 330.

Jag försökte slutligen att bestämma huru mycket chromsyrad blyoxid, som kunde erhållas af en gifven mängd salpetersyrad blyoxid, och använde dervid mycket utspädda lösningar både af blysaltet och kalisaltet. Dervid erhöles följande resultat:

I. Af 10.0365 gr. salpetersyrad blyoxid erhöles 9.7915 chromsyrad blyoxid eller 97.559 procent; chromens atomvigt blir här af 324.53. ($Pb = 1294.645$; $N = 175.06$).

II. Af 7.899 gr. salpetersyrad blyoxid erhöles 7.709 chromsyrad blyoxid eller 97.594 procent, svarande mot atomvigten 325.26.

Dessa resultat, hvilka något avvika från dem, som blifvit härledda från silfversaltets analys, torde emellertid icke förtjena så stort vitsord som dessa, dels för de med sjelfva försökets utförande förenade svårigheter, då en större kvantitet fällning måste uppsamlas ur en stor kvantitet vätska, och till vigten bestämmas genom tvenne särskilda vägningar, af hvilka den ena måste ske med det använda filtrum och den derpå qvarsittande portionen af fällningen; dels därför, att den chromsyrade blyoxiden troligen icke är absolut olöslig i vatten, åtminstone kan ett spår af chromsyradt kali finnas upplöst i vatten, utan att vätskan märkbart grumlas vid tillsatsen af blysalt.

Om betydelsen af tecknen

x^y , $\text{Log}_b(x)$,
 $\text{Sin } x$, $\text{Cos } x$, $\text{Arcsin } x$, $\text{Arccos } x$

i *Analytisk Mathematik*;

af

E. G. BJÖRLING.

(Till Akademien inlemnad den 21 Maj 1845).

Inledning.

CAUCHY har utdömt ur Analysen åtskilliga af afvanskrefna tecken för vissa valörer af x och y och Basen b , nemligen

x^y för det fall att reela delen af x är negativ och på samma gång y annat än reel qvant. med helt tals numerisk valör eller noll,

$\text{Log}_b(x)$ för det fall, att reela delen af x är negativ, och dessutom för hvarje x i det fall att reela delen af basen b är negativ,

$\left. \begin{array}{l} \text{Arcsin } x \\ \text{Arccos } x \end{array} \right\}$ för det fall att x är reel och numeriskt > 1 .

Såsom skäl för tecknets x^y utdömande för besagde fall uppgifves *) först den omständigheten

*) CAUCHY, *Analyse algèbr. och Exerc. de mathém.* T. I (1826) pag. 2. — På dessa båda ställen talas väl endast om reelt y ; men i tecknets x^y utdömande för reelt y ligger naturligtvis implicite förbudet att nyttja x^y äfven för imaginärt y : såsom för öfrigt kan in-

att ingen bland de i expressionen $((x))^y$ innefattade kvantiteter synes förtjena att framför de öfriga deribland utmärkas med eget tecken, och för det andra att man skulle blifva nödsakad medgifva, att tecknet x^y i ett visst speciellt fall har två hvarannan motsägende betydelser, om man tillåte sig att utur definitionen af $((x))^y$ deducera definitionen af x^y för x med negativ reel del på samma sätt som för x med positiv reel del.

Såsom skäl för tecknets $l(x)$ och således äfven tecknets $\text{Log}_b(x)$ — då basen b är reel och positiv — uteslutande ur Analysen för det fall, att reela delen af x är negativ, uppgifvas *) samma båda omständigheter som nyss nämndes. Hvarföre CAUCHY funnit sig föranlåten att helt och hållet utdömma tecknet $\text{Log}_b(x)$ för hvarje x -värde, då basen b har negativ reel del, det får man veta i hans *Leç. du Calc. Différentiel* (Leç. XI): skälet är naturligtvis att finna deruti att tecknet b^y förut var utdömdt för det fall att b hade negativ reel del.

Orsaken, hvarföre CAUCHY utdömt tecknens $\text{Arcsin}x$ och $\text{Arccos}x$ begagnande för reelt x som är numeriskt >1 , är följande. I sina *Leç. du Calc. Différ.* (Leç. XI) angifver han först de båda kvantitets-grupper, som innefattas i expressionerna $\text{Arcsin}((x))$ och $\text{Arccos}((x))$. Derefter visar han, att i hvardera gruppen finnes en särskildt anmärkningsvärd kvantitet, så länge som x är imaginär $=\alpha+\beta\sqrt{-1}$ (α och β reela, β icke $=0$), och som

ses deraf att CAUCHY på det ställe (*Leç. du Calc. Différ. Leç. XI*), der han definierar betydelsen af x^y för imaginärt y , angifver denna definition endast för x med positiv reel del.

*) Se nyss citer. ställe af CAUCHY's *Exercises*.

för $x=a$ reel och numer. ≤ 1 reducerar sig till $\text{Arcsin} a$ och $\text{Arccos} a$: för dessa båda anmärkningsvärda qvantiteter antager han beteckningarne $\text{Arcsin} x$ och $\text{Arccos} x$. Om man nu i dessa teckens definitioner, som hafva formen

$$\left. \begin{aligned} \text{Arcsin} x &= P \pm Q \sqrt{-1} \\ \text{Arccos} x &= P_1 \pm Q_1 \sqrt{-1} \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{allteftersom } \beta \text{ är positiv} \\ \text{eller negativ,} \\ (P, P_1, Q, Q_1, \text{ reela}) \end{array}$$

sätter $\beta=0$; så reducera sig P och P_1 till $\text{Arcsin} a$ och $\text{Arccos} a$ samt Q och Q_1 till noll, då x supponeras vara numeriskt ≤ 1 ; men då a supponeras vara numer. >1 , så hafva Q och Q_1 hvar sin värde som icke är noll: hvarpå följer interdictet ungefär så lydande: "Emedan sednare membrum" i hvardera af de båda definitions-equationerna i "detta fall icke är fullkomligt bestämdt, utan till" lägger hvardera af tecknen $\text{Arcsin} x$ och $\text{Arccos} x$ "två särskilda (hvarannan motsägende) betydelser; "så bör man för detta fall afstå från begagnandet "af dessa tecken." *)

Det har emedlertid (som väl känt är) sina stora betänkligheter att, der icke så nödvändigt måste ske, berofva Analysen något enda af sina tecken.

*) Det bör icke lemnas oanmärkt, att CAUCHY på ett föregående ställe (Anal. Algébr. pag. 326 och 327) hade upptagit ifrågavarande tecken $\text{Arcsin} x$ och $\text{Arccos} x$ till begagnande äfven för det fall, som nu är i fråga. Men den betydelse, han der tillerkänt dessa tecken för ifrågavarande fall, befinnes vid närmare påseende leda till motsägelser. Måhända var det just denna omständighet, som i en sednare tid förledde den store Geometern till sitt interdikt — vålladt för öfrigt (såsom framdeles skall visa sig) af en lucka i raisonnementet.

Ändamålet med denna uppsats var ursprungligen att ådagalägga obehöfligheten och således äfven obehörigheten af de åfvansagda utdömningsarne. För sådant ändamål blef emedlertid alldeles nödvändigt att gå tillbaka ända till de första principerna af läran om imaginära qvantiteter, i hvilka principer vår store föregångare lemnat en och annan lucka, som var af högsta vikt att fylla, en och annan obestämdhet som var af högsta vikt att undanröjja *). Och sålunda blef denna uppsats, för att tala utförligt, ett försök att systematiskt framställa grunderna af läran om den analytiska matematikens qvantiteter (reela och imaginära), till den vidd åtminstone att den allmänna betydelsen af åfvanskrefna tecken måtte varda fullkomligen bestämd.

Dervid bör framsör allt märkas, att man ingalunda har för afsigt att här föreslå nedrifvandet af det sedan CAUCHY's uppträdande med så mycken omsorg upphygga, för att, sedan en splitter ny grundval åter blifvit lagd, derpå uppföra en lika ny byggnad. Meningen är att med bibehållande af den Cauchy'ska byggnaden, sådan den står der till både grundval och inredning, vidfoga ett stycke ny grund, för att sedermera möjligen derpå uppföra en till hufvudbyggnaden passande flygel, eller — egentligt att tala: den rätta betydelsen af ifrågavarande tecken för de fall, i hvilka CAUCHY medgifver deras begagnande, är äfven i närvarande uppsats befunnen att vara just den som CAUCHY tilldelat dem; men författaren har funnit, att vid consequent genomfördt raisonnement intet giltigt skäl förefinnes till deras ut-

*) Det är nemligen just till följe af dessa obestämdheter och luckor i raisonnementet som CAUCHY synes hafva blifvit förledd till ifrågavarande utdömningsar.

dömmande i de fall, för hvilka CAUCHY föreslagit deras bannlysning ur Analysen, utan att man tvärtom har ganska betydliga fördelar af att med dessa tecken utmärka vissa qvantiteter äfven i dessa fall.

Det blef således väl icke nödigt att här anföra alla till ämnet hörande raisonnementer och detaljer men likväl, till undvikande af afbrott i sammanhanget, oundvikligt att på de flesta ställen upptaga alla de viktigare till saken hörande resultater och formler — oaktadt de till en god del öfverensstämma med de af CAUCHY's arbeten redan kända — och framför allt angeläget att bestämdt enoncera, *hvilka af Analysens definitioner och lagar man antager såsom föregående*, för att icke löpa fara att genom de bestämningar, som här göras, råka i motsägelse mot det *i föregående delar af Analysen fastställda* *).

Bestämningen af tecknens

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Tang}x, \text{Cot}x, \text{Sec}x, \text{Cosec}x \\ \text{Arctg}x, \text{Arccot}x, \text{Arcsec}x, \text{Arccosec}x \end{array} \right\}$$

betydelse för hvarje x valör (reel eller imaginär)

*) Dermed är naturligtvis icke sagdt, att efter förfs förmenande det här anförda bör i den analytiska matematikens system förekomma just *omedelbart* efter de delar deraf, hvilka här antagas såsom föregående. Så t. ex. kan betydelsen af tecknet x^y för reelt y (x reel eller imaginär) fullständigt definieras, utan att behöfva förutskicka någon del af läran om infinita serier med reela termer — såsom ock i efterföljande kap. I §§:na 1 och 2 skett —; men dermed är icke sagdt att ju, äfven efter förfs förmenande, det i dessa båda §§ anförda bör i Analysens system förekomma först *efter* nyssnämnda lära och således just på den punkt, der CAUCHY i sin Anal. Algebr. (Chap. VII) förlagt detta ämne.

står visserligen i närmaste sammanhang med föremålet för denna afhandling, och CAUCHY's teori för dessa "*fonctions composées*" påkallar högt vissa modifikation; men att här upptaga äfven detta ämne, vore måhända att öfverskrida de för afhandlingens vidd tillbörliga gränserna.

KAP. I.

Om betydelsen af tecknet

(1) x^y .

Betydelsen af detta tecken för hvarje reel valör af x , då y är reel quant. af helt tais numerisk valör eller noll, äfvensom då y är någon annan reel quant. och x ett tal (positiv quantitet), förutsättes bekant.

För att för öfrigt bestämt angifva, på hvilken ståndpunkt af Analysen vi här supponera oss stå, är nödigt tillkännagifva, att vi i de två första paragraferna af detta kapitel endast förutsätta

1:o) läran om de 4 räknesätten med reela quantiteter samt om Tals positiva Rötter och Potenser (med reel exponent hvilken som helst) och

2:o) elementerna af plana trigonometrien, sådana de i CAUCHY's *Analyse Algèbr.* not. I pag. 425—435 samt "*Préliminaires*" pag. 11—13 finnas framställda.

§. 1.

Förberedande begrepp om Quantiteter i allmänhet.

1. Med "*Reel quantitet*" mena vi "*Tal (positiv quant.) eller negativ quantitet eller noll.*" Med "*Quantitet i allmänhet*" eller "*Analytisk quantitet*" eller,

helt kort, "Quantitet" (utan tillagdt epithét) mena vi hvarje uttryck af formen

$$\alpha + \beta \sqrt{-1}$$

(α och β reela qvant.);

α kallas qvantitetens reela del, β coëfficienten för $\sqrt{-1}$ uti qvantiteten.

Hvarje qvantitet, i hvilken coëff. för $\sqrt{-1}$ icke är noll, skall utmärkas med benämningen *imaginär qvantitet*; hvaremot det uttryck $\alpha + \beta \sqrt{-1}$, deruti coëff. β är $= 0$, skall anses likabetydande med uttrycket α och är således en reel qvantitet.

Begreppet "qvantitets *Modyl*" är bekant. Af definitionen på "lika stora qvantiteter" följer, att 1:o) *lika stora qvantiteters modyl* måste vara lika stora och 2:o) *endast den qvantitet är $= 0$, hvars modyl är noll*. Vi behöfva här endast nämna begreppen "Summa," "Rest," "Produkt (*Dignitet*)" och "Qvot," för att hafva angifvit betydelsen af tecknet

$$(1) \dots x^y \text{ eller } (\alpha + \beta \sqrt{-1})^y$$

för hvarje qvantitet x , då y är reel af helt tals numerisk valör ($= \pm m$), nemligen

$$x^m = xxx\dots (m \text{ fact.}) \text{ och } x^{-m} = \frac{1}{x^m},$$

äfvensom då y är noll (åtminstone om x icke är noll), *) nemligen

$$x^0 = 1.$$

*) Hvad beträffar betydelsen af tecknet 0^y (y en uppgifven qvantitet, af hvilket slag den än må vara), så må här — till förebyggande af all villfarelse — en gång för alla erinras, att som detta tecken aldrig i Analysen förekommer annat än såsom tecken för den gräns, hvartill x^y convergerar, då man låter den för tillfället ifrågavarande qvantiteten x convergera

2. Deraf att hvarje qvantitet $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ (modulen $=\rho$ kortligen) kan representeras med

$$(2) \dots\dots\dots \rho(\cos\theta + \sqrt{-1}\sin\theta),$$

då θ betyder en reel qvantitet, hvilken man behagat utvälja, ibland dem hvilkas Sinus och Cos. satisfiera villkoren

$$(3) \dots\dots\dots \begin{cases} \rho\cos\theta = \alpha, \\ \rho\sin\theta = \beta, \end{cases}$$

följer att man,

1:o) då α är positiv, kan till ("Argument") θ antaga

$$\tau = \arctg \frac{\beta}{\alpha} \text{ och således i stället för } \alpha + \beta\sqrt{-1}$$

då sätta

$$(2') \dots\dots\dots \rho(\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau),$$

2:o) då α är negativ, kan till θ antaga $\tau + \pi$ och således i stället för $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ då sätta

$$(2'') \dots\dots\dots \rho[\cos(\tau + \pi) + \sqrt{-1}\sin(\tau + \pi)] \text{ eller } -\rho(\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau),$$

och 3:o) då α är noll (och således qvantiteten af formen $\beta\sqrt{-1}$), kan i dess ställe sätta lika väl

(2') som (2''), allenast man med τ förstår $\pm \frac{\pi}{2}$ i förra fallet, men $\mp \frac{\pi}{2}$ i det sednare, allteftersom

β är positiv eller negativ. — Equationerna

$$\alpha + \beta\sqrt{-1} = \pm \rho(\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau).$$

indefinit mot noll, så komma vi öfverallt i det följande, der fråga är om tecknet x (åtminstone då y icke bestämdt är 1), att förutsätta att qvantiteten x icke är noll: — såsom för öfrigt skall på behöriga ställen särskildt erinras.

af hvilka den förra gäller, så ofta som a är positiv, och den sednare så ofta som a är negativ, få således sägas båda fortsara att gälla äfven för $a=0$, med vilkor att med τ då förstås den limes, mot hvilken $\arctg \frac{\beta}{a}$ konvergerar vid indefinit aftagande nummervärdar af a , — eftersom, då a konvergerar mot noll från positiva hållet, just $\pm \frac{\pi}{2}$ äro de båda limites mot hvilka $\arctg \frac{\beta}{a}$ tenderar, allteftersom β är positiv eller negativ, och eftersom då a konvergerar mot noll från negativa hållet just $\mp \frac{\pi}{2}$ äro dessa limites.

Härutur följer, att — hvilka reela qvantiteter än a och β må vara (åtminstone om icke båda äro noll) — städse, då p är reel af helt tals nummervärde eller noll,

$$(4) \dots x^p = (a + \beta \sqrt{-1})^p = \rho^p (\cos p\theta + \sqrt{-1} \sin p\theta),$$

der θ betyder en reel qvant. hvilken man behagat utvälja bland dem hvilkas sinus och cos. satisfiera (3) eller vilkoret

$$(5) \dots a + \beta \sqrt{-1} = \rho (\cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta);$$

samt att man följaktligen kan säga, att, allteftersom a är positiv eller negativ,

$$(4') \dots x^p = (a + \beta \sqrt{-1})^p = (\pm \rho)^p (\cos p\tau + \sqrt{-1} \sin p\tau),$$

och att, då a är noll, båda eqvationerna gälla, med vilkor att med τ då förstås den limes, emot hvilken $\arctg \frac{\beta}{a}$ konvergerar vid indefinit aftagande

nummervärder af a , — således $\pm \frac{\pi}{2}$ i den förra,

men $\mp \frac{\pi}{2}$ i den sednare, allteftersom β är positiv eller negativ.

§. 2.

*Om Rötter och Potenser (med reel exponent)
af en quantitet hvilkensomhelst.*

Obs. Den ifrågavarande quantiteten supponeras vara icke noll (se not. sid. 81).

1. Om man med $((\alpha + \beta \sqrt{-1}))^{\frac{1}{n}}$, kortligen $((x))^{\frac{1}{n}}$ eller $\sqrt[n]{x}$, menar det allmänna uttryck som i sig innefattar alla n :te-rötterna ur x [n helt tal], med $((x))^{\frac{m}{n}}$ det allmänna uttryck, som i sig innefattar m :te-digniteten [m helt tal] af hvarje n :te-rot ur x , och

med $((x))^{-\frac{m}{n}}$ menar $\frac{1}{((x))^{\frac{m}{n}}}$;

så finnes att, då μ kortligen betecknar en reel quant. af formen $+$ eller ock $-\frac{m}{n}$ [m och n hela tal hvilkasomhelst], städse

(6) . . . $((x))^{\mu} = \rho^{\mu} (\cos \mu \theta + \sqrt{-1} \sin \mu \theta) ((1))^{\mu}$,
då θ betyder (som åfvan) och

(7) . . . $((1))^{\mu} = \cos 2k\mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin 2k\mu\pi$,

der k (helt tal eller noll) är till sin valör indeterminerad; men om man successivt tilldelar $2k$ alla de jemna tals valörer (0 inclusive), som finnas mellan 0 och n (inclus.), så kan man vara viss att derigenom i alla händelser erhålla alla de valörer, hvaraf sednare membrum (7) är cabelt.

pabelt. Och om $\frac{m}{n}$ (numeriska valören af μ) är ett oförkortligt bråk [m och n sinsemellan primi och $n > 1$], så äro dessa särskilda valörer till antalet n , — och i den händelsen

$$(8) \dots ((1))^{\pm \frac{m}{n}} = ((1))^{\frac{1}{n}} = ((1^m))^{\frac{1}{n}}.$$

Icke en gång den händelsen, att numeriska valören af μ reducerar sig till helt tal, bringar éqv. (6) och (7) "en défaut." För öfrigt är af (4) klart, att i detta fall $((x))^{\mu}$ är $= x^{\mu}$. — Och om man slutligen bestämmer sig att med tecknet $((x))^0$ — som i det föregående af Analysen icke fått sig någon betydelse tillerkänd — mena den expression, hvar till sednare membrum (6) reducerar sig, då man deri sätter $\mu = 0$, således $((x))^0 = 1 = x^0$; så får man säga, att éqv. (6) och (7) gälla för hvarje reel och rationel quantitet μ .

Hvad specielt beträffar positionen $x = -1$, så kan man, jemte den af (6) gifna

$$(9) \dots ((-1))^{\mu} = (\cos \mu \pi + \sqrt{-1} \sin \mu \pi) ((1))^{\mu},$$

begagna denna

$$(9') \dots ((-1))^{\mu} = \cos(2k+1)\mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin(2k+1)\mu\pi$$

och deraf finna alla (de högst n) valörerna, derigenom att man successivt tilldelar $2k+1$ alla de udda tals valörer som finnas mellan

0 och n (inclus.). Och om $\frac{m}{n}$ (nummervalören af μ) är ett oförkortligt bråk, så äro alla de dervid erhållna n valörerna sinsemellan olika och i den händelsen

$$(10) \dots ((-1))^{\pm \frac{m}{n}} = (([-1]^m))^{\frac{1}{n}}.$$

Antager man nu för en hvar af de i uttrycket $((x))^{\mu}$ — "exponenten" μ reel och rationel — innefattade qvantiteter benämningen " μ -potens af x "; så har man af éqv. (6) följande anmärkningsvärda lag: *En qvantitets alla μ -potenser erhållas, då man multiplicerar någon — hvilken man behagar välja — ibland dem successivt med enhetens alla μ -potenser, eller (som man kan säga) att valören af den allmänna expressionen $((x))^{\mu}$ erhålles, då man med $((1))^{\mu}$ multiplicerar en — hvilken man behagar välja — ibland μ -potenserna af x . **

2. I den allmänna éqv. (6) har man — som sagdt är — sin frihet att till θ antaga hvilken man vill ibland de reela qvantiteter, hvilkas sinus och cos. satisfiera éqv. (5). Emedlertid är för det följande af särdeles vigtt att nu fästa en när-

- *) Hvarje enskildt par μ -potenser af x erhålles, då man i sednare membrum (6) eller i

$$\varrho^{\mu}(\cos\mu\theta + \sqrt{-1}\sin\mu\theta)[\cos 2k\mu\pi \pm \sqrt{-1}\sin 2k\mu\pi]$$

tilldelar k en särskild valör. — Låt k' vara en sådan (hvilken man behagat utvälja). Jag påstår, att så väl den ena som den andra af

$$\varrho^{\mu}(\cos\mu\theta + \sqrt{-1}\sin\mu\theta)[\cos 2k'\mu\pi \pm \sqrt{-1}\sin 2k'\mu\pi]$$

skall, multiplicerad med $((1))^{\mu}$, gifva till resultat $((x))^{\mu}$. Klart deraf, att i stället för så väl den ena som den andra af de båda

$$\varrho^{\mu}(\cos\mu\theta + \sqrt{-1}\sin\mu\theta)[\cos 2k'\mu\pi \pm \sqrt{-1}\sin 2k'\mu\pi]((1))^{\mu}$$

eller (som är detsamma) af de båda

$$\varrho^{\mu}(\cos\mu[\theta \pm 2k\pi] + \sqrt{-1}\sin\mu[\theta \pm 2k\pi])((1))^{\mu}, \text{ neml. samma tecken för } 2k\pi \text{ i båda termerna,}$$

kan sättas

$$\varrho^{\mu}(\cos\mu\theta + \sqrt{-1}\sin\mu\theta)((1))^{\mu},$$

eftersom med θ menas en — hvilken man behagar välja — ibland de reela bågar, hvilkas sinus och cosinus satisfiera (5).

mare uppmärksamhet vid den form, som éqv. (6) antager, då man der införer τ d. ä. $\text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}$. —

Då α är positiv och man således (§. 1) får till θ antaga τ , antager (6) formen

$$(6') \dots ((x))^{\mu} = \rho^{\mu} (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau) ((1))^{\mu} = \\ = ((\rho))^{\mu} (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau);$$

men då α är negativ och man således får till θ antaga $\tau + \pi$:

$$(6'') \dots ((x))^{\mu} = \rho^{\mu} \{ \cos \mu (\tau + \pi) + \sqrt{-1} \sin \mu (\tau + \pi) \} ((1))^{\mu} = \\ = \rho^{\mu} (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau) ((-1))^{\mu} = \\ = ((-\rho))^{\mu} (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau); —$$

och då α är noll och man således får till θ antaga efter behag τ eller $\tau + \pi$ (med det vilkor som i §. 1 nämndes), gäller (6') lika väl som (6''), med vilkor att med τ då förstås den limes, mot hvilken $\text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}$ convergerar vid indefinit aftagande

nummervalörer af α , — således $\pm \frac{\pi}{2}$ i (6') och $\mp \frac{\pi}{2}$ i (6''), allteftersom β är positiv eller negativ.

För att erhålla alla de särskilda värörer, som i hvarje membrum af (6') och (6'') innefattas, behöfver man allenast (som sagdt är) låta $2k$ uti

$$(7) \dots ((1))^{\mu} = \cos 2k\mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin 2k\mu\pi$$

success. betyda alla de jemna tal (0 inclus.), som finnas mellan 0 och nämnaren i nummervalören af μ (inclus.), samt $2k+1$ uti

$$(9') \dots ((-1))^{\mu} = \cos (2k+1)\mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin (2k+1)\mu\pi$$

success. betyda alla de udda tal som finnas mellan samma gränser.

3. Om *Principal-potenser*. — En ibland μ -potenserna af x skall framför de öfriga utmärkas med tecknet $(x)^\mu$ eller x^μ . För att finna *hvilken*, är nödvändigt att först erinra sig, hvilken betydelse i det föregående af Analysen blifvit tillerkänd detta tecken i förut upptagna enskilda fall. Dessa fall äro

1:o) då x är ett *Tal*: i hvilket fall med x^μ är utmärkt det *tal* som är μ -potens af x ,

2:o) då, hvilken qvant. än x må vara, μ är af helt tals numerisk värde eller noll: i hvilket fall för *positivt* α gällde *équationen*

$$(11) \dots x^\mu = \rho^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau),$$

för *negativt* α *équationen*

$$(11') \dots x^\mu = \rho^\mu (\cos \mu [\tau + \pi] + \sqrt{-1} \sin \mu [\tau + \pi]) = \\ = \rho^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau) (-1)^\mu = \\ = (-\rho)^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau),$$

nemligen

$$(-1)^\mu = \cos \mu \pi + \sqrt{-1} \sin \mu \pi,$$

och, då α är noll, den ena *équationen* lika väl som den andra, med vilkor (som nämndes), alltså kort sagdt

$$(11'') \dots (\beta \sqrt{-1})^\mu = (\sqrt{\beta^2})^\mu (\cos \frac{\mu \pi}{2} \pm \sqrt{-1} \sin \frac{\mu \pi}{2})$$

allteftersom β är positiv eller negativ.

Som nu detta för x med *ickenegativ reel del* statuerade innefattas i villkoret

$$(12) \dots x^\mu = \rho^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau), \text{ der med } \tau \text{ för-} \\ \text{stås, då } \alpha \text{ är noll, } \pm \frac{\pi}{2} \text{ allteftersom}$$

β är positiv eller negativ;

så är klart att man, för att erhålla en definition

på x^μ (för x med icke-negativ reel del) passande för hvarje reelt och rationellt μ , är berättigad att dertill antaga (12).

Och som man för x med negativ reel del endast är bunden af (11'), så är man tydligen berättigad att för detta fall såsom allmän bestämning för betydelsen af x^μ antaga denna (11'), som enligt 2:a membrum i (6'') är den μ -potens af x som svarar mot positionen $k=0$ uti (7), — likasom ock (12) enligt (6') för x med icke-negativ reel del.

Det är dessa μ -potenser af x som skola kallas *dess principala μ -potenser* eller *principalväröerna* af $((x))^\mu$ i de båda fallen att 1:o a är icke-negativ och 2:o a är negativ. Man har således för hvarje reelt och rationellt μ

$$(13) \dots \begin{cases} 1^\mu = 1, \\ (-1)^\mu = \cos \mu\pi + V-1 \sin \mu\pi, \end{cases}$$

och i allmänhet, allteftersom a är icke-negativ eller negativ,

$$(14) \dots x^\mu = (\pm \rho)^\mu (\cos \mu\tau + V-1 \sin \mu\tau),$$

nemligen

$$(15) \dots (-\rho)^\mu = \rho^\mu (-1)^\mu = \rho^\mu (\cos \mu\pi + V-1 \sin \mu\pi),$$

med vilkor att, då a (i förra fallet) är noll, med τ förstås den limes mot hvilken $\text{Arctg} \frac{\beta}{a}$ tenderar vid indefinit aftagande nummerväröer af a , — således $\pm \frac{\pi}{2}$ allteftersom β är positiv eller negativ, kort sagdt:

$$(16) \dots (\beta V-1)^\mu = (V\beta^2)^\mu (\cos \frac{\mu\pi}{2} \pm V-1 \sin \frac{\mu\pi}{2})$$

allteftersom β är positiv eller negativ. —

Anmärkning. Det hade varit önskligt att man här, vid fråga om reelt och rationelt μ hvilketsomhelst, hade kunnat säga om x^μ på samma sätt som åfvan, då fråga var om μ af helt tals nummervalör eller noll, att nemligen de båda (14) gälla, allteftersom α är positiv eller negativ, samt för $\alpha=0$ den ena lika väl som den andra med villkor (som åfvan) att med τ i detta fall förstods den limes, mot hvilken $\text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}$ convergerar vid indefinit aftag. nummervalörer af α , således $\pm \frac{\pi}{2}$ i den öfra (14) och $\mp \frac{\pi}{2}$ i den nedra, allteftersom β är positiv eller negativ. Men i sådant fall skulle man hafva begått den oförsigtigheten att, för negativt β , med samma tecken $(\beta\sqrt{-1})^\mu$ utmärka två qvantiteter

$$(V\beta^2)^\mu (\cos \frac{\mu\pi}{2} - \sqrt{-1} \sin \frac{\mu\pi}{2})$$

och

$$(-V\beta^2)^\mu (\cos \frac{\mu\pi}{2} + \sqrt{-1} \sin \frac{\mu\pi}{2}) \text{ d. ä.}$$

$$(V\beta^2)^\mu (\cos \frac{3\mu\pi}{2} + \sqrt{-1} \sin \frac{3\mu\pi}{2}),$$

som äro sinsemellan olika för hvarje μ utom det speciela fall, som förut var afhandladt, neml. då μ var af helt tals nummervalör eller noll.

Men då således åfvan yttrade önskan icke står att vinna, i thy att de båda med x^μ eller $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ menade expressionerna (14) convergera vid indefinit aftagande nummervalörer af α mot hvar sin särskilda limes, åtminstone då β är negativ; skulle icke måhända vara

tjenligast att här (likasom då fråga var om 0^γ i noten på sid. 81) helt enkelt statuera, att tecknet $(\beta\sqrt{-1})^\mu$ aldrig skall begagnas i Analysen annat än såsom tecken för den gräns, mot hvilken x^μ d. ä. $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ konvergerar, då man låter den för tillfället ifrågavarande imaginära kvantitetens x reela del konvergera indefinit mot noll? I sådant fall kunde man ifrån nu dispensera sig från allt behof att i det följande särskildt orda om tecknet $(\beta\sqrt{-1})^\mu$. — Men nej! uttrycket $\beta\sqrt{-1}$ förekommer som oftast i Analysen såsom en isolerad eller själfständig kvantitet (icke då såsom gräns, mot hvilken det ena eller andra slaget $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ konvergerar vid indefinit aftagande nummervalörer af α): hvadan det är lika angeläget att fixera begreppet "*principal-potens af $\beta\sqrt{-1}$* " eller betydelsen af tecknet $(\beta\sqrt{-1})^\mu$ som betydelsen af tecknet $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ för positivt och negativt α .

Då nu här åfvan denna bestämning skulle försiggå — resultatet blef eqv. (16) —, var man på förhand endast bunden af bestämningen (11'') för μ af helt tals nummervalör eller noll. Det blef då helt naturligt att utsträcka denna eqvations (11'') giltighet till *hvarje* reelt och rationellt μ , så mycket heldre som man derigenom tillika vann den fördelen att få åtminstone den ena af eqvationerna (14) nemligen

$$(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu = \rho^\mu (\cos \mu\tau + \sqrt{-1} \sin \mu\tau)$$

gällande icke blott för *positivt* α , utan ock till och med $\alpha = 0$.

(Se härom vidare not. I vid Afhandl:s slut).

Af (6') och (6'') jemförda med (14) inses, att i alla händelser

$$(17) \dots\dots\dots ((x))^{\mu} = x^{\mu}((1))^{\mu},$$

hvilket för öfrigt redan förut var känt af den i slutet af föreg. N:o 1 anförda lagen.

Och af (14) är klart att, då α är negativ, alltid

$$(18) \dots\dots\dots x^{\mu} = (-x)^{\mu}(-1)^{\mu},$$

men icke alltid eljest.

Nota.

För den händelse, att "exponenten" μ är ett bråk med 1 till täljare ($\mu = \frac{1}{n}$, n helt tal), skall

ifrågavarande principal-valör $x^{\frac{1}{n}}$ ock tecknas med $\sqrt[n]{x}$ och kallas *principal-roten af n:te graden ur x* .

Att vi genom denna bestämning af tecknets $\sqrt[n]{x}$ betydelse, nemligen

$$\sqrt[n]{x} = x^{\frac{1}{n}},$$

ingalunda råka i collision med hvad i det föregående är statueradt om detta tecken (neml. för $x = \text{ett Tal}$ och $x = -1$), är påtagligt af éqv. (14) och (15). *Principal-roten ur ett Tal* är uppenbarligen just den, som i elementerna blifvit kallad "*positiva roten ur talet*."

4. Härmed är nu betydelse tilldelad tecknet x^{μ} ,

ehvad qvantitet än x må vara, för hvarje reelt och rationellt μ . För irrationellt μ är i det föregående af Analysen ingen betydelse tilldelad detta tecken, utom i det speciella fall att $\beta = 0$ och α positiv. Vi kunna således, utan våda för colli-

sion med något förut statueradt, antaga tecknet x^u äfven i detta fall (μ irrationel) såsom likabetydande med det 2:a membrum af (11) och (11') — eller af (14) —, eftersom genom denna antagning eqv. (11) blir identisk för $\beta=0$. Och sålunda är nu betydelsen af tecknet

(1) x^y

bestämd för hvarje reel y .

I sammanhang härmed inses, att naturligtvis ingenting är som hindrar att utsträcka eqvationens (6) och således äfven eqvationernas (6') och (6'') giltighet äfven till nu ifrågavarande fall (μ irrationel), — eftersom tecknet $((x))^u$ för detta fall ingenstädes i det föreg. af Analysen fått sig någon betydelse tilldelad.

Benämningarne *Potens* och *Principal-potens* må äfven härvid bibehållas.

Och om vi nu på ett ställe sammanfatta allt det hufvudsakliga, som i det föreg. blifvit om quantiteters potenser statueradt; så erhålles följande

Theorem.

Om $x = \alpha + \beta \sqrt{-1}$ är en quant. hvilken som helst (ick noll, åtminstone), α och β reela,

p reel af helt tals numerisk värde eller noll,

μ reel hvilken som helst,

ρ modulen $= \sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$,

θ reel, hvilken man behogat välja, ibland dem hvilkas $\cos.$ och $\sin.$ satisfiera eqvationen (5),

$\tau = \text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}$:

så är alltid

$$(I) \dots x^p \text{ eller } (\rho[\cos\theta + \sqrt{-1}\sin\theta])^p = \\ = \rho^p(\cos p\theta + \sqrt{-1}\sin p\theta),$$

$$(II) \dots ((x))^\mu \text{ eller } ((\rho[\cos\theta + \sqrt{-1}\sin\theta]))^\mu = \\ = \rho^\mu(\cos\mu\theta + \sqrt{-1}\sin\mu\theta)((1))^\mu = \\ = ((\rho))^\mu(\cos\mu\theta + \sqrt{-1}\sin\mu\theta);$$

och äfvenledes alltid, alltestersom α är positiv eller negativ,

$$(III) \dots x^p = (\pm\rho[\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau])^p = \\ = (\pm\rho)^p(\cos p\tau + \sqrt{-1}\sin p\tau),$$

$$(IV) \dots ((x))^\mu = ((\pm\rho[\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau]))^\mu = \\ = ((\pm\rho))^\mu \cos\mu\tau + \sqrt{-1}\sin\mu\tau,$$

och för $\alpha=0$ kan så väl öfra som nedra tecknet begagnas, med vilkor att med τ då förstås den limes, emot hvilken $\text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}$ convergerar vid indefinit afst-

gande nummervalörer af α , — således $\pm \frac{\pi}{2}$, då öfra tecknet begagnas, men $\mp \frac{\pi}{2}$ då det nedra, alltestersom β är positiv eller negativ;

vidare är städse

$$(V) \dots x^\mu = (\pm\rho[\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau])^\mu = \\ = (\pm\rho)^\mu(\cos\mu\tau + \sqrt{-1}\sin\mu\tau),$$

med förbehåll att öfra tecknet begagnas, då α är positiv eller noll (i hvilket sednare fall med τ förstås limites $\pm \frac{\pi}{2}$, alltestersom β är positiv eller negativ), och det nedra tecknet då α är negativ;

nemligen

$$(VI) \dots ((\rho))^{\mu} = \rho^{\mu} ((1))^{\mu},$$

$$(VII) \dots ((-\rho))^{\mu} = (-\rho)^{\mu} ((1))^{\mu} = \rho^{\mu} ((-1))^{\mu},$$

$$(VIII) \dots (-\rho)^{\mu} = \rho^{\mu} (-1)^{\mu} = \rho^{\mu} (\cos \mu \pi + \sqrt{-1} \sin \mu \pi);$$

samt

(IX) $((x))^{\mu} = x^{\mu} ((1))^{\mu}$: så att en quantitets alla μ -potenser kunna erhållas, derigenom att dess principala μ -potens successivt multipliceras med enhetens alla μ -potenser;

och slutligen, då α är negativ,

$$(X) \dots x^{\mu} = (-x)^{\mu} (-1)^{\mu}. —$$

För öfrigt ihågkommes, att

$$(XI) \dots ((1))^{\mu} = \cos 2k\mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin 2k\mu\pi,$$

$$(XII) \dots ((-1))^{\mu} = (-1)^{\mu} ((1))^{\mu} = (\cos \mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin \mu\pi) ((1))^{\mu},$$

(XII') $= \cos(2k+1)\mu\pi \pm \sqrt{-1} \sin(2k+1)\mu\pi$,
der k (indeterminerad) betyder "helt tal eller noll"; —

vidare: att när μ är rationel $= +$ eller $-\frac{m}{n}$ (m och n hela tal), så är man viss, att hafva erhållit alla (de högst n) särskilda valörerna af $((1))^{\mu}$ ur sednare membrum (XI) och af $((-1))^{\mu}$ ur sednare membrum (XII'), då man låtit i det förra af dessa båda $2k$ success. betyda alla de jemna tal (0 inclus.) och i det sednare $2k+1$ successivt betyda alla de udda tal, som finnas mellan 0 och n (inclusive); — samt att när $\frac{m}{n}$ är ett oförkortligt bråk (m och n sinsemellan primi, $n > 1$), så äro hvardera expressionens särskilda valörer

till antalet just n , och i samma händelse

$$(XIII) \dots\dots ((1))^{\pm \frac{m}{n}} = ((1))^{\frac{1}{n}},$$

$$(XIV) \dots\dots ((-1))^{\pm \frac{m}{n}} = ([-1]^m)^{\frac{1}{n}}.$$

Corollarium.

Om reela kvantiteters Rötter. — Enligt vårt theorem har hvarje kvantitet, reel eller imaginär, lika många särskilda rötter af en uppgifven grad, som gradnummern (index) utvisar; hvarjemte (IX) utvisar, att alla dess rötter af n :te graden (n helt tal) kunna erhållas, derigenom att kvantitetens principal-rot af denna grad multipliceras success. med enhetens alla n :te rötter. Och således, om A är ett *Tal*, är

$$(IX') \dots \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{A} = ((1))^{\frac{1}{n}} \cdot \sqrt[n]{A}, \\ \sqrt[n]{-A} = ((1))^{\frac{1}{n}} \cdot \sqrt[n]{-A}, \end{array} \right.$$

såsom ock redan (VI) och (VII) utvisade.

Och vill man hafva båda uttryckta i $\sqrt[n]{A}$ (d. ä. principal-roten ur kvantitetens nummervärd A eller, som man plägar kalla den, *Arithmetiska roten ur A* eller det *Tal*, som är n :te-rot ur A); så gifva (VI) och (VII)

$$(IX'') \dots \left\{ \begin{array}{l} \sqrt[n]{A} = ((1))^{\frac{1}{n}} \cdot \sqrt[n]{A}, \\ \sqrt[n]{-A} = ((-1))^{\frac{1}{n}} \cdot \sqrt[n]{A}, \end{array} \right.$$

som kunna utsägas sålunda: Reel kvantitets alla n :te-rötter kunna erhållas, derigenom att Arithmetiska n :te-roten ur kvantitetens numer. värde success. multipliceras med alla n :te-rötterna ur den
positiva

positiva eller negativa enheten, allteftersom qvantiteten själf är positiv eller negativ. — Det är för öfrigt ur dessa som man finner, att ibland alla n :te-rötterna ur ett Tal A blott en enda neml. $\sqrt[n]{A}$ är reel, då n är udda, men två neml. $\pm \sqrt[n]{A}$ då n är jemnt: samt att ibland n :te-rötterna ur en negativ qvantitet $(-A)$ är en enda reel $= -\sqrt[n]{A}$, då n är udda, men ingen då n är jemnt.

Nota. Man märke, att aldrig $\sqrt[n]{-A}$ är $= -\sqrt[n]{A}$ (då n är >1): den förra, principalroten ur $-A$, är alltid imaginär, nemligen

$$(X') \dots \sqrt[n]{-A} = \sqrt[n]{A} \cdot \sqrt[n]{-1} = \sqrt[n]{A} \left(\cos \frac{\pi}{n} + \sqrt[n]{-1} \sin \frac{\pi}{n} \right);$$

den sednare alltid reel \circ).

- *) Det kan vid flygtigt påseende förekomma stötande att icke såsom *principal-rot* (d. ä. med det enkla $\sqrt[n]{}$) utmärka den *reela* roten, då sådan finnes, ur negativ qvantitet: med andra ord, att man icke till principal-potens x^μ antagit *den* ibland μ -potenserna för x med negativ reel del, som reducerar sig till reel form för reelt x och då μ är af formen $\frac{1}{n}$, n udda [för jemnt n är ju ingen af de i $\sqrt[n]{-A}$ innesfattade reel]. — Men som alla μ -potenserna af x med negativ reel del innesfattas uti

$$((x))^\mu = \rho^\mu (\cos \mu \varphi + \sqrt[n]{-1} \sin \mu \varphi) [\cos(2k+1)\mu\pi \pm \sqrt[n]{-1} \sin(2k+1)\mu\pi],$$

så är klart, att nyssnämnde stötesten endast skulle kunna undvikas, derigenom att man till x^μ utvalde den, hvars $(2k+1)\mu$ har helt tals numerisk valör, då sådant *kan* inträffa. Och som sådant $2k+1$ alldeles icke finnes annat än i det speciela fall, att μ är *rational* och af en numer. valör, hvars nämnare är ett *udda* helt tal; så har man tydligen intet annat val

5. *Principal-potensers viktigaste egenskaper.* —
 Då x, x_1, x_2, \dots, x_n betyda kvantiteter hvilka-
 somhelst och p, p_1, p_2, \dots, p_n reela quant. hvilkas
 numer. värder äro hela tal eller noll; så är lätt
 att af éqv. (1) i föregående theorem deducera så-
 som *allmängiltiga* följande lagar (hvilka från ele-
 menterna äro bekanta såsom gällande för *Tal*
 x, x_1, \dots, x_n):

än att antingen fixera för tecknet x^μ flere särskilda
 betydelser, svarande mot särskilda μ -värder [hvil-
 ket verkligen skulle i sin mån kunna förleda till det
 orådet att med CAUCHY helt och hållet utdömma teck-
 net x^μ för x med negativ reel del], eller ock att,
 med åsidosättande af det skenbart stötande i åtgär-
 den, fixera betydelsen af x^μ så som här skett. Valet
 är snart träffadt, då man besinnar fördelen af att
 hafva sin bestämning sådan, att den håller stånd för
hvarje reel ja! ock imaginär värde af μ . Dertill kom-
 mer ännu ett annat högst viktigt men allt hitintills
 förbisedt skäl, hvars balt inses af de i mom. 2:o,
 3:o och 4:o i §. 5 angifna lagarne, hvilka antyda
 det öfverraskande constanta sambandet emellan de
 kvantitets-slag, som här blifvit utmärkta med x^μ (ja!
 $x^{\mu+\nu}\sqrt{-1}$), och lx — vare sig att x har negativ reel
 del eller ej. Af detta samband inses bland annat,
 att som man förgäfvess söker ibland de uti $L(x)$ inne-
 fattade kvantiteterna någon reel att utmärka med lx
 (då x har negativ reel del), så kan man ock vid
 utväljandet af x^μ ibland alla de $((x))^\mu$ skäligen lemna
 å sido den considerationen, att *tillfälligtvis* för en
 speciel μ -värde vissa ibland de motsvarande $((x))^\mu$ re-
 ducera sig till reela kvantiteters form. I motsatt fall
 skulle ock tydligen ifrågavarande samband blifva
 omintetgjordt tillika med de nyssnämnda deraf bero-
 ende högst inflytelserika lagarne.

Man kan för öfrigt med fog säga, att den reela
 n:te-roten ur $-A$ verkligen fått sig behörig utmär-
 kelse tillerkänd genom tecknet $-\sqrt[n]{A}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} x^p \cdot x^{p_1} \cdot x^{p_2} \cdot \dots \cdot x^{p_n} = x^{p+p_1+p_2+\dots+p_n}, \text{ och } \frac{x^{p_1}}{x^p} = x^{p_1-p}, \\ (x^p)^{p_1} = x^{pp_1}, \\ \text{och således} \quad = (x^{p_1})^p, \end{array} \right\}$$

$$x^p \cdot x_1^p \cdot x_2^p \cdot \dots \cdot x_n^p = (x x_1 x_2 \dots x_n)^p \text{ samt } \frac{x_1^p}{x^p} = \left(\frac{x_1}{x} \right)^p. -$$

Men de gälla icke, annat än med vissa förbehåll, för de händelser då exponenterna supponeras vara *reela quant.* $\mu, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ *hvilkasomhelst* (ehuru de äfven i dessa händelser, såsom bekant är, gälla för *Tal* x, x_1, x_2, \dots, x_n).

1:o)

Eqvationen

$$(19) \dots x^\mu \cdot x^{\mu_1} \cdot x^{\mu_2} \cdot \dots \cdot x^{\mu_n} = x^{\mu+\mu_1+\mu_2+\dots+\mu_n}$$

gäller dock alltid, och således äfven eqvationen

$$(20) \dots \dots \dots \frac{x^{\mu_1}}{x^\mu} = x^{\mu_1-\mu}$$

och specielt eqvationen

$$(20') \dots \dots \dots \frac{1}{x^\mu} = x^{-\mu}. -$$

Bevis. Ty då reela delen af x är ickenegativ, så gifver (V)

$$\begin{aligned} x^\mu x^{\mu_1} \dots x^{\mu_n} &= \rho^{\mu+\mu_1+\dots+\mu_n} \{ \cos(\mu+\mu_1+\dots+\mu_n)\tau + \\ &\quad + \sqrt{-1} \sin(\mu+\mu_1+\dots+\mu_n)\tau \} \\ &= x^{\mu+\mu_1+\dots+\mu_n}. \end{aligned}$$

Och då reela delen af x är negativ, så gifver (V) i förening med (VIII)

$$\begin{aligned} x^\mu x^{\mu_1} \dots x^{\mu_n} &= \rho^{\mu+\mu_1+\dots+\mu_n} \{ \cos(\mu+\mu_1+\dots+\mu_n)\tau + \\ &\quad + \sqrt{-1} \sin(\mu+\mu_1+\dots+\mu_n)\tau \} \cdot (-1)^\mu (-1)^{\mu_1} \dots (-1)^{\mu_n}, \end{aligned}$$

d. ä. emedan tydligen $(-1)^\mu (-1)^{\mu_1} \dots (-1)^{\mu_n}$ är

$$= (-1)^{\mu + \mu_1 + \dots + \mu_n} \text{ enl. (13),}$$

$$= x^{\mu + \mu_1 + \dots + \mu_n}. \text{ — H. S. B. —}$$

2:o)

Eqvationen

$$(21) \dots \dots \dots (x^\mu)^{\mu_1} = x^{\mu\mu_1},$$

gäller (för hvarje μ och μ_1) åtminstone så ofta som reela delen af x är ickenegativ och derjemte producten $\mu\tau$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$ (då med τ förstås, som vanligt).

Bevis. Ty i detta fall (reela delen af x icke-negativ) är enligt (V)

$$x^\mu = \rho^\mu (\cos \mu\tau + \sqrt{-1} \sin \mu\tau),$$

och vidare, emedan nu $\mu\tau$ var begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$,
 äfvenledes enligt (V)

$$(x^\mu)^{\mu_1} = \rho^{\mu\mu_1} (\cos \mu\mu_1\tau + \sqrt{-1} \sin \mu\mu_1\tau) = x^{\mu\mu_1}. \text{ — H.S.B.}$$

Den gäller ock, så ofta som reela delen af x är negativ och derjemte producten $\mu(\tau + \pi)$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$. — Ty emedan reela delen af x är negativ, så är enligt (V) och (VIII)

$$x^\mu = \rho^\mu [\cos \mu(\tau + \pi) + \sqrt{-1} \sin \mu(\tau + \pi)];$$

och som nu $\mu(\tau + \pi)$ var begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$, så är enligt (V)

$$(x^\mu)^{\mu_1} = \rho^{\mu\mu_1} [\cos \mu\mu_1(\tau + \pi) + \sqrt{-1} \sin \mu\mu_1(\tau + \pi)],$$

som ock i detta fall (reela delen af x negativ) är
 valören af $x^{\mu\mu_1}$, enligt (V) och (VIII). — H. S. B.

I hvilka fall för öfrigt éqv. (21) är giltig eller ej (för hvarje reel μ - och μ_1 -valör), är icke nödigt att här utsätta: det kan vid hvarje särskildt tillfälle, då så behöfves, undersökas. För öfrigt skall i efterföljande § 4 (sid. 113) angifvas ett allmännare kännetecken på de fall, då den är giltig. — Samma gäller om éqvationen

$$(22) \dots\dots\dots (x^\mu)^{\mu_1} = (x^{\mu_1})^\mu,$$

hvilken (enligt det nyss visade) tydligen gäller 1:o) då reela delen af x är ickenegativ samt både μ och μ_1 äro begränsade af $\pm \frac{\pi}{2}$, 2:o) då reela delen af x är negativ samt både $\mu(\tau+\pi)$ och $\mu_1(\tau+\pi)$ äro begränsade af $\pm \frac{\pi}{2}$. —

3:o)

Eqvationen

$$(23) \dots\dots x^\mu x_1^\mu \dots\dots x_n^\mu = (xx_1 \dots\dots x_n)^\mu$$

gäller (för hvarje μ) åtminstone så ofta som reela delarne af $x, x_1, \dots\dots x_n$ äro ickenegativa och derjemte summan

$$(24) \dots\dots\dots \tau + \tau_1 + \dots\dots\dots + \tau_n$$

är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$: — der nemligen

$$\tau = \text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}, \quad \tau_1 = \text{Arctg} \frac{\beta_1}{\alpha_1}, \dots\dots \tau_n = \text{Arctg} \frac{\beta_n}{\alpha_n},$$

och

$$x = \alpha + \beta \sqrt{-1}, \quad x_1 = \alpha_1 + \beta_1 \sqrt{-1}, \dots\dots x_n = \alpha_n + \beta_n \sqrt{-1}. \quad -$$

Bevis. Ty då reela delarne af samtliga $x, x_1, \dots\dots x_n$ äro ickenegativa och således (om $\varphi, \varphi_1, \dots\dots \varphi_n$ beteckna modylerna)

$$x = \rho(\cos\tau + \sqrt{-1}\sin\tau), x_1 = \rho_1(\cos\tau_1 + \sqrt{-1}\sin\tau_1), \dots\dots\dots$$

$$\dots\dots x_n = \rho_n(\cos\tau_n + \sqrt{-1}\sin\tau_n);$$

så är enligt éqv. (V)

$$x^\mu x_1^\mu \dots\dots x_n^\mu = (\rho\rho_1 \dots\dots \rho_n) \{ \cos\mu(\tau + \tau_1 + \dots + \tau_n) + \sqrt{-1}\sin\mu(\tau + \tau_1 + \dots + \tau_n) \},$$

$$\text{d. ä.} = (xx_1 \dots\dots x_n)^\mu, \text{ eftersom summan (24)}$$

var begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$. — H. S. B.

Hvad beträffar *det speciela fallet*

$$(23') \dots\dots\dots x^\mu x_1^\mu = (xx_1)^\mu,$$

så är tydligt, att det äfvan utsatta villkoret är satisfieradt, så ofta som, jemte det att reela delarne af x och x_1 äro ickenegativa, reela delen af *sjelfva* xx_1 är ickenegativ*). — Ett anmärkningsvärdt fall dessutom, i hvilket (23') gäller, är då reela delen af x är positiv och $x_1 = -1$: då är nemligen, enl. (X),

$$(23'') \dots\dots\dots x^\mu (-1)^\mu = (-x)^\mu. —$$

I hvilka fall för öfrigt éqv. (23) är giltig eller ej (för *hvarje* reel μ -värde), behöfver ej här ut sättas: det kan i hvarje särskildt fall, då så be höfves, undersökas. För öfrigt skall i efterföljande §. 4 (sid. 115) angifvas ett allmännare kännetec ken på de fall, då den är giltig. —

*) Då måste ju neml. $\tau + \tau_1$ nödvändigt vara begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$, eftersom ingen både *utom* dessa gränser fin nes som, utgörande summan af två τ och τ_1 , begrän sade af $\pm \frac{\pi}{2}$, har ickenegativ Cosinus.

4:o)

Equationen

$$(25) \dots\dots\dots \frac{x_1^\mu}{x^\mu} = \left(\frac{x_1}{x}\right)^\mu$$

gäller (för hvarje μ) åtminstone så ofta som reela delarne af så väl x och x_1 , som af qvoten $\frac{x_1}{x}$ äro ickenegativa. Ty i detta fall är, enligt (23'),
 $x^\mu \left(\frac{x_1}{x}\right)^\mu = x_1^\mu$. —

Häraf följer, att *équationen*

$$(25') \dots \left(\frac{1}{x}\right)^\mu = \frac{1}{x^\mu} \text{ och således } = x^{-\mu}, \text{ enligt (20'),}$$

gäller (för hvarje μ), så ofta som reela delen af x är ickenegativ. — Deremot gäller den icke, då reela delen af x är negativ (annat än då μ är af helt tals num. valör eller noll): ty i detta fall är

$$\left(\frac{1}{x}\right)^\mu = \left(-\frac{1}{x}\right)^\mu (-1)^\mu, \text{ enligt (X),}$$

men

$$x^{-\mu} = (-x)^{-\mu} (-1)^{-\mu}, \text{ enligt (X),}$$

d. ä. $= \left(-\frac{1}{x}\right)^\mu (-1)^{-\mu}$, eftersom här $-x$ har positiv reel del; men $(-1)^\mu$ och $(-1)^{-\mu}$ äro lika, endast då $\sin \mu \pi$ är $= 0$. —

§. 3.

Om betydelsen af tecknet A^y (A ett Tal)
 för hvarje valör af y .

Anmärkning. — Såsom föregående delar af Analysen antaga vi nu, jemte det hittills anförda i denna Afhandling, 1:o läran om Tals log-

arithmer (reela) och elementerna af läran om convergerande serier med reela termer enligt CAUCHY's framställning deraf i sin *Anal. Algébr.* Chap. VI — [således, i få ord sagdt, *det hufvudsakliga af CAUCHY's Anal. Algébr. Chap. I—VI*] — med tillägg af functionernas $\sin x$ och $\cos x$ utveckling efter digniteterna af x (reel) ^{*}), och 2:o) samma verks Chap. VIII §§. 1—4 ^{**}) samt af Chap. IX (om serier med imaginära termer) endast till pag. 289 orden "*Cela pose si l'on*" &c. ^{***}).

*) Som bekant är, uppskjuter CAUCHY deductionen här af ända till läran om serier med imaginära termer och deras summering. Vore sådant uppskof nödvändigt, så skulle man ock vara nödsakad att med CAUCHY uppskjutna definieringen af öfriga i närvarande Afhandling's titel upptagna tecken (x i sin fulla allmänlighet, o. öfr.) och discussionen af deras egenskaper, till dess de *efter* pag. 289 i §. 2 Chap. IX upptagna delar äfvensom den dervid förutsatta §. 5 af Chap. VIII (*Analyse Algébr.*) blifvit föredragna. — Men nu låter deductionen af functionernas $\sin x$ och $\cos x$ utveckling för reelt x ganska väl verkställa sig på grund af *Problemet* pag. 114 *Anal. Algébr.* [att här upptaga tid och rum dermed, vore olämpligt]; hvarföre vi ock hänföra detta ämne under Chap. VI af *Anal. Algébr.* och kunna derigenom nu omedelbart fortgå till här ifrågavarande teckens (x , $\log(x)$, $\sin x$, &c.) fullständiga definiering.

**) Dock är påtagligt, att vi förutsätta det i §. 1 pag. 243—246 anförda utbytt mot det nyss i vår §. 2 N:o 5 upptagna.

***) Hvad beträffar det derefter följande af §. 2 (summering af åtskilliga serier med imaginära termer) och den dervid förutsatta §. 5 af Chap. VIII, så är icke allenast — såsom sades — dessa delars kändedom alldeles icke nödvändig för definiering och discussion af här ifrågavarande tecken, utan derjemte saknas icke stora skäl för den opinion att de icke i Analysens system böra föredragas förrän *efter* nyssnämnda discussions fulländning.

I det föregående af Analysen är betydelse gifven åt tecknet

$$(1) \dots\dots\dots x^y,$$

hvilken quantitet (reel eller imaginär) man än må låta x betyda, *allenast* y är reel. — Återstår att finna, hvilken betydelse man lämpligen bör tilldela detta tecken för det allmänna fallet att exponenten y är en quantitet hvilkensomhelst $=\mu+\nu\sqrt{-1}$ (μ och ν reela). Vi skola härvid gå samma väg, som i det föregående af Analysen har blifvit följd vid bestämningen af tecknets x^y betydelse för reelt y , och således först bestämma tecknets $x^{\mu+\nu\sqrt{-1}}$ betydelse för det fall, att x är ett Tal $=A$, kortligen betydelsen af tecknet

$$(26) \dots\dots\dots A^{\mu+\nu\sqrt{-1}} \text{ eller } A^y. \text{ —}$$

Man finner sig (som bekant är) både berättigad och af analogi föranlåten att statuera, för hvarje y -värde,

$$(27) \dots A^y = 1 + \frac{yA}{1} + \frac{(yA)^2}{1.2} + \frac{(yA)^3}{1.2.3} + \&c.$$

och således speciellt (då e betyder Neperska systemets bas)

$$(27') \dots e^y = 1 + \frac{y}{1} + \frac{y^2}{1.2} + \frac{y^3}{1.2.3} + \&c.$$

och följaktligen har man städse för hvarje y -värde

$$(28) \dots\dots\dots A^y = e^{yA}. \text{ —}$$

Af den häraf följande *équationens*

$$(29) \dots\dots\dots e^x \cdot e^{x_1} = e^{x+x_1}$$

och den allmänna

$$(30) \dots A^x A^y \dots A^z = A^{x+y+\dots+z}$$

giltighet för hvarje (reel eller imaginär) valör af y, y_1, \dots, y_n härledes, på grund af functionernas $\text{Sin} x$ och $\text{Cos} x$ developpering för reelt x , det välbekanta uttrycket under finit form för $A^{\mu+\nu\sqrt{-1}}$, neml.

$$(31) \dots e^{\mu+\nu\sqrt{-1}} = e^\mu (\cos \nu + \sqrt{-1} \sin \nu)$$

och

$$(32) \dots A^{\mu+\nu\sqrt{-1}} = A^\mu (\cos[\nu A] + \sqrt{-1} \sin[\nu A]);$$

hvaraf vidare tydligen inses att städse, då A, A_1, \dots, A_n äro Tal,

$$(33) \dots A^x A_1^y \dots A_n^z = (A A_1 \dots A_n)^{x+y+\dots+z},$$

hvilken valör än må tilldelas y . —

Nota.

Deraf att éqv. (31) gifver, för hvarje reelt θ ,

$$e^{\theta\sqrt{-1}} = \cos \theta + \sqrt{-1} \sin \theta$$

är det som man, i stället för éqvationerna i theoremet §. 2, kan begagna följande kortare och såsom sådana i de flesta fall mera användbara:

$$(34) \dots x^p \text{ eller } (\rho e^{\theta\sqrt{-1}})^p = \rho^p e^{p\theta\sqrt{-1}},$$

$$(35) \dots ((x))^\mu \text{ eller } ((\rho e^{\theta\sqrt{-1}}))^\mu = \rho^\mu e^{\mu\theta\sqrt{-1}} ((1))^\mu = ((\rho))^\mu e^{\mu\theta\sqrt{-1}},$$

och, allteftersom α är positiv eller negativ,

$$(34') \dots x^p = (\pm \rho e^{\alpha\sqrt{-1}})^p = (\pm \rho)^p e^{p\alpha\sqrt{-1}},$$

$$(35') \dots ((x))^\mu = ((\pm \rho e^{\alpha\sqrt{-1}}))^\mu = ((\pm \rho))^\mu e^{\mu\alpha\sqrt{-1}},$$

samt för $\alpha=0$ det öfra eller nedra tecknet efter behag (med det vanliga förbehållet); — vidare, allteftersom α är ickenegativ eller negativ, principal-potensen

$$(36) \dots x^\mu = (\pm e^{\mp \sqrt{-1}})^\mu = (\pm e)^{\mu \sqrt{-1}};$$

samt

$$(37) \dots ((1))^\mu = e^{\pm 2k\mu\pi\sqrt{-1}} \text{ och} \\ ((-1))^\mu = (-1)^\mu ((1))^\mu = e^{\pm (2k+1)\mu\pi\sqrt{-1}},$$

$$(38) \dots (-1)^\mu = e^{\mu\pi\sqrt{-1}} = (e^{\pi\sqrt{-1}})^\mu. \text{ —}$$

§. 4.

1. Innan vi öfvergå till bestämning af betydelse för tecknet (1) i sin fulla allmänlighet (d. ä. sådan som passar för hvarje x - och y -värde), är nödigt att förutskicka den med föregående paragraf nära sammanhängande läran

Om quantiteters naturliga logarithmer.

Problem. Att finna alla de quantiteter z som satisfiera villkoret

$$(39) \dots e^z = \alpha + \beta\sqrt{-1},$$

(e bet. naturl. logarithm-systemets bas, α och β reela qvant.) eller, som är detsamma, då ϱ betecknar modulen $\sqrt{\alpha^2 + \beta^2}$, θ en reel qvant. (hvilken man behagat välja) ibland dem hvilkas cos. och sin. satisfiera (5):

Att finna alla de quantiteter z som satisfiera villkoret

$$(39') \dots e^z = \varrho(\cos\theta + \sqrt{-1}\sin\theta). \text{ —}$$

Hvarje sådan qvantitet (om den finnes) måste vara af formen $u+v\sqrt{-1}$ (u och v reela) och enligt problemets lydelse

$$e^{u+v\sqrt{-1}} = \rho(\cos\theta + V\sqrt{-1}\sin\theta),$$

d. ä.

eller $e''(\cos v + V\sqrt{-1}\sin v) = \rho(\cos\theta + V\sqrt{-1}\sin\theta),$

(40) $\begin{cases} e'' = \rho, \text{ och således } u = l\rho, \\ v \text{ af formen } \theta \pm 2k\pi. \end{cases}$

Af den förra éqv. (40) inses först, att om den framställda qvant. $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ är noll, så finnes ingen (ändlig) qvant. z som satisfierar problemet. — Men i hvarje annat fall satisfieras verkligen problemet — såsom lätteligen pröfvas — af hvarje i expressionen

$$(41) \dots\dots\dots z = l\rho + (\theta \pm 2k\pi)V\sqrt{-1}$$

inbegripen qvantitet (hvilket helt tal, 0 inclusive, man än må låta k betyda). —

En hvar af de qvant:r z , som satisfiera (39), skall kallas "en e -logarithm (äfven naturlig logarithm) för $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ " *): och det allmänna uttryck, som i sig innefattar alla dessa logarithmer för $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ eller x (kortligen), skall betecknas med $l((x))$. — Deraf éqvationen

$$(42) \dots\dots\dots l((x)) = l\rho + (\theta \pm 2k\pi)V\sqrt{-1},$$

der med θ förstås (se åfvan). —

T. ex.

*) Vi råka tydligen icke, genom denna definitions antagande, i collision med något i det föregående af analysen om *Tals* naturliga logarithmer statueradt.

I stället för " e -logarithm" säger man utförligare: " \logarithm i det system hvars bas är e ."

T.ex. Emedan man, då x är 1, kan till θ antaga 0,
och, då x är -1 , π ;
så finnes af (42), att

$$(43) \dots l((1)) = \pm 2k\pi\sqrt{-1}, \text{ alla imaginära utom} \\ \text{en} = 0, \text{ svarande mot } k=0,$$

$$(44) \dots l((-1)) = \pi\sqrt{-1} + l((1)) = \pm(2k+1)\pi\sqrt{-1}, \\ \text{alla imaginära.}$$

Och således kan i stället för (42) begagnas

$$(42') \dots l((x)) = l_{\rho} + l((1)) + \theta\sqrt{-1} = l((\rho)) + \theta\sqrt{-1};$$

hvilken *équation* utvisar, att en *quantitets* alla *e-logarithmer* erhållas, då man till någon — hvilken man behagar välja — ibland dem adderar $l((1))$ d. ä. successivt enhetens alla *e-logarithmer*. —

Nota. Här af inses att städse, då μ är reel (x icke noll),

$$(45) \dots e^{\mu l((x))} = ((x))^{\mu}. —$$

$$\text{Ty } e^{\mu l((x))} = e^{\mu l_{\rho} + (\theta \pm 2k\pi)\sqrt{-1}} = e^{\mu l_{\rho}} \cdot e^{\mu(\theta \pm 2k\pi)\sqrt{-1}}, \\ = ((x))^{\mu}, \text{ enl. (35). —}$$

2. Då α är positiv, kan man (§. 1 N:o 2) till θ antaga τ : och då antager *équationen* (42') formen

$$(46) \dots l((x)) = l_{\rho} + l((1)) + \tau\sqrt{-1} = l((\rho)) + \tau\sqrt{-1};$$

då α är negativ, kan man till θ antaga $\tau + \pi$; hvaraf

$$(46') \dots l((x)) = l_{\rho} + l((1)) + (\tau + \pi)\sqrt{-1} = \\ = l_{\rho} + l((-1)) + \tau\sqrt{-1} = l((- \rho)) + \tau\sqrt{-1};$$

och då α är noll, gäller den ena *équationen* lika väl som den andra, med vilkor att med τ då för-

stås den limes, mot hvilken $\text{Arctg} \frac{\beta}{a}$ convergerar vid indefinit aftagande nummervalörer af a , — således $\pm \frac{\pi}{2}$ i (46), men $\mp \frac{\pi}{2}$ i (46'), allteftersom β är positiv eller negativ. —

Med "*Principalvalören af $l(x)$* " eller "*Principalvalörens e -logarithmen för x* " skall förstås den dess valör, som enligt 2:a membrum af (46), då a är positiv eller noll, och enligt 2:a membrum af (46'), då a är negativ, motsvarar positionen $k=0$ i den allmänna expressionen (43) för $l(1)$. Den skall utmärkas med $l(x)$ eller lx^* . — Man har således

$$(47) \dots \dots \dots \begin{cases} l(1)=0, \\ l(-1)=\pi\sqrt{-1}; \end{cases}$$

och i allmänhet, då a är positiv eller noll,

$$(48) \dots \dots \dots lx = l_\rho + \tau\sqrt{-1},$$

då man i sednare fallet med τ förstår (som sådes); och, då a är negativ,

$$\begin{aligned} (48') \dots \dots \dots lx &= l_\rho + (\tau + \pi)\sqrt{-1} = \\ &= l_\rho + l(-1) + \tau\sqrt{-1} = \\ &= l(-\rho) + \tau\sqrt{-1}; \quad - \end{aligned}$$

*) Att vi genom denna bestämning af tecknets lx betydelse för hvarje x -valör verkligen bibehålle den i elementerna åt detta tecken för x = ett Tal A tillerkända betydelse, inses nog samt deraf att éqv. (48), som angifver den allmänna betydelsen af lx för hvarje x med positiv reel del, blir i detta speciella fall identisk. *Principalvalörens e -logarithmen för ett Tal* är således just den, som i elementerna blifvit kallad *e -logarithmen för talet*.

med få ord: man har städse

$$(49) \dots \dots \dots lx = l(\pm \rho) + \tau \sqrt{-1},$$

då neml. $-\rho$ begagnas för negativt α , eljest $+\rho$. —
Och således är, enligt (46) och (46'),

$$(50) \dots \dots \dots l((x)) = lx + l((1)),$$

hvilket ock i sjelfva verket redan förut var känt af orden näst efter eqvat. (42'). —

Af (49) inses ock att, då α är negativ, alltid

$$(51) \dots \dots \dots lx = l(-x) + l(-1),$$

men icke alltid eljest. —

Nota 1. Eqvat. (50) utvisar, att hvarje positiv qvan-
titet har blott en reel e -logarithm, neml.
sjelfva principal-logarithmen, men att ne-
gativ quantitet har ingen reel e -logarithm.

Nota 2. Af (49) inses att städse, då μ är reel
(x icke noll),

$$(52) \dots \dots \dots e^{\mu lx} = x^{\mu}. —$$

Ty (49) gifver

$$e^{\mu lx} = e^{\mu[l(\pm \rho) + \tau \sqrt{-1}]},$$

nemligen, då α är positiv eller noll,

$$= e^{\mu(l\rho + \tau \sqrt{-1})} = \rho^{\mu} e^{\mu \tau \sqrt{-1}} = x^{\mu} \text{ enl. (36),}$$

och, då α är negativ,

$$= e^{\mu(l\rho + \tau + \pi) \sqrt{-1}} = \rho^{\mu} e^{\mu(\tau + \pi) \sqrt{-1}} = x^{\mu} \text{ enl. (36). —}$$

Nota 3. Och nu följer af (52), som utvisar att μlx
är en af e -logarithmerna för x^{μ} , i förening
med lagen näst efter (42'), att

$$(53) \dots \dots \dots l((x^{\mu})) = \mu lx + l((1)). —$$

Ehuru nu enligt denna *équation* i förening med (50), som gifver $l((x^\mu)) = l(x^\mu) + l((1))$, man städse har

$$(54) \dots\dots l(x^\mu) + l((1)) = \mu l x + l((1));$$

så må man icke deraf draga den falska slutsats, att ock städse

principalen $l(x^\mu)$ är $= \mu l x$.

I hvilka fall $\mu l x$ är *principal-logarithmen* för x^μ , skall nedanför omnämnas. — *Eqv.* (54) utsäger ju allenast, att alla dess ena membri valörer äro $=$ hvar sin af dess andra membri valörer.

3. *Principal-logarithmers* (naturliga, nemligen) *viktigaste egenskaper*. — De egenskaper, som tillkomma *Tals* (x, x_1, \dots, x_n) reela logarithmer och som innefattas i *équationerna*

$$\left\{ \begin{array}{l} l(x^\mu) = \mu l x, \ (\mu \text{ reel}), \\ l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) = l(x x_1 \dots x_n), \\ l(x_1) - l(x) = l\left(\frac{x_1}{x}\right), \end{array} \right.$$

gälla icke obetingadt, då man med x, x_1, \dots, x_n menar *quantiteter* *hvilkasomhelst*. —

1:o)

Om *équationen*

$$(55) \dots\dots\dots l(x^\mu) = \mu l x$$

är detsamma att säga, som i 2:o) på sid. 100 sades om *équationen*

$$(21) \dots\dots (x^\mu)^{\mu_1} = x^{\mu\mu_1}. \quad -$$

Bevis. Alltid är $\mu l x$ en ibland *e-logarithmerna* för x^μ , enligt (52). — Men här skall visas, att den är $=$ sjelfva *principal-logarithmen* $l(x^\mu)$ i de båda ifrågavarande händelserna.

Principal-logarithmen för x^μ är definierad genom

$$(56) \dots \dots l(x^\mu) = l(\pm R) + TV\sqrt{-1},$$

då R betyder modulen för x^μ , och

$$T = \text{Arc}(\text{tg} = \frac{\text{coeff. för } V\sqrt{-1} \text{ uti } x^\mu}{\text{reela delen af } x^\mu}); \text{ och}$$

$$(57) \dots \dots \mu l x = \mu [l(\pm \rho) + \tau V\sqrt{-1}]. \text{ —}$$

Men nu är, enligt (36),

$$x^\mu = (\pm \rho)^\mu e^{\mu \tau V\sqrt{-1}},$$

nemligen $= \rho^\mu e^{\mu \tau V\sqrt{-1}}$, då α är ickenegativ,

och $= \rho^\mu e^{\mu(\tau + \pi)V\sqrt{-1}}$, då α är negativ.

Alltså är i förra fallet, så ofta som $\mu \tau$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$,

$$l(x^\mu) = l(\rho^\mu) + \mu \tau V\sqrt{-1} = \mu l x \text{ i detta fall;}$$

och i det sednare, så ofta som $\mu(\tau + \pi)$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$ (och således reela delen af x^μ icke negativ),

$$l(x^\mu) = l(\rho^\mu) + \mu(\tau + \pi)V\sqrt{-1} = \mu[l(-\rho) + \tau V\sqrt{-1}] = \mu l x \text{ i detta fall. —}$$

H. S. B.

I hvilka fall för öfrigt éqv. (55) gäller, det kan städs (då så behöfves) finnas utur éqvationerna (56) och (57) jemförda. —

Nota. Det vissa är, att så ofta som

$$(55) \dots \dots l(x^\mu) \text{ är } = \mu l x,$$

så gäller ock éqvationen

$$(21) \dots \dots (x^\mu)^{\mu'} = x^{\mu \mu'}. \text{ —}$$

Ty $(x^\mu)^\mu$ är alltid $=e^{\mu, l(x^\mu)}$ enligt (52) och således, så ofta som (55) gäller, $=e^{\mu, \mu l x}$, som städse är $=x^{\mu\mu}$, enligt (52). —

2:o)

Om *équationen*

$$(58) \dots l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) = l(xx, \dots x_n)$$

är detsamma att säga, som i 3:o på sid. 101 sades om *équationen*

$$(23) \dots x^\mu x_1^\mu \dots x_n^\mu = (xx, \dots x_n)^\mu. —$$

Bevis. Alltid är summan $l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n)$ en ibland *e*-logarithmerna för producten $(xx, \dots x_n)$, eftersom $e^{l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n)}$ alltid är $=xx, \dots x_n$, enligt (30). — Men här skall visas, att nämnda summa är = sjelfva principal-logarithmen $l(xx, \dots x_n)$ i den ifrågavarande händelsen. —

Principal-logarithmen för $(xx, \dots x_n)$ är definierad genom

$$(59) \dots l(xx, \dots x_n) = l(\pm R) + T\sqrt{-1},$$

då R bet. modulen för producten $xx, \dots x_n$, och

$$T = \text{Arc}(\text{tg} = \frac{\text{coëff. för } \sqrt{-1} \text{ deruti}}{\text{reela delen deraf}}); \text{ och}$$

$$(60) \dots l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) \text{ är } = l(\pm \varrho) + l(\pm \varrho_1) + \dots + l(\pm \varrho_n) + (\tau + \tau_1 + \dots + \tau_n)\sqrt{-1}.$$

När nu reela delarne af samtliga $x, x_1, \dots x_n$ äro ickenegativa, och således

$$l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) = l(\varrho, \varrho_1, \dots \varrho_n) + (\tau + \tau_1 + \dots + \tau_n)\sqrt{-1},$$

samt

$$l(xx, \dots x_n) = l(\varrho, \varrho_1, \dots \varrho_n) \cdot e^{(\tau + \tau_1 + \dots + \tau_n)\sqrt{-1}};$$

så äro tydligen båda lika, — så ofta som summan $\tau + \tau_1 + \dots + \tau_n$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$. —

H. S. B.

Hvad beträffar det speciela fallet

$$(58') \dots \dots l(x) + l(x_1) = l(xx_1),$$

så är klart att derom gäller detsamma, som på sid. 102 nämndes om *équationen*

$$(23') \dots \dots x^\mu x_1^\mu = (xx_1)^\mu:$$

det inberäknadt att, då reela delen af x är positiv, så väl *équationen*

$$(58'') \dots \dots l(x) + l(-1) = l(-x) \quad *)$$

som *équationen*

$$(23'') \dots \dots x^\mu (-1)^\mu = (-x)^\mu$$

är giltig. —

I hvilka fall för öfrigt *éqv.* (58) gäller, det kan städse (då så behöfves) finnas ur *équationerna* (59) och (60) jemförda. —

Nota. Det vissa är, att så ofta som

$$(58) \dots l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) \text{ är } = l(xx_1 \dots x_n),$$

så gäller ock *équationen*

$$(23) \dots x^\mu x_1^\mu \dots x_n^\mu = (xx_1 \dots x_n)^\mu. \text{ —}$$

Ty $x^\mu x_1^\mu \dots x_n^\mu$ är alltid $= e^{\mu(lx + lx_1 + \dots + lx_n)}$ enligt (52) och således, så ofta som (58) gäller, $= e^{\mu l(xx_1 \dots x_n)}$,

som städse är $= (xx_1 \dots x_n)^\mu$ enligt (52). —

*) Såsom ock redan *éqv.* (51) utvisade.

3:o)

Om *équationen*

$$(61) \dots\dots\dots l(x_1) - l(x) = l\left(\frac{x_1}{x}\right)$$

är detsamma att säga, som i 4:o) på sid. 103 sades om *équationen*

$$(25) \dots\dots\dots \frac{x_1^\mu}{x^\mu} = \left(\frac{x_1}{x}\right)^\mu.$$

Ty i detta fall (reela delarne af x , x_1 och $\frac{x_1}{x}$ icke-negativa) är enl. (58')..... $l(x) + l\left(\frac{x_1}{x}\right) = l(x_1)$. —

Häraf följer, att *équationen*

$$(61') \dots\dots\dots l\left(\frac{1}{x}\right) = -lx,$$

likasom *équationen*

$$(25') \dots\dots\dots \left(\frac{1}{x}\right)^\mu = x^{-\mu},$$

gäller, då reela delen af x är ickenegativ. — Att den icke gäller i motsatt fall, är klart deraf att i sådant fall $l(x) = l_\rho + \tau\sqrt{-1} + \pi\sqrt{-1}$,

$$\text{men } l\left(\frac{1}{x}\right) = -(l_\rho + \tau\sqrt{-1}) + \pi\sqrt{-1}. \text{ —}$$

Nota. Det vissa är, att så ofta som (61) gäller, så gäller ock (25). — Ty $\frac{x_1^\mu}{x^\mu}$ är alltid $= \frac{e^{\mu l x_1}}{e^{\mu l x}}$ enligt (52) eller $= e^{\mu(l x_1 - l x)}$ enligt (30) och således, så ofta som (61) gäller, $= e^{\mu l \left(\frac{x_1}{x}\right)}$, som enl. (52) städse är $= \left(\frac{x_1}{x}\right)^\mu$. —

Slut-anmärkning. — Vi hafva talat om principal-logarithmer, men böra slutligen erinra, att *équationen*

$$(62) \dots l((x)) + l((x_1)) + \dots + l((x_n)) = l((xx_1 \dots x_n))$$

och foljaktligen äfven

$$(63) \dots \dots \dots l((x_1)) - l((x)) = l\left(\left(\frac{x_1}{x}\right)\right)$$

samt specielt

$$(63') \dots \dots \dots l\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right) = -l((x))$$

äro legitima för hvarje valör af x, x_1, \dots, x_n (då, som vanligt, noll undantages), — såsom lätt är att enligt (42) pröfva. —

§. 5.

*Om betydelsen af tecknet x^y
för hvarje valör af x och y^* .* —

1. I det föregående af Analysen är statueradt:

1:o att, hvilken qvant. än x må vara $= \alpha + \beta \sqrt{-1}$ (α och β reela) då y är reel $= \mu$, man städse har

$$(64) \dots (\alpha + \beta \sqrt{-1})^\mu = (\pm \rho)^\mu e^{\mu \tau \sqrt{-1}} = e^{\mu l, \alpha + \beta \sqrt{-1}},$$

[neml. $-\rho$ för negativt α , eljest $+\rho$].

och 2:o att då x är positiv $= \rho$, och $y = \mu + \nu \sqrt{-1}$ (μ och ν reela),

$$(65) \dots \rho^{\mu + \nu \sqrt{-1}} = e^{(\mu + \nu \sqrt{-1}) l \rho} = \rho^\mu \cdot e^{\nu l \rho \sqrt{-1}}. \quad \text{—}$$

*) Som vanligt, förutsätta vi att x icke är noll. Angående betydelsen af 0^y se noten under sidan 81.

Som nu båda dessa éqvationer kunna sammanfattas i denna enda

$$(66) \dots\dots\dots x^y = e^{y^lx},$$

och något annat icke i det föregående af Analysen är statueradt om tecknet

$$(1) \dots\dots x^y \text{ eller } (\alpha + \beta \sqrt{-1})^{\mu + \nu \sqrt{-1}};$$

så är både tillåtligt och uppenbarligen af sakens natur påkalladt att ifrån denna stund (*ex analogia*) statuera éqvationen (66) såsom den allmänna definitionen af tecknets (1) betydelse i Analytisk Mathematik: — alltså, för att tala utförligt,

$$(66') \dots (\alpha + \beta \sqrt{-1})^{\mu + \nu \sqrt{-1}} = e^{(\mu + \nu \sqrt{-1}) \cdot l(\alpha + \beta \sqrt{-1})}. —$$

Denna (66) gifver för öfrigt, för hvarje positiv kvantitet ϱ ,

$$(67) \dots\dots\dots (\pm \varrho)^y = e^{y^l(\pm \varrho)},$$

och, då ϱ är modulen för x ,

$$(68) \dots\dots\dots x^y = (\pm \varrho)^y e^{y^l \sqrt{-1}}, \quad \text{allteftersom}$$

reela delen af x är ickenegativ eller negativ.

Och eftersom y^lx enligt (66) är en af e -logarithmerna för x^y , så är af orden näst efter éqvationen (42') klart, att éqvationen

$$(69) \dots\dots\dots l((x^y)) = e^{y^lx} + l((1))$$

gäller för hvarje valör af x och y . — Speciellt fall deraf var éqvat. (53). —

2. I alla händelser skall (i analogi med hvad förut är för speciella fall antaget) uttrycket x^y kallas "*quantitetens x principala y -potens*"*) och y kal-

*) Man skulle väl kunna i Analysen upptaga tecknet $((x))^y$ äfven för den händelsen att y är imaginär

las "*Exponent.*" — Hvad nu beträffar de hufvudsakligaste egenskaperna hos principal-potenser (då detta ord toges i sin vidsträcktaste betydelse) och deras naturliga logarithmer; så må här utsättas följande uppgifter, hvilka naturligtvis i sig innefatta (såsom specialiteter) de på sidd. 99—103, 105, 106 och 112—116 för principal-potenser med reel exponent uppräknade egenskaper:

1:o)

Eqvationen

$$(70) \dots x^y \cdot x^{y'} \dots x^{y_n} = x^{y+y'+\dots+y_n}$$

gäller alltid, och således äfven

$$(70') \dots \dots \dots \frac{x^{y'}}{x^y} = x^{y'-y}$$

samt speciellt eqvationen

$$(70'') \dots \dots \dots \frac{1}{x^y} = x^{-y}. —$$

Detta är klart af sjelfva definitionen (66) i för-
ening med éqv. (33). —

2:o)

Så ofta som eqvationen

$$(71) \dots \dots \dots l(x^y) = ylx$$

är legitim, så gäller ock eqvationen

$$(72) \dots \dots \dots (x^y)^{y'} = x^{yy'}. —$$

[i hvarje annan händelse är ju detta tecken antaget och dess betydelse angifven af éqv. (35) och (35')] Men till dess något behof deraf möjligen yppas, må det tillåtas att, såsom allt hitintills, anse detsamma öfverflödigt.

Ty $(x^y)^{y'}$ är $=e^{y' l(x^y)}$ enligt defin. (66) och således, så ofta som (71) gäller, $=e^{y' y l x}$ som städse är $=x^{y y'}$ enligt defin. (66). —

Hvad då beträffar giltigheten af (71), så må här utsättas att den gäller åtminstone

a) så ofta som reela delen af x är ickenegativ och derjemte quantiteten $\mu\tau + \nu\varrho$ är begränsad af $\pm\frac{\pi}{2}$, och

b) så ofta som reela delen af x är negativ och derjemte quantiteten $\mu(\tau + \pi) + \nu\varrho$ är begränsad af $\pm\frac{\pi}{2}$. —

Bevis. Emedan x^y städse är $=e^{y l x}$, så är städse $y l x$ en ibland $l(x^y)$. Men här skall visas, att den är = sjelfva principal-logarithmen $l(x^y)$ i de båda nämnda händelserna. —

Principal-logarithmen för x^y är definierad genom

$$(73) \dots\dots l(x^y) = l(\pm R) + T V^{-1},$$

då R och T betyda (såsom i (56) med utbyte af μ mot y); och

$$(74) \dots\dots y l x = y[l(\pm \varrho) + \tau V^{-1}]. \quad -$$

Men nu är, enligt (68),

$$x^y = (\pm \varrho)^y e^{y \tau V^{-1}},$$

$$\text{neml.} = \varrho^y e^{y \tau V^{-1}} = \varrho^{\mu + \nu V^{-1}} \cdot e^{(\mu + \nu V^{-1}) \tau V^{-1}},$$

då α är ickenegativ,

$$\text{och} = (-\varrho)^y e^{y \tau V^{-1}} = \varrho^{\mu + \nu V^{-1}} \cdot e^{(\mu + \nu V^{-1})(\tau + \pi) V^{-1}},$$

då α är negativ. —

I förra fallet är således

$$x^y = e^{\mu \varrho - \nu \tau} \cdot e^{(\mu \tau + \nu \varrho) V^{-1}},$$

och

och fölaktligen, så ofta som $\mu\tau + \nu l\rho$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$, enligt (49)

$$l(x^y) = \mu l\rho - \nu\tau + (\mu\tau + \nu l\rho)\sqrt{-1} = ylx \text{ i detta fall;}$$

i sednare fallet

$$x^y = e^{\mu l\rho - \nu(\tau + \pi)} \cdot e^{(\mu[\tau + \pi] + \nu l\rho)\sqrt{-1}},$$

och fölaktligen, så ofta som $\mu(\tau + \pi) + \nu l\rho$ är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$ (och således reela delen af x^y ickenegativ),

$$l(x^y) = \mu l\rho - \nu(\tau + \pi) + (\mu[\tau + \pi] + \nu l\rho)\sqrt{-1} = ylx$$

i detta fall (α negativ). —

H. S. B.

I hvilka fall för öfrigt éqv. (71) — och således äfven (72) — gäller, det kan städse (då så behöfves) finnas utur éqvationerna (73) och (74) jemförda. —

Nota. Af det nu sagda inses, att så ofta som de båda éqvationerna

$$l(x^y) = ylx \text{ och } l(x^{y'}) = y'l x$$

äro giltiga, så gäller ock éqvationen

$$(75) \dots\dots\dots (x^y)^{y'} = (x^{y'})^y :$$

och att detta inträffar, åtminstone

a) så ofta som reela delen af x är ickenegativ och derjemte så väl $\mu\tau + \nu l\rho$ som $\mu[\tau + \pi] + \nu l\rho$ äro begränsade af $\pm \frac{\pi}{2}$, och

b) så ofta som reela delen af x är negativ och derjemte så väl $\mu(\tau+\pi)+\nu l_\rho$ som $\mu_1(\tau+\pi)+\nu_1 l_\rho$ äro begränsade af $\pm \frac{\pi}{2}$,

då nemligen $y = \mu + \nu \sqrt{-1}$,

$y_1 = \mu_1 + \nu_1 \sqrt{-1}$. —

3:o)

Så ofta som *équationen*

$$(58) \dots l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) = l(xx, \dots x_n)$$

är legitim, så gäller ock *équationen*

$$(76) \dots x^{\mathcal{J}} x_1^{\mathcal{J}} \dots x_n^{\mathcal{J}} = (xx, \dots x_n)^{\mathcal{J}}. —$$

Ty $x^{\mathcal{J}} x_1^{\mathcal{J}} \dots x_n^{\mathcal{J}}$ är alltid $= e^{\mathcal{J}(lx + lx_1 + \dots + lx_n)}$ enligt defin. (66) och *éqv.* (30) och således, så ofta som (58) gäller, $= e^{\mathcal{J}l(xx, \dots x_n)}$ som städse är $= (xx, \dots x_n)^{\mathcal{J}}$ enligt defin. (66). —

Hvad åter beträffar giltigheten af (58), så är derom det nödvändiga redan anfördt i 2:o) på sid. 114. —

Så gäller t. ex. *équationen*

$$(76') \dots x^{\mathcal{J}} x_1^{\mathcal{J}} = (xx_1)^{\mathcal{J}},$$

åtminstone så ofta som reela delarne af så väl x och x_1 som af sjelfva xx_1 äro ickenegativa; och *équationen*

$$(76'') \dots x^{\mathcal{J}} (-1)^{\mathcal{J}} = (-x)^{\mathcal{J}},$$

så ofta som reela delen af x är positiv. —

4:o)

Så ofta som *équationen*

$$(61) \dots l(x_1) - l(x) = l\left(\frac{x_1}{x}\right)$$

är legitim, så gäller ock *équationen*

$$(77) \dots \frac{x_1^{\mathcal{J}}}{x^{\mathcal{J}}} = \left(\frac{x_1}{x}\right)^{\mathcal{J}}. —$$

(Beviset är enahanda med det i 2:o) och 3:o) begagnade). — Hvad åter beträffar giltigheten af éqv. (61), så är derom det nödvändiga redan anfördt i 3:o) på sid. 116. —

Så gäller t. ex. éqvationen

$$(77') \dots \dots \dots \left(\frac{1}{x}\right)^y = x^{-y},$$

då reela delen af x är ickenegativ. — I motsatt fall gäller den icke, annat än i den speciela händelse att y är reel och af helt tals numer. valör eller noll, — såsom lätt finnes på analog väg med den på sid. 103 näst efter éqv. (25') beträdda, då man dervid observerar att enligt (67)

$$(67') \dots (-1)^y = e^{\pi y \sqrt{-1}} = e^{-y\pi} (\cos \mu\pi + \sqrt{-1} \sin \mu\pi),$$

$$(-1)^{-y} = e^{-\pi y \sqrt{-1}} = e^{y\pi} (\cos \mu\pi - \sqrt{-1} \sin \mu\pi).$$

KAP. II.

Om betydelsen af tecknet

$$(1) \dots \dots \dots \text{Log}_b(x).$$

1. Till en början må vi upplösa följande med det sist anförda nära sammanhängande

Problem. Att finna alla de quantiteter z , som satisfiera vilkoret

$$(2) \dots b^z = a + \beta \sqrt{-1} \text{ eller } x \text{ (kortligen),}$$

då b betyder en uppgifven kvantitet (icke noll eller 1) *) samt a och β reela uppgifna kvantiteter. —

Enligt (66) kan villkoret (2) skrivas med

$$(2') \dots\dots\dots e^{z/b} = x,$$

hvaraf genast inses att, då x är noll, ingen (ändlig) kvant. z finnes som satisfierar problemet. **) —

Men i hvarje annat fall är équationen (2') likabetydande med denna

$$z = \frac{l((x))}{lb}, \text{ (enligt §. 4 N:o 1),}$$

som sålunda utgör den allmänna solutionen af vårt problem. —

Enhvar af de quant:r z , som satisfiera (2'), skall kallas "en b -logarithm för x " eller "en logarithm för x i det system hvars bas är b " ***): och det allmänna uttryck, som i sig innefattar alla dessa logarithmer för x , skall kortligen betecknas med $\text{Log}_b((x))$ eller — då någon förvillelse icke

*) Vore $b=1$; så följer af relationen $b^z = e^{z/b}$, d. ä. här $1^z = e^{z/l(1)}$, att frågan vore att finna alla de z -värder som satisfiera villkoret

$$e^{z/l(1)} = x.$$

Men någon sådan finnes tydligen icke i annat fall än det speciela, att x vore $=1$: och då satisfieras villkoret af hvilken z -värde som helst. —

**) Någon (ändlig) kvantitet $u + v\sqrt{-1}$ (u och v reela), som skulle satisfiera villkoret $e^{u+v\sqrt{-1}} = 0$, finnes ju uppenbarligen icke.

***) Det är själfklart, att vi genom denna definitions antagande icke råka i strid med hvad förut i Analysen är om benämningen *Logarithm* statueradt, utan tvärtom.

är att befara af bas-namnets utelemnande — helt enkelt $\text{Log}((x))^*$. — Alltså är, under förutsättning att basen b hvarken är noll eller 1 (och x icke noll),

$$(3) \dots \dots \text{Log}_b((x)) = \frac{l((x))}{lb};$$

hvaraf inses, att en *quantitets* alla b -logarithmer erhållas, då man till någon ibland dem — hvilken man behogat utvälja — adderar

$$(4) \dots \text{Log}_b((1)) = \frac{l((1))}{lb} = \pm \frac{2k\pi\sqrt{-1}}{lb},$$

d. ä. successivt enhetens alla b -logarithmer **). —

För öfrigt gifver tydligen éqv. (3)

$$(3') \dots \text{Log}_b((x)) = \frac{l((\rho)) + \theta\sqrt{-1}}{lb} = \text{Log}_b((\rho)) + \frac{\theta}{lb}\sqrt{-1},$$

då θ betyder (som vanligt). —

Nota. Af éqv. (3) följer att städse, då μ är reel (x icke noll),

$$(5) \dots b^{\mu \text{Log}_b((x))} = ((x))^\mu. —$$

Ty $b^{\mu \text{Log}_b((x))}$ är $= e^{\mu \text{Log}((x)) \cdot lb}$ enligt (66),

d. ä. $= e^{\mu l((x))}$ enligt (3),
 $= ((x))^\mu$ enligt (45). —

*) Tecknet $\text{Log}_e((x))$ är således likabetydande med det förut begagnade $l((x))$, — hvarmed ock efterföljande éqv. (3) öfverensstämmer.

**) Ty tag en af b -logarithmerna för x , hvilken som behagas, kortligen $\mathcal{L}(x)$. — Låt motsvarande e -log. för x betecknas med $\lambda(x)$. [Eqv. (3) utvisar ju, att verkligen mot *hvarje* särskild b -logarithm för x svarar en e -logar. för x]. — Nu är, enligt orden näst efter éqv. (42'),

$$l((x)) = \lambda(x) + l((1)),$$

således enligt (3)

$$\text{Log}_b((x)) = \frac{\lambda(x)}{lb} + \frac{l((1))}{lb} = \mathcal{L}(x) + \text{Log}_b((1)). —$$

2. Då reela delen af x är positiv och man således till θ får antaga $\tau = \text{Arctg} \frac{\beta}{\alpha}$, så gifver (3')

$$(6) \dots \text{Log}_b((x)) = \frac{l((\rho)) + \tau \sqrt{-1}}{lb} = \text{Log}_b((\rho)) + \frac{\tau}{lb} \sqrt{-1};$$

men, då α är negativ och man således till θ får antaga $\tau + \pi$,

$$(6') \dots \text{Log}_b((x)) = \frac{l((- \rho)) + \tau \sqrt{-1}}{lb} = \text{Log}_b((- \rho)) + \frac{\tau}{lb} \sqrt{-1};$$

och då α är noll och man således till θ får antaga efter behag τ eller $\tau + \pi$ med det vanliga förbehållet, så gäller den ena *équationen* lika väl som den andra. —

Med "*Principalvärdet af $\text{Log}_b((x))$* " eller "*Principal b -logarithmen för x* " skall menas den ibland de i sednare *membrum* (3) innefattade *quantit*, hvilken betecknas med $\frac{lx}{lb}$, med andra ord: den ibland b -logarithmerna, som motsvarar *principal e -logarithmen*. — Den skall utmärkas med $\text{Log}_b(x)$ eller $\text{Log} x$ *). — Man har således *équationen*

*) Att vi genom denna bestämning af tecknets $\text{Log}_b(x)$ betydelse för *hvarje x -värde och hvarje b -värde* (1 och 0 undantagna) verkligen bibehålle den i elementerna åt detta tecken, för den händelse att så väl x som b äro *Tal*, tillerkända betydelse, inses nog samt deraf att *équationen* (7) för denna händelse är identisk. — *Principal b -logarithmen* för ett *Tal*, då basen b själf är ett *Tal*, är således just den som i elementerna blifvit kallad *b -logarithmen* för talet. — Och att "*Principal e -logarithmen*" enligt nu antagna definition är just den *quantitet*, som i det föregående kapitlet I blifvit utmärkt med detta namn, är påtagligt af själfva definitionen. — Tecknet $\text{Log}_e(x)$ är således likabetydande med lx . —

$$(7) \dots \text{Log}_b(x) = \frac{lx}{lb} = \frac{l(\pm\rho) + \tau\sqrt{-1}}{lb} = \text{Log}_b(\pm\rho) + \frac{\tau}{lb}\sqrt{-1},$$

nemligen $-\rho$, då α är negativ, eljest $+\rho$; — och speciellt

$$(8) \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \text{Log}_b(1) = \frac{l(1)}{lb} = 0, \\ \text{Log}_b(-1) = \frac{l(-1)}{lb} = \frac{\pi}{lb}\sqrt{-1}. \text{ —} \end{array} \right.$$

För öfrigt inses af orden näst efter éqv. (3), att städse

$$(9) \dots \text{Log}_b((x)) = \text{Log}_b(x) + \text{Log}_b((1));$$

och af éqv. (7) att, då α är negativ, städse

$$(10) \dots \text{Log}_b(x) = \text{Log}_b(-x) + \text{Log}_b(-1),$$

men icke alltid i motsatt fall.

3. Frågan, "när en uppgifven *quantitets principal-logarithm är reel*," är nu lätt besvarad med stöd af éqv. (7), — som, då med R betecknas basens modyl

$$\text{och med } T \text{ menas } \text{Arc}(\text{tg} = \frac{\text{coëff. för } \sqrt{-1} \text{ i basen}}{\text{basens reela del}}),$$

kan skrivas med

$$(7') \dots \text{Log}_b(x) = \frac{lx}{lb} = \frac{l(\pm\rho) + \tau\sqrt{-1}}{l(\pm R) + T\sqrt{-1}} \quad (\text{nämnaren}$$

städse finit och icke $=0$)^{*}. —

^{*}) Man förutsätter nemligen städse (som sagdt är), att basen b icke är 1 (eller noll) och således lb städse finit och icke $=0$. —

1:o) Då reela delen af x är ickenegativ:

$$\text{Log}_b(x) = \frac{l_\rho + \tau \sqrt{-1}}{l(\pm R) + T \sqrt{-1}} \quad -$$

a) Om basens reela del är ickenegativ:

$$\text{Log}_b(x) = \frac{(l_\rho + \tau \sqrt{-1})(lR - T \sqrt{-1})}{(lR)^2 + T^2},$$

således reelt endast i de fall, då vilkoret

$$(11) \dots \dots \tau lR - T l_\rho = 0 \text{ eller } R^2 = \rho^2$$

är satisfieradt. I hvarje system, hvars bas's R och T satisfiera detta vilkor, är då den reela

$$(12) \dots \dots \text{Princip. Log}_b(x) = \frac{lR l_\rho + T \tau}{lR lR + T T} \quad -$$

b) Om basens reela del är negativ:

$$\text{Log}_b(x) = \frac{(l_\rho + \tau \sqrt{-1})(lR - (T + \pi) \sqrt{-1})}{(lR)^2 + (T + \pi)^2},$$

således reelt endast i de fall, då vilkoret

$$\tau lR - (T + \pi) l_\rho = 0 \text{ eller } R^2 = \rho^2 \dots \dots (13)$$

är satisfieradt. I hvarje system, hvars bas's R och T satisfiera detta vilkor, är då den reela

$$\text{Princip. Log}_b(x) = \frac{lR l_\rho + (T + \pi) \tau}{lR lR + (T + \pi)(T + \pi)} \quad - \dots (14)$$

T. ex. Talet 1 har sin principal-logarithm reelt och $= 0$ i hvarje system (såsom ock redan (8) utvisade). Hvarje annat Tal ρ har reelt principal-logarithm endast i de systemer, hvilkas bas själf är ett Tal. — Ty $\tau = 0$ reducerar vilkoret (11) till $T l_\rho = 0$, d. ä. $T = 0$, och lennar R arbitrar; och $\tau = 0$ reducerar vilkoret (13) till $(T + \pi) l_\rho = 0$, som på intet sätt kan satisfieras, då ρ icke är $= 1$.

Då reela delen af x är negativ:

$$\text{Log}_b(x) = \frac{l_\rho + (\tau + \pi)\sqrt{-1}}{l(\pm R) + T\sqrt{-1}}. \quad -$$

a) Om basens reela del är icke negativ:

$$\text{Log}_b(x) = \frac{[l_\rho + (\tau + \pi)\sqrt{-1}](lR - T\sqrt{-1})}{(lR)^2 + T^2},$$

således reel endast i de fall, då vilkoret

$$(15) \dots (\tau + \pi)lR - Tl_\rho = 0 \text{ eller } R^{\tau + \pi} = \frac{T}{\rho}$$

är satisfieradt. I hvarje system, hvars bas's R och T satisfiera detta vilkor, är då den reela

$$(16) \dots \text{Princip. Log}_b(x) = \frac{lR l_\rho + T(\tau + \pi)}{lR lR + TT}. \quad -$$

T . ex. Emedan positionen x = negativ qvant. $-\rho$ (således $\tau = 0$) reducerar vilkoren (15) och (17) till

$$(15') \dots \dots \dots \pi lR = Tl_\rho \quad \text{och} \quad \pi lR = (T + \pi)l_\rho, \dots \dots \dots (17')$$

b) Om basens reela del är negativ:

$$\text{Log}_b(x) = \frac{[l_\rho + (\tau + \pi)\sqrt{-1}](lR - (T + \pi)\sqrt{-1})}{(lR)^2 + (T + \pi)^2},$$

således reel endast i de fall, då vilkoret

$$(\tau + \pi)lR - (T + \pi)l_\rho = 0 \text{ eller } R^{\tau + \pi} = \frac{T + \pi}{\rho} \dots (17)$$

är satisfieradt. I hvarje system, hvars bas's R och T satisfiera detta vilkor, är då den reela

$$\text{Princip. Log}_b(x) = \frac{lR l_\rho + (T + \pi)(\tau + \pi)}{lR lR + (T + \pi)(T + \pi)}. \dots (18)$$

T . ex. Emedan positionen x = negativ qvant. $-\rho$ (således $\tau = 0$) reducerar vilkoren

$$(17') \dots \dots \dots \pi lR = (T + \pi)l_\rho, \dots \dots \dots (17')$$

så inses utan svårighet *), att: *Negativ kvantitet* $- \rho$ (vare sig -1 eller annan) har icke reel Principal-logarithm i något annat system med reel bas än i det enda, hvars bas är sjelfva den negativa quant. $- \rho$: der är den $=1$. Och i systemer med imaginär bas har $- \rho$ reel princip. log. endast a) i dem, hvilkas bas har ickeneg. reel del och för öfrigt satisfierar vilkoret

$$R^{\frac{1}{T}} = \rho^{\frac{1}{\pi}}, \dots \dots \dots (15'')$$

och

b) i dem, hvilkas bas har negativ reel del och för öfrigt satisfierar vilkoret

$$R^{\frac{1}{T+\pi}} = \rho^{\frac{1}{\pi}}; \dots \dots \dots (17'')$$

och att således kvantiteten -1 icke har reel principal-logarithm i något annat system än i dem, hvilkas bas-modul är $=1$: i hvarje sådant är

$$\text{Log}(-1) = \frac{\pi}{T} \text{ eller } \frac{\pi}{T+\pi}, \text{ alltestersom}$$

basens reela del är ickenegativ eller negativ. —

Nota. För öfrigt är tydligt, att éqv. (11), (13), (15) och (17) innefatta svaret på den frågan, "hvilka slags kvantiteter hafva reel principal-logarithm i ett uppgifvet system". —

*) Nemligen: 1:o) Positionen $x = -1$ reducerar (15') och (17') till $\pi l R = 0$, d. ä. $R = 1$. —

2:o) Om x är någon annan negativ quant. $- \rho$; så a) kan icke (15') satisfieras af någon reel bas: ty positionen $T = 0$ reducerar (15') till $l R = 0$ d. ä. $R = 1$ och således basen (som i (15')) supponeras hafva ickenegativ reel del $= 1$; men sådan bas är en gång för alla bannlyst. I st. för (15') kan således sägas (15''). Och b) klart är, att (17') kan satisfieras af $T = 0$ (basen reel) endast med det vilkor att man derjemte antager $R = \rho$ (basen $= -\rho$), och för öfrigt att i st. för (17') kan sägas (17''). —

4. Analogt med hvad éqv. (52) och den allmänna (66) angifva för basen e , har man enligt definitionen (7) för hvarje bas b städse *)

$$(19) \dots\dots\dots b^{y \text{Log}_b(x)} = x^y,$$

och således [enligt orden näst efter (3)], analogt med hvad (53) och den allmänna (69) angäfvit för basen e ,

$$(20) \dots \text{Log}_b((x^y)) = y \text{Log}_b(x) + \text{Log}_b((1)). \text{ —}$$

Och hvad beträffar öfriga egenskaper hos Principal-logarithmer i ett system hvilketsomhelst, så följer af definitionen (7) att i hvarje fall, då éqvationerna

$$\left\{ \begin{array}{l} l(x^y) = ylx, \\ l(x) + l(x_1) + \dots + l(x_n) = l(xx_1 \dots x_n) \text{ och } l(x) + l(-1) = l(-x), \\ l(x_1) - l(x) = l\left(\frac{x_1}{x}\right) \text{ och } l\left(\frac{1}{x}\right) = -lx \end{array} \right.$$

gälla, så äro de ock giltiga, om man i dem i stället för l substituerar Log_b . —

Och slutligen inses af definitionen (2), att de tre éqvationerna i slutanmärkningen på sid. 117 gälla utan undantag, äfven om de utbytas emot dessa

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Log}_b((x)) + \text{Log}_b((x_1)) + \dots + \text{Log}_b((x_n)) = \text{Log}_b((xx_1 \dots x_n)), \\ \text{Log}_b((x_1)) - \text{Log}_b((x)) = \text{Log}_b\left(\left(\frac{x_1}{x}\right)\right) \text{ och} \\ \text{Log}_b\left(\left(\frac{1}{x}\right)\right) = -\text{Log}_b((x)). \text{ —} \end{array} \right.$$

*) Ty $b^{y \text{Log}_b x}$ är $= e^{y \text{Log}_b x \cdot \text{Log}_b b}$ enligt (66), d. ä. $= e^{y \text{Log}_b x}$ enligt (7) eller $= x^y$ enligt (66). —

KAP. III.

Om betydelsen af tecknen

$\text{Sin } x$ och $\text{Cos } x$,
 $\text{Arcsin } x$ och $\text{Arccos } x$.

§. 1.

*Om betydelsen af tecknen $\text{Sin } x$ och $\text{Cos } x$
 för hvarje valör af x .*

För hvarje reelt x gifver éqvationen (31)
 i Kap. I

$$(1) \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \text{Cos } x + \sqrt{-1} \text{Sin } x = e^{x\sqrt{-1}}, \\ \text{Cos } x - \sqrt{-1} \text{Sin } x = e^{-x\sqrt{-1}}; \end{array} \right.$$

hvad an

$$(2) \dots \dots \left\{ \begin{array}{l} \text{Cos } x = \frac{e^{x\sqrt{-1}} + e^{-x\sqrt{-1}}}{2}, \\ \text{Sin } x = \frac{e^{x\sqrt{-1}} - e^{-x\sqrt{-1}}}{2\sqrt{-1}}. \end{array} \right.$$

För imaginär valör af x är i det föregående af Analysen ingen betydelse tilldelad de båda tecknen $\text{Sin } x$ och $\text{Cos } x$. — Vi kunna således utan fara för collision öfverenskomma att med dessa tecken i alla händelser mena de båda sednare membra (2) eller — då i stället för x utsättes $\alpha + \beta\sqrt{-1}$ och behörigt afseende göres på éqv. (31) i Kap. I —

$$(2') \dots \begin{cases} \sin(\alpha + \beta \sqrt{-1}) = \frac{e^\beta + e^{-\beta}}{2} \sin \alpha + \frac{e^\beta - e^{-\beta}}{2} \cos \alpha \cdot \sqrt{-1}, \\ \cos(\alpha + \beta \sqrt{-1}) = \frac{e^\beta + e^{-\beta}}{2} \cos \alpha - \frac{e^\beta - e^{-\beta}}{2} \sin \alpha \cdot \sqrt{-1}. \end{cases}$$

Medelst dessa formler (2') eller (2) är ytterst lätt att vid förefallande behof verificera giltigheten af de lagar, som gälla för $\sin x$ och $\cos x$ då x är reel, äfven för det allmänna fall att x är en qvant. hvilkensomhelst. — Vi anføra här de bekanta grundformlerna

$$(3) \dots \begin{cases} \sin(x \pm y) = \sin x \cos y \pm \cos x \sin y, \\ \cos(x \pm y) = \cos x \cos y \mp \sin x \sin y, \end{cases}$$

hvilkas giltighet för hvarje x - och y -värde lättligen verificeras medelst éqv. (2) och (29): och ur hvilkas giltighet man kan vid förefallande behof deducera öfrigas, t. ex.

$$(4) \dots \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{2} \mp x\right) = \cos x, \\ \sin(\pi \mp x) = \pm \sin x; \\ \cos\left(\frac{\pi}{2} \mp x\right) = \pm \sin x, \\ \cos(\pi \mp x) = -\cos x; \end{cases}$$

o. s. v.

Slutligen observeras, att som för hvarje x -värde (reel eller imaginär), enligt (27') i Kap. I,

$$\begin{cases} e^{x\sqrt{-1}} = 1 + \frac{x}{1}\sqrt{-1} - \frac{x^2}{1 \cdot 2} - \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}\sqrt{-1} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \&c. \\ e^{-x\sqrt{-1}} = 1 - \frac{x}{1}\sqrt{-1} - \frac{x^2}{1 \cdot 2} + \frac{x^3}{1 \cdot 2 \cdot 3}\sqrt{-1} + \frac{x^4}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} - \&c. \end{cases}$$

så måste ock [på grund af det pag. 289 af "*Analyse Algèbr.*" åberopade Théor. 3:e] enligt éqv. (2), för hvarje x -värde,

$$(5) \dots \begin{cases} \sin x = x - \frac{x^3}{1.2.3} + \frac{x^5}{1.2.3.4.5} - \&c. \\ \cos x = 1 - \frac{x^2}{1.2} + \frac{x^4}{1.2.3.4} - \&c. \end{cases} \quad *)$$

§. 2.

Om betydelsen af tecknet $\text{Arcsin } x$ **) för hvarje värde af x . —

1. Till en början må vi upplösa följande, med det nyss anförda nära sammanhängande,

Problem.

Att finna alla de quantiteter z , som satisfiera villkoret

$$(6) \dots \dots \dots \sin z = \alpha + \beta \sqrt{-1} = x,$$

(α och β reella quant. hvilkasomhelst).

*) Som bekant är, utgöra dessa éqvationer CAUCHY'S Definitioner af $\sin x$ och $\cos x$, och deremot våra Definitioner [éqvationerna (2)] Corollarier deraf. — Ordningen kan här vara ligkiltig; men det synes falla sig enklare att låta de formler, som hafva *finit* form, gälla såsom Definitioner, — då man så kan. —

**) Man erinre sig, att när x är reel och numeriskt ≤ 1 , enligt hvad i det föregående af Analysen är statueradt, med tecknet $\text{Arcsin}((x))$ menas

$$\pm \left(\text{Arcsin } x - \frac{\pi}{2} \right) + \frac{\pi}{2} \pm 2k\pi = \text{Arcsin}((1)) \pm \left(\text{Arcsin } x - \frac{\pi}{2} \right),$$

der " $\text{Arcsin } x$ " är begränsad af $\pm \frac{\pi}{2}$. —

Hvarje sådan qvantitet (om den finnes) måste vara af formen $u+v\sqrt{-1}$ (u och v reela) och, enligt Problemets lydelse,

$$\sin(u+v\sqrt{-1}) = \alpha + \beta\sqrt{-1},$$

d. v. s. [enligt (2') i föreg. §.]

$$(6'') \dots \frac{e^v + e^{-v}}{2} \sin u + \frac{e^v - e^{-v}}{2} \cos u \cdot \sqrt{-1} = \alpha + \beta\sqrt{-1},$$

d. v. s.

$$(6'') \dots \dots \dots \begin{cases} \frac{e^v + e^{-v}}{2} \sin u = \alpha, \\ \frac{e^v - e^{-v}}{2} \cos u = \beta. \end{cases} \text{ —}$$

Supponera vi nu, att

1:o)

hvarken α eller $\beta = 0$,

så kunna uppenbarligen i stället för équationerna (6'') substitueras

$$(7) \dots \dots \dots \begin{cases} \frac{e^v + e^{-v}}{2} = \frac{\alpha}{\sin u}, \\ \frac{e^v - e^{-v}}{2} = \frac{\beta}{\cos u}, \end{cases}$$

(eftersom i detta fall hvarken $\sin u$ eller $\cos u$ kan vara $= 0$); hvadan

$$(8) \dots \dots \dots \begin{cases} e^v = \frac{\alpha}{\sin u} + \frac{\beta}{\cos u}, \\ e^{-v} = \frac{\alpha}{\sin u} - \frac{\beta}{\cos u}, \end{cases}$$

och således (för bestämningen af u)

$$(9) \dots\dots\dots \frac{1}{\frac{\alpha}{\text{Sin}u} + \frac{\beta}{\text{Cos}u}} = \frac{\alpha}{\text{Sin}u} - \frac{\beta}{\text{Cos}u},$$

eller — emedan enligt (8) u , om den finnes, måste vara sådan att $\frac{\alpha}{\text{Sin}u}$ och $\frac{\beta}{\text{Cos}u}$ icke äro numeriskt lika —

$$\frac{\alpha^2}{\text{Sin}^2u} - \frac{\beta^2}{\text{Cos}^2u} = 1,$$

eller $\text{Cos}^4u - (1 - \alpha^2 - \beta^2)\text{Cos}^2u - \beta^2 = 0$,
eller (eftersom Cos^2u omöjligen kan vara negativ)

$$\begin{aligned} \text{Cos}^2u &= \frac{1 - \alpha^2 - \beta^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 - \alpha^2 - \beta^2}{2}\right)^2 + \beta^2} = \\ &= \frac{\beta^2}{-\frac{1 - \alpha^2 - \beta^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 - \alpha^2 - \beta^2}{2}\right)^2 + \beta^2}}, \end{aligned}$$

således

$$\begin{aligned} \text{Sin}^2u &= \frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2} - \sqrt{\left(\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2}\right)^2 - \alpha^2} = \\ &= \frac{\alpha^2}{\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2}\right)^2 - \alpha^2}}, \end{aligned}$$

och (emedan enligt (7) $\text{Sin}u$ måste vara af samma tecken som α)

$$(10) \dots \text{Sin}u = \frac{\alpha}{\sqrt{\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2}\right)^2 - \alpha^2}}} = \gamma^* \text{ (kortligen)},$$

*) Denna γ är verkligan numeriskt < 1 . — Ty vore γ numer. ≥ 1 , d. ä.

$$\sqrt{\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2}\right)^2 - \alpha^2}} > \alpha^2,$$

eller (som säger detsamma)

$$(11) \dots u = \text{Arcsin}(\gamma) = \text{Arcsin}(1) \pm \left(\text{Arcsin} \gamma - \frac{\pi}{2} \right). -$$

Härmed är således funnet, att valören af u uti $u + v\sqrt{-1}$ (om sådan finnes) måste vara någon af de i detta sednare membrum innefattade qvantiteter, och således

$\text{Cos} u = \pm \sqrt{1 - \gamma^2}$, allteftersom u är af öfra eller nedra formen (11); följaktligen, enligt den förra af éqv. (8),

$$e^v = \frac{\alpha}{\gamma} \pm \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}},$$

eller, som är detsamma (eftersom här endast är fråga om reel qvantitet v),

$$v = l \left(\frac{\alpha}{\gamma} \pm \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}} \right)^{**},$$

(12) . . . = $\pm l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}} \right)$, enligt éqv. (a) som gifver

$$l \left(\frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}} \right) = - l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}} \right). -$$

så skulle ock

$$\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2} - \alpha^2 + \sqrt{\left(\frac{1 + \alpha^2 + \beta^2}{2} \right)^2 - \alpha^2} \text{ vara } \leq 0$$

$$\text{eller } \frac{1 - \alpha^2 + \beta^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1 - \alpha^2 + \beta^2}{2} \right)^2 + \alpha^2 \beta^2} \leq 0;$$

hvilket är orimligt, då hvarken α eller β är $= 0$. -

*) Att hvardera af $\frac{\alpha}{\gamma} \pm \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}}$ verkligen är positiv,

Och som äfven den sednare af éqv. (8) gifver samma v -värder; så är nu funnet att, *åtminstone* då hvarken α eller β är noll, hvarje qvantitet z (om sådan finnes) *måste* vara inbegripen uti

$$(13) \dots z = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ \text{Arcsin} \gamma - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right) \right\} -$$

Att ock verkliga hvarje qvantitet, som innefattas i detta sednare membrum, satisfierar problemet eller équat. (6) eller (6''), är lätt bepröfvadt.

2:o)

Om α är $= 0$,

(således $x = \beta \sqrt{-1}$, β reel hvilkensomhelst),

så blifva éqvationerna (6'') dessa

$$(7') \dots \dots \dots \begin{cases} \frac{e^v + e^{-v}}{2} \text{Sin} u = 0, \\ \frac{e^v - e^{-v}}{2} \text{Cos} u = \beta; \end{cases}$$

af hvilka den förra kan utbytas mot $\text{Sin} u = 0$, eftersom den icke på annat sätt kan satisfieras af reela u och v . — Dermed är funnet, att värden af u uti $u + v \sqrt{-1}$ (om sådan finnes) *måste* vara någon af de i sednare membrum af

$$(11') \dots u = \text{Arcsin}((0)) = \text{Arcsin}((1)) \mp \frac{\pi}{2}$$

inses af (9), som utvisar att

$$(a) \dots \dots \frac{1}{\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}} = \frac{\alpha}{\gamma} - \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}},$$

således båda af samma tecken, hvilket tydligen icke kan vara *minus*, eftersom $\frac{\alpha}{\gamma}$ är positiv. —

innefattade *quantiteter*, och således

$$\cos u = \pm 1, \text{ allteftersom } u \text{ är af öfra eller nedra formen (11')};$$

följaktligen, enligt (7'),

$$e^v - e^{-v} = \pm 2\beta \text{ eller } e^v = \pm \beta + \sqrt{\beta^2 + 1},$$

$$(12') \dots v = l(\pm \beta + \sqrt{\beta^2 + 1}) = \pm l(\beta + \sqrt{\beta^2 + 1}). \text{ —}$$

Och således är nu funnet, att i detta fall hvarje *quantitet* z (om sådan finnes) *måste* vara inbegripen uti

$$(13') \dots z = \text{Arcsin}((1)) \pm \{ \sqrt{-1} \cdot l(\beta + \sqrt{\beta^2 + 1}) \cdot \frac{\pi}{2} \}. \text{ —}$$

Att ock verkligen *hvarje* *quantitet*, som innefattas i detta sednare *membrum*, satisfierar problemet, är lätt bepröfvadt. —

Och som *éqv.* (13) i *sjelfva* verket reducerar sig till (13'), då man uti den sätter $\alpha = 0$ (hvaraf $\gamma = 0$, $\frac{\alpha}{\gamma} = \sqrt{\beta^2 + 1}$); så äro vi nu berättigade att statuera denna (13) såsom innehållande vårt *problems solution*, åtminstone så *framt icke* β *ensam* är noll, d. ä. $x \text{ reel} = \alpha$ (*icke* noll). —

Hvad då slutligen beträffar den händelsen att

$$\beta \text{ ensam är } = 0,$$

(således $x \text{ reel} = \alpha$ *icke* noll),

så är *problemets solution*, för den händelsen att α är *numeriskt* ≤ 1 , redan känd af de här såsom bekanta antagna *elementerna* af *Trigonometrien*, nemligen

$$(13'') \dots z = \text{Arcsin}(\alpha) = \text{Arcsin}((1)) \pm (\text{Arcsin} \alpha - \frac{\pi}{2}).^{*)}$$

*) Mot uttrycket att *problemets solution*, för det fall att x är *reel* och *numeriskt* ≤ 1 , är känd af *elemen-*

Och som éqv. (13) i sjelfva verket reducerar sig till denna form, då man uti den sätter $\beta=0$ och supponerar α numer. ≤ 1 men icke noll [allenast

man, då α är numeriskt $=1$, med $\frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}$ (som

då antager formen $\frac{0}{0}$) förstår noll]*); så äro vi

berättigade att statuera éqv. (13) såsom innehållande vårt problems solution äfven för denna händelse, med förbehåll af nyssnämnda uttydelse af

märket $\frac{0}{0}$. --

terna och formeln här åfvan (13''), kan med skäl invändas, att man väl af elementerna vet att ingen annan reel quant. z finnes, som satisfierar problemet i detta fall d. ä. villkoret

$$\text{Sinz} = \alpha, (\alpha \text{ num. } \leq 1),$$

men icke derföre är förvissad, att ju möjligen derjemte någon eller några imaginära quantiteter kunna finnas som satisfiera detsamma. — För fullständighets skull må derföre nu bevisas, att v i detta fall måste vara $=0$. —

Vid ifrågavarande händelse reducera sig éqv. (6'') till (7''). Den sednare af dem kan endast satisfieras genom $\text{Cos} u = 0$ och genom $e^v - e^{-v} = 0$. —

Den förra positionen kan här icke komma i fråga: den ger neml. $\text{Sin} u = \pm 1$, som reducerar den förra (7'') till $e^v + e^{-v} = \pm 2\alpha$, d. ä. $e^v = \pm \alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 1}$ (alla imaginära). —

Återstår således endast den sednare möjligheten $e^v - e^{-v} = 0$, d. ä. $v = 0$. — H. S. B. —

*) För $\beta=0$ och α numer. ≤ 1 reducerar sig tydligen

$$\gamma \text{ till } \frac{\alpha}{\sqrt{\frac{1+\alpha^2}{2} + \sqrt{\left(\frac{1-\alpha^2}{2}\right)^2}}} = \alpha. --$$

Återstår den händelsen att $x=a$ är numeriskt >1 *).

Eqvationerna (6'') reducera sig till

$$(7'') \dots \dots \dots \begin{cases} \frac{e^v + e^{-v}}{2} \text{Sin} u = a, \\ \frac{e^v - e^{-v}}{2} \text{Cos} u = 0; \end{cases}$$

hvaraf genast inses, att $\text{Sin} u$ icke kan vara $=0$.

Den sednare kan endast satisfieras genom $\text{Cos} u = 0$ och genom $e^v - e^{-v} = 0$. Men som båda éqvationerna icke kunna satisfieras genom den sednare suppositionen (d. ä. $v=0$), i thy att den förra derigenom reduceras till $\text{Sin} u = a$ och något reelt u icke finnes hvars Sinus är numer. >1 ; så återstår endast den förra möjligheten $\text{Cos} u = 0$, således

$$\text{Sin} u = \pm 1;$$

hvaraf likväl endast den öfra kan komma i fråga, när a är positiv, och endast den nedra i motsatt fall, — såsom af den förra (7'') inses. —

*) I denna händelse reducerar sig (13) till formen

$$(b) \dots z = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ \text{Arcsin} \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \frac{0}{0}) \right\},$$

eftersom i detta fall

$$\gamma = \frac{\alpha}{\sqrt{\frac{1+\alpha^2}{2}} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2-1}{2}\right)^2}} \text{ är } = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} \cdot -$$

Huruvida och under hvilket vilkor denna (13) kan sägas innefatta problemets solution: äfven för denna sista händelse, skall den nu följande undersökningen utvisa. —

I förra fallet kunna således éqvationerna (7'') endast satisfieras af

$$\text{Sin} u = 1, u = \text{Arcsin}((1)),$$

$$e^v + e^{-v} = 2\alpha,$$

d. ä.

$$e^v = \alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 1}, v = \pm l(\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1});$$

och i det sednare endast af

$$\text{Sin} u = -1, u = \text{Arcsin}((-1)),$$

$$e^v + e^{-v} = -2\alpha,$$

d. ä.

$$e^v = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - 1}, v = \pm l(-\alpha + \sqrt{\alpha^2 - 1});$$

och således är nu funnet att, när α är numer. > 1 , hvarje qvant. z (om sådan finnes) måste vara inbegripen,

då α är positiv,

$$\text{uti } z = \text{Arcsin}((1)) \pm \sqrt{-1}.l(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}}),$$

då α är negativ,

$$\text{uti } z = \text{Arcsin}((-1)) \pm \sqrt{-1}.l(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}}),$$

eller i båda fallen uti

$$(13''') \dots z = \text{Arcsin}\left(\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}}\right)\right) \pm \sqrt{-1}.l(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}}). -$$

Att ock verkligen hvarje häruti innefattad qvantitet satisfierar problemet eller éqvationerna (7''), är lätt bepröfvadt. —

Och som éqv. (13) i sjelfva verket reducerar sig till (13'''), då man uti den sätter $\beta = 0$ och supponerar α numer. > 1 (hvaraf $\gamma = \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}}$) samt

med uttrycket $\frac{0}{0}$, hvartill $\frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}$ i detta fall

reducerar sig, förstår $\sqrt{\alpha^2 - 1}$ *); så äro vi nu berättigade att statuera denna *équation*

$$(13) \dots z = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ \text{Arcsin} \gamma - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}} \right) \right\}$$

såsom innefattande problemets solution för alla händelser, allenast man med $\frac{\beta}{\sqrt{1 - \gamma^2}}$, då det reducerar

sig till $\frac{0}{0}$ [hvilket inträffar, då $\beta = 0$ och α num. ≥ 1],

förstår $\sqrt{\alpha^2 - 1}$. —

2. I analogi med hvad i läran om reela kvantiteter är antaget **), skall det allmänna uttryck (13), som i sig innefattar alla de kvantiteter z som satisfiera nyss solverade problem eller

*) Såsom i sista noten visades, reducerar sig (13) härigenom till

$$(b') \dots z = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ \text{Arcsin} \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l \left(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}} \right) \right\}.$$

Att detta sednare membrum är detsamma med sednare membrum (13'''), då α är numer. > 1 och positiv, är påtagligt. — När α är negativ, gifver (13''')

$$\begin{aligned} z &= \text{Arcsin}((-1)) \pm \sqrt{-1} \cdot l \left(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}} \right) = \\ &= \text{Arcsin}((1)) \pm \pi \pm \sqrt{-1} \cdot l \left(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}} \right), \end{aligned}$$

och (b') blir

$$z = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ -\pi + \sqrt{-1} \cdot l \left(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}} \right) \right\}:$$

båda likabetydande, eftersom de tre uttrycken

$\text{Arcsin}((1)) + \pi$, $\text{Arcsin}((1)) - \pi$, $\text{Arcsin}((1)) \pm \pi$ äro alldeles likabetydande. —

**) Eqvat. (I) och (II) äro tydligen båda identiska för $\beta = 0$ och α numer. ≤ 1 . —

éqv. (6), kortligen betecknas med $\text{Arcsin}((x))$ eller $\text{Arcsin}((\alpha + \beta\sqrt{-1}))$: och den ibland dem, som motsvarar positionen $k=0$ i den allmänna

$$\text{Arcsin}((1)) = \frac{\pi}{2} \pm 2k\pi$$

och hvars tecken framför $\{ \}$ är *plus*, skall utmärkas med $\text{Arcsin}x$ eller $\text{Arcsin}(\alpha + \beta\sqrt{-1})$ och kallas "*Principal-valören af Arcsin((x))*". — Hvaraf följande

Theorem.

Hvilka reela valörer än α och β må hafva, är städse

$$(I) \dots \text{Arcsin}((\alpha + \beta\sqrt{-1})) = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ \text{Arcsin} \gamma - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right) \right\},$$

$$(II) \dots \text{Arcsin}(\alpha + \beta\sqrt{-1}) = \text{Arcsin} \gamma + \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right),$$

och således städse

$$(III) \dots \text{Arcsin}(x) = \text{Arcsin}((1)) \pm \left(\text{Arcsin} x - \frac{\pi}{2} \right), \quad *)$$

då med

$$(14) \dots \gamma \text{ menas } \frac{\alpha}{\sqrt{\frac{1+\alpha^2+\beta^2}{2}} + \sqrt{\left(\frac{1+\alpha^2+\beta^2}{2}\right)^2 - \alpha^2}};$$

allenast man med $\frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}$, då detta uttryck reduce-

rar sig till $\frac{0}{0}$ [hvilket inträffar, då $\beta=0$ och α numeriskt ≥ 1], förstår $\sqrt{\alpha^2-1}$. —

(Se Noten II).

Coroll.

*) Denna från läran om reela bågar välkända équation gäller således oförändrad för hvarje x -valör (reel eller imaginär). —

Corollarium.

Man har således, för hvarje reel β -värde,

$$(I') \dots \text{Arcsin}(\beta\sqrt{-1}) = \text{Arcsin}((1)) \pm \left\{ \frac{\pi}{2} - \sqrt{-1} \cdot l(\beta + \sqrt{\beta^2 + 1}) \right\},$$

$$(II') \dots \text{Arcsin} \beta\sqrt{-1} = \sqrt{-1} \cdot l(\beta + \sqrt{\beta^2 + 1});$$

och, då α är numeriskt > 1 ,

$$(I'') \dots \text{Arcsin}(\alpha) = \text{Arcsin}((1)) \pm \text{Arcsin}\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}}\right) - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\alpha^2 - 1}) = \\ = \text{Arcsin}\left(\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}}\right)\right) \pm \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\alpha^2 - 1}),$$

$$(II'') \dots \text{Arcsin} \alpha = \text{Arcsin} \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} + \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\alpha^2 - 1}). -$$

§. 3.

Om betydelsen af tecknet $\text{Arccos } x$ *)

för hvarje värde af x .

Problemet "att finna alla de quantiteter z , som satisfiera villkoret

$$(15) \dots \text{Cos } z = \alpha + \beta\sqrt{-1} = x", (\alpha \text{ och } \beta \text{ reela}),$$

är påtagligen [enligt éqv. (4)] ordagrant det samma som problemet "att finna alla de quant. z som satisfiera villkoret

$$\text{Sin}\left(\frac{\pi}{2} - z\right) = \alpha + \beta\sqrt{-1} = x",$$

*) Man erinre sig, att när x är reel och numeriskt ≤ 1 , enligt hvad i det föregående af Analysen är statueradt, med tecknet $\text{Arccos}((x))$ menas

$$\pm \text{Arccos } x \pm 2k\pi = \text{Arccos}((1)) \pm \text{Arccos } x,$$

der "Arccos x " är begränsad af 0 och π . —

och dess solution således gifven af (I) i föregående theorem, d. ä. af

$$(16) \dots z = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}((1)) \mp \left\{ \text{Arcsiny} - \frac{\pi}{2} + \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right) \right\} = \\ = \text{Arccos}((1)) \pm \left\{ \text{Arccosy} - \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right) \right\}, -$$

der med γ menas qvant. (14) och för öfrigt om

$\frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}$ gäller samma som i föreg. theorem.

I analogi med hvad i läran om reela qvantiteter är antaget *), skall det allmänna uttryck (16), som i sig innefattar alla de qvant:er z som satisfiera förevarande problem eller éqv. (15), kortligen betecknas med $\text{Arccos}((\alpha + \beta\sqrt{-1}))$ eller $\text{Arccos}((x))$: och den ibland dem, som motsvarar positionen $k=0$ i den allmänna

$$\text{Arccos}((1)) = \pm 2k\pi,$$

och hvars tecken framför $\{ \}$ är *plus*, skall utmärkas med $\text{Arccos}(\alpha + \beta\sqrt{-1})$ eller $\text{Arccos}x$ och kallas "*Principal-valören af Arccos((x))*". — Hvaraf följande

Theorem.

Hvilka reela valörer än α och β må hafva, är städse

$$(I) \dots \text{Arccos}((x)) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}((x)) = \\ = \text{Arccos}((1)) \pm \left\{ \text{Arccosy} - \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right) \right\},$$

$$(II) \dots \text{Arccos}x = \text{Arccosy} - \sqrt{-1} \cdot l \left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}} \right) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}x,$$

*) Equationerna (I) och (II) i efterföljande theorem äro tydligen båda identiska för $\beta=0$ och α numer. ≤ 1 . —

och således städse

$$(III) \dots \text{Arccos}((x)) = \text{Arccos}((1)) \pm \text{Arccos } x,$$

då med γ menas kvantiteten (14) och för öfrigt om $\frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}$ gäller samma som i det föregående Theoremet.

Corollarium.

Man har således, för hvarje reel β -värde,

$$(I') \dots \text{Arccos}((\beta\sqrt{-1})) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}((\beta\sqrt{-1})) = \\ = \text{Arccos}((1)) \pm \left\{ \frac{\pi}{2} - \sqrt{-1} \cdot l(\beta + \sqrt{\beta^2 + 1}) \right\},$$

$$(II') \dots \text{Arccos}(\beta\sqrt{-1}) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}(\beta\sqrt{-1}) = \frac{\pi}{2} - \sqrt{-1} \cdot l(\beta + \sqrt{\beta^2 + 1});$$

och, då α är numeriskt > 1 ,

$$(I'') \dots \text{Arccos}((\alpha)) = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin}((\alpha)) = \\ = \text{Arccos}((1)) \pm \left\{ \text{Arccos} \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} - \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\alpha^2 - 1}) \right\} = \\ = \text{Arccos} \left(\left(\frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} \right) \right) \pm \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\alpha^2 - 1}),$$

$$(II'') \dots \text{Arccos} \alpha = \frac{\pi}{2} - \text{Arcsin} \alpha = \text{Arccos} \frac{\alpha}{\sqrt{\alpha^2}} - \sqrt{-1} \cdot l(\sqrt{\alpha^2} + \sqrt{\alpha^2 - 1}). -$$

Noter.

Not. I.

(Sid. 91).

Häraf inses att $(\beta\sqrt{-1})^\mu$, der detta uttryck möter, kan efter behag uttydas med "*Principal-potensen af den isolerade qvant. $\beta\sqrt{-1}$* " eller "*den limes, mot hvilken $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ vid indefinit aftagande positiva α -värörer tenderar,*" men att det ingalunda (för hvarje μ) utmärker den limes, mot hvilken $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ med negativt α tenderar vid indefinit aftagande nummervälörer af α , åtminstone då β är negativ: denna sistnämnda limes är (såsom nyss förut i anmärkn. sid. 90 erinrades)

$$(a) \dots\dots (V\beta^2)^\mu \left(\cos \frac{3\mu\pi}{2} + V^{-1} \sin \frac{3\mu\pi}{2} \right),$$

då deremot $(\beta\sqrt{-1})^\mu$ för negativt β antogs för att kortligen utmärka qvantiteten

$$(b) \dots\dots (V\beta^2)^\mu \left(\cos \frac{\mu\pi}{2} - V^{-1} \sin \frac{\mu\pi}{2} \right),$$

som är olika med den förra, så framt icke μ är af helt tals numerisk välör eller noll. —

Om man således i Analysen upptager tecknet x^μ äfven för x med negativ reel del, för att utmärka qvantiteten

$$(-\rho)^\mu (\cos \mu\tau + V^{-1} \sin \mu\tau),$$

(såsom på sid. 89 skedde); så måste man med uttrycket "*Equationen*

$$(c) \dots\dots (\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu = (-\rho)^\mu (\cos \mu\tau + V^{-1} \sin \mu\tau)$$

gäller städse för negativt α " förstå endast det man säger ("*negativt α* "). — Ville man deremot nödvändigt, att det man statuerade om $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ med negativt α också skulle gälla i den limes noll, mot hvilken det negativa α vid indefinit aftag. nummervälörer tenderar: eller (tydligare taladt) om man icke ville i Analysen upptaga tecknet $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ för negativt α , med mindre än att den med detta tecken utmärkta qvantitet tenderade vid indefinit af-

tagande nummervärder af α mot samma limes som en med $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ för positivt α utmärkt quantitet; så skulle man verkligen vara nödsakad att med CAUCHY *) afstå från tecknets x^μ upptagande för negativt α , åtminstone om man med x^μ ville utmärka någon ibland de i uttrycket

$$(d) \dots\dots ((x))^\mu = \varrho^\mu (\cos \mu \vartheta + \sqrt{-1} \sin \mu \vartheta) ((1))^\mu$$

innefattade quantiteter, hvilka alla äro af formen

$$(e) \dots\dots\dots \varrho^\mu (\cos \mu \vartheta + \sqrt{-1} \sin \mu \vartheta),$$

der ϑ betecknar någon ibland de reela bågar, hvilkas Cos. och Sin. satisfiera villkoret

$$(f) \dots\dots \varrho (\cos \vartheta + \sqrt{-1} \sin \vartheta) = \alpha + \beta \sqrt{-1} \quad **). \quad -$$

*) CAUCHY's raisonnement i detta afseende (*Exercises de Mathém. T. I, pag. 2*) kan exprimeras sålunda:

Vi hafva antagit tecknet x^μ för att kort utmärka den ibland quantiteterna

$$((x))^\mu = \varrho^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau) ((1))^\mu, \quad (x \text{ med positiv reel del}),$$

hvilken motsvarar positionen $k=0$ i den allmänna $((1))^\mu$, således

$$x^\mu = \varrho^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau).$$

Skulle man nu tillåta sig att, äfven då reela delen af x är negativ, med tecknet x^μ utmärka den ibland quantiteterna

$$((x))^\mu \text{ d. ä. i detta fall } \varrho^\mu (\cos \mu (\pi + \tau) + \sqrt{-1} \sin \mu (\pi + \tau)) ((1))^\mu,$$

hvilken motsvarar positionen $k=0$ i $((1))^\mu$, således

$$x^\mu = \varrho^\mu (\cos \mu \tau + \sqrt{-1} \sin \mu \tau) (\cos \mu \pi + \sqrt{-1} \sin \mu \pi);$$

så, "eftersom följaktligen båda dessa skulle gälla för x med reel del $=0$ och negativ coefficient för $\sqrt{-1}$," skulle t. ex. $(-\sqrt{-1})^\mu$ betyda

$$\text{så väl } \cos \frac{\mu \pi}{2} - \sqrt{-1} \sin \frac{\mu \pi}{2}$$

$$\text{som } \left(\cos \frac{\mu \pi}{2} + \sqrt{-1} \sin \frac{\mu \pi}{2} \right) (\cos \mu \pi + \sqrt{-1} \sin \mu \pi);$$

hvilket uppenbarligen skulle medföra "un grave inconvenient."

Man kan icke neka, att detta "eftersom följaktligen båda - - - - för $\sqrt{-1}$ " är ett särdeles svagt skäl för att helt och hållet beröfva Analysen tecknats x^μ begagnande för x med negativ reel del. —

**) Att man blir nödsakad dertill, om man till ϑ antager τ och

Men då man i Analysens nuvarande stränga tider alldeles icke genom uttrycket "Tecknet $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ har för negativt α den eller den betydelsen" behöfver anse

$\tau + \pi$, allteftersom α är positiv eller negativ, är visadt. — Men måhända torde några andra båggar ϑ' och ϑ'' eller (tydligare) $\vartheta'(\alpha, \beta)$ och $\vartheta''(\alpha, \beta)$, sådana att

$(\alpha) \dots \left\{ \begin{array}{l} \varrho[\cos \vartheta'(\alpha, \beta) + \sqrt{-1} \sin \vartheta'(\alpha, \beta)] \text{ är } = \alpha + \beta\sqrt{-1} \text{ för pos. } \alpha \\ \text{och} \\ \varrho[\cos \vartheta''(\alpha, \beta) + \sqrt{-1} \sin \vartheta''(\alpha, \beta)] \text{ är } = \alpha + \beta\sqrt{-1} \text{ för neg. } \alpha, \end{array} \right.$
finnas, som kunna göra éqvationerna

$$(\beta) \dots \left\{ \begin{array}{l} (\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu = \varrho^\mu (\cos \mu \vartheta' + \sqrt{-1} \sin \mu \vartheta') \\ (\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu = \varrho^\mu (\cos \mu \vartheta'' + \sqrt{-1} \sin \mu \vartheta'') \end{array} \right.$$

gällande för hvarje reelt och rationelt μ , den förra för positivt α och den sednare för negativt α , och tillika *båda* för $\alpha = 0$ d. ä.

$$(\gamma) \dots \left\{ \begin{array}{l} (\beta\sqrt{-1})^\mu = (\sqrt{\beta^2})^\mu [\cos \mu \vartheta'(0, \beta) + \sqrt{-1} \sin \mu \vartheta'(0, \beta)] = \\ = (\sqrt{\beta^2})^\mu [\cos \mu \vartheta''(0, \beta) + \sqrt{-1} \sin \mu \vartheta''(0, \beta)]? \end{array} \right.$$

Om några sådana ϑ' och ϑ'' finnas, så måste de enligt (γ) vara så beskaffade, att icke blott

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \vartheta'(0, \beta) = \cos \vartheta''(0, \beta), \\ \sin \vartheta'(0, \beta) = \sin \vartheta''(0, \beta), \end{array} \right.$$

utan ock för hvarje reelt och rationelt μ

$$\left\{ \begin{array}{l} \cos \mu \vartheta'(0, \beta) = \cos \mu \vartheta''(0, \beta), \\ \sin \mu \vartheta'(0, \beta) = \sin \mu \vartheta''(0, \beta), \end{array} \right.$$

sålendes att

$$\left. \begin{array}{l} \text{så väl } \vartheta'(0, \beta) - \vartheta''(0, \beta) \\ \text{som ock } \mu[\vartheta'(0, \beta) - \vartheta''(0, \beta)] \end{array} \right\} \text{ äro af någondera formen } \pm 2k\pi, \\ (k \text{ helt tal, } 0 \text{ inclus.});$$

hvilket uppenbarligen är omöjligt under annat vilkor, än att de båda $\vartheta'(\alpha, \beta)$ och $\vartheta''(\alpha, \beta)$ äro sådana att de för $\alpha = 0$ reducera sig till absolut likhet

$$(\delta) \dots \dots \dots \vartheta'(0, \beta) = \vartheta''(0, \beta). \text{ —}$$

Men nu är uppenbart, att de enda båggar $\vartheta'(\alpha, \beta)$ och $\vartheta''(\alpha, \beta)$, som kunna satisfiera éqvationerna (α) , äro innefattade i

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau \pm 2k\pi \text{ för positivt } \alpha \text{ eller noll,} \\ \text{och} \\ \tau + \pi \pm 2k\pi \text{ för negativt } \alpha \text{ eller noll.} \end{array} \right.$$

sig förpligtad att svara för giltigheten af samma betydelse äfven i limes $\alpha=0$; så är uppenbart, att någon

Är nu k' den sannskyldiga k -värdet för det förra fallet, k'' för det sednare, så att

$$\begin{cases} \text{vårt } \vartheta'(\alpha, \beta) \text{ är antingen } \tau + 2k'\pi \text{ eller } \tau - 2k'\pi, \\ \text{vårt } \vartheta''(\alpha, \beta) \dots\dots\dots \tau + (2k'' + 1)\pi \text{ eller } \tau - (2k'' - 1)\pi; \end{cases}$$

så måste

$$\begin{cases} \vartheta'(0, \beta) \text{ vara antingen } \pm \frac{\pi}{2} + 2k'\pi & \text{eller } \pm \frac{\pi}{2} - 2k'\pi, \\ \vartheta''(0, \beta) \dots\dots\dots \pm \frac{\pi}{2} + (2k'' + 1)\pi & \text{eller } \pm \frac{\pi}{2} - (2k'' - 1)\pi, \end{cases}$$

neml. öfra tecknet för positivt β , det nedra för negativt β , och således enligt (d) nödvändigt

$$\begin{cases} k'' \text{ vara} = k', \text{ då } \beta \text{ är positivt,} \\ \text{men antingen} = k' + 1 \text{ eller } \pm(k' - 1), \text{ då } \beta \text{ är negativt,} \end{cases}$$

nemligen

då β är positivt:

$$\text{antingen } \begin{cases} \vartheta'(\alpha, \beta) = \tau + 2k'\pi \\ \vartheta''(\alpha, \beta) = \tau + (2k' + 1)\pi \end{cases} \text{ eller } \begin{cases} \vartheta'(\alpha, \beta) = \tau - 2k'\pi \\ \vartheta''(\alpha, \beta) = \tau - (2k' - 1)\pi \end{cases},$$

då β är negativt:

$$\text{antingen } \begin{cases} \vartheta'(\alpha, \beta) = \tau + 2k'\pi \\ \vartheta''(\alpha, \beta) = \tau + (2k' - 1)\pi \end{cases} \text{ eller } \begin{cases} \vartheta'(\alpha, \beta) = \tau - 2k'\pi \\ \vartheta''(\alpha, \beta) = \tau - (2k' + 1)\pi \end{cases}.$$

Dessa äro således de enda ϑ' - och ϑ'' -värder, som kunna göra $\text{éqv.}(\beta)$ giltiga, den förra för positivt α , den sednare för negativt α och båda för $\alpha=0$. Man kan således

$$(\beta') \begin{cases} \text{då } \alpha \text{ är pos. till } (\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu \text{ antaga} \\ \varrho^\mu \{ \cos \mu(\tau + 2k'\pi) + \sqrt{-1} \sin \mu(\tau + 2k'\pi) \}, \\ \text{då } \alpha \text{ är neg. } \varrho^\mu \{ \cos \mu[\tau + (2k' + 1)\pi] + \sqrt{-1} \sin \mu[\tau + (2k' + 1)\pi] \} \\ \text{allteftersom } \beta \text{ är pos. eller neg.} \end{cases}$$

eller ock

$$(\beta'') \begin{cases} \text{då } \alpha \text{ är pos. till } (\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu \text{ antaga} \\ \varrho^\mu \{ \cos \mu(\tau - 2k'\pi) + \sqrt{-1} \sin \mu(\tau - 2k'\pi) \}, \\ \text{då } \alpha \text{ är neg. } \varrho^\mu \{ \cos \mu[\tau - (2k' + 1)\pi] + \sqrt{-1} \sin \mu[\tau - (2k' + 1)\pi] \} \\ \text{allteftersom } \beta \text{ är pos. eller neg.} \end{cases}$$

för att den med $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ för positivt α betecknade kvantiteten må vid indefinit afstagande nummervärder af α conver-

farå för missförstånd i anledning af tecknets x^μ för negativt α upptagande för det ändamål, hvartill vi bestämt detsamma, icke är att frukta; men fördelarne deraf äro lika oberäknliga som vådan af detsammans utdömmning utan fullgiltig orsak. —

gera mot samma limes som den med $(\alpha + \beta\sqrt{-1})^\mu$ för negativt α betecknade, — och det ehvad helt tals valör (0 inclus.) man än för k' må antaga (såsom lätt är att pröfva) —; men också står detta ändamål icke att vinna genom några andra \mathfrak{D}' - och \mathfrak{D}'' -valörer. — (Antoge man till k' noll, så skulle (β') och (β'') reducera sig till ett oah samma uttryck). —

Ickedestomindre måste vi vidblifva det påstående, som åfvanföre i texten yttrades, att man nemligen är nödsakad med CAUCHY afstå från tecknets x^μ för negativt α upptagande i Analysen, så vida man till vilkor för detta upptagande gör den fordran, att den med x^μ för negativt α betecknade qvant. skall vid indefinit aftagande nummervalörer af α tendera mot samma limes, som den med x^μ för positivt α betecknade. — Ty vare sig att man antager (β') eller (β'') — de enda möjligheter, hvarigenom sistnämnda ändamål kan vinnas —; så stöter man på en annan ganska betänklig olägenhet, att neml. den med x^μ för positivt α betecknade qvant. tenderar vid indefinit aftagande nummervalörer af β mot tvänne särskilda limites, allteftersom denna β 's convergering mot 0 sker ifrån positiva eller negativa hållet; så att nemligen (då A bet. ett Tal), om förslaget (β') antoges,

$(-A)^\mu$ skulle bet. $A^\mu(\cos 2k'\mu\pi + \sqrt{-1}\sin 2k'\mu\pi)(\cos \mu\pi + \sqrt{-1}\sin \mu\pi)$ allteftersom $(-A)^\mu$ för tillfället utmärkte den limes, mot hvilken $(-A + \beta\sqrt{-1})^\mu$ hade tenderat vid indefinit aftagande nummerval. af positivt eller negativt β ; och, om förslaget (β'') antoges, en likadan olägenhet. —

Som nu uppenbarligen denna olägenhet är vida betänkligare än den åfvan omtalade, som skulle blifva en följd af antagningen

$$x^\mu = (\pm \varrho)^\mu (\cos \mu\pi + \sqrt{-1}\sin \mu\pi) \text{ allteftersom } \alpha \text{ är } \begin{matrix} \text{ickenegativ eller negativ;} \\ \text{negativ} \end{matrix}$$

så hafva vi föredragit denna sista antagning framför (β') eller (β'') , förmenande oss för öfrigt (såsom nämndes) på intet sätt hvarken nödsakade eller berättigade att på grund af den antyddas, så kallade, olägenheten utesluta ur Analysen tecknet x^μ för negativt α . —

Not. II.

(Sid. 144).

Man inser efter detta, att icke det ringaste skäl förefinnes för tecknets $\text{Arcsin} x$ bannlysning för det fall, att x är reel och numeriskt > 1 . — För att emedlertid komma orsaken till CAUCHY's interdict i detta afseende *) på spår, kan följande göra tillfyllest.

Betecknar man med $\text{Arcsin}((x))$ det allmänna uttryck, som i sig innefattar alla de quantiteter, hvilkas Sinus är x ; så — om man med u betecknar detta uttrycks reela del och med v coefficienten för $\sqrt{-1}$ deruti — anser CAUCHY **) sig hafva funnit, att "för hvarje $x(=\alpha + \beta\sqrt{-1})$ "

$$(100) ***) \dots u = \text{Arcsin}((1)) \pm \left(\vartheta - \frac{\pi}{2}\right),$$

neml.

$$(99) \dots \vartheta \text{ bet. } \text{Arcsin} \frac{\alpha}{\sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2}} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2}\right)^2 - \alpha^2}},$$

och

$$(104) \dots v = \pm \Omega, \text{ allteftersom öfra eller nedra tecknet begagnas i (100),}$$

neml.

$$(105) \dots \Omega \text{ betyder } i \left(\frac{\alpha}{\sin \vartheta} + \frac{\beta}{\cos \vartheta} \right);$$

och således

$$(106) \dots \text{Arcsin}((x)) = \text{Arcsin}((1)) \pm \left(\vartheta + \Omega \sqrt{-1} - \frac{\pi}{2}\right). -$$

*) Se *Inledn.* sid. 75 och 76. —**) *Lec. du Calc. Différ. Lec. XI.* —***) För tydlighets skull bibehålla vi här CAUCHY's egen numrering af sina *équationer*. —

Han öfvergår derefter till att söka *quantitetens* Ω uttryck i α och β . — "Emedan," säger han, " $\text{Cos}\varphi$ måste vara positiv och man således har

$$(110) \dots \begin{cases} \text{Sin}\varphi = \frac{\alpha}{\sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2}\right)^2 - \alpha^2}}}, \\ \text{Cos}\varphi = \frac{\sqrt{\beta^2}}{\sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2 - 1}{2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2}\right)^2 - \alpha^2}}}; \end{cases}$$

"så finnes af (105), att

$$(112) \dots \Omega = \pm l \left\{ \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2}\right)^2 - \alpha^2}} + \sqrt{\frac{\alpha^2 + \beta^2 - 1}{2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 + \beta^2 + 1}{2}\right)^2 - \alpha^2}} \right\},$$

"allteftersom β är positiv eller negativ." —

Än — om β är noll då? (alltså x reel $= \alpha$). — Här begår nu CAUCHY den oförsigtigheten att obetingadt taga för afgjordt, att *équationens* (112) sednare membri *båda* valörer, sådana de blifva för $\beta=0$, skola vara rätta valörer af Ω för $\beta=0$ [eftersom de gälla den ena för hvarje positivt β , den andra för hvarje negativt β]. Han sätter derföre $\beta=0$ i (112) och statuerar, att de *båda* resultaten

$$(113) \dots \Omega = \pm l \left\{ \sqrt{\frac{\alpha^2 + 1}{2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 - 1}{2}\right)^2}} + \sqrt{\frac{\alpha^2 - 1}{2} + \sqrt{\left(\frac{\alpha^2 - 1}{2}\right)^2}} \right\},$$

d. ä. $= 0$ för α numer. ≤ 1 ,

och

$$(115) \dots = \pm l \sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}} \text{ för } \alpha \text{ numer. } > 1,$$

gälla i den händelsen att β är $= 0$. —

*Det är just denna oförsigtighet, som vållat CAUCHY's fördom mot tecknet $\text{Arcsin } x$ för den händelsen att β är $= 0$ och α numer. > 1 . — Ty sedan han definierat detta tecken med "den *quantitet*, som erhålles ur sednare mem-*

"brum (106), då man der i stället för \pm framför trinömen
"sätter + och antager $k=0$ uti

$$\text{Arcsin}((1)) = \frac{\pi}{2} \pm 2k\pi,$$

"hvadan éqvationen

$$(107) \dots\dots \text{Arcsin} x = \mathfrak{P} + \mathfrak{Q}\sqrt{-1};"$$

så följer interdictet: "Emedan, för den händelsen att $\beta = 0$
"och α num. > 1 , \mathfrak{Q} har två särskilda valörer (115), och
"således sednare membrum i (107) tillägger tecknet $\text{Arcsin} x$
"två hvarannan motsägende betydelse; så bör man för
"detta fall afstå från begagnandet af tecknet $\text{Arcsin} x$." —

Går man tillåtliga vägar, så finner man att éqv. (106)
är riktig för alla möjliga valörer af α och β , om man
med \mathfrak{P} deruti förstår (99) och med \mathfrak{Q} en quantitet, som
kan sättas under formen (112), så vida icke $\beta = 0$ och
på samma gång α numer. > 1 , i hvilket fall den reducerar sig icke till (115), utan till

$$+ l(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}})^*);$$

och dermed förfaller CAUCHY's skäl för tecknets $\text{Arcsin} x$
utdömande för detta fall. —

Man kan tillägga, att första orsaken till ifråga-
varande misstag ligger i den omständigheten, att CAUCHY
tillåtit sig att statuera éqv. (106) giltig för alla händelser,
utan att om betydelsen af \mathfrak{Q} deruti uppgifva annat än

*) Theoremet på sid. 144 utvisar ju, att éqv. (106) är riktig i
alla händelser, om man med \mathfrak{Q} förstår $l\left(\frac{\alpha}{\gamma} + \frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}\right)$ och

deruti med $\frac{\beta}{\sqrt{1-\gamma^2}}$, då denna reducerar sig till $\frac{0}{0}$, förstår

$\sqrt{\alpha^2 - 1}$. — Denna \mathfrak{Q} -valör reducerar sig — såsom lätt är
att pröfva — just till (112), då β icke är $= 0$; vidare [lika-
som (112)] till noll, då β är $= 0$ och α numer. ≤ 1 ; men till

$l(\sqrt{\alpha^2 + \sqrt{\alpha^2 - 1}})$, då $\beta = 0$ och α numer. > 1 . —

det för $\beta=0$ särdeles vanskliga uttrycket $l\left(\frac{\alpha}{\sin\varphi} + \frac{\beta}{\cos\varphi}\right)$.

För $\beta=0$ reducerar sig ju $\cos\varphi$ till $\frac{0}{0}$, då α är numer. ≤ 1 ,
och till 0 då α är num. > 1 . —

Och till detta förleddes CAUCHY deraf, att han i
sjelfva ingressen af sitt raisonnement, utan alla förbehåll,
utbytte

$$\text{équationerna } \left\{ \begin{array}{l} \frac{e^v + e^{-v}}{2} \sin u = \alpha \\ \frac{e^v - e^{-v}}{2} \cos u = \beta \end{array} \right\} \text{ mot } \left\{ \begin{array}{l} e^v = \frac{\alpha}{\sin u} + \frac{\beta}{\cos u} \\ e^{-v} = \frac{\alpha}{\sin u} - \frac{\beta}{\cos u} \end{array} \right\}. —$$

Angående Svenska Tabellverket, och
om Folkmängden m. m. i Riket
under de lifån 1815 sist-
förflutne 35 åren;

af

JOHN AD. LEYONMARCK.

Till Akademien inlemnad den 8 Oktober 1845.

Det Svenska Tabellverket, som nu snart uppbunnit en tid af 100 år, har egentligen Kongl. Vetenskaps-Akademien att tacka för sin upprinnelse, emedan det var denna Kongl. Akademi, som, vid 1747 års riksdag, — med öfverlemnande af, dels åtskillige af dess så förtjenstfulle Sekreterare WARGENTIN i anledning af Landshöfdingarnes afgifne uppgifter om folkmängden i Riket sammandragne tabeller, och dels ett af honom upprättadt förslag till formulär för nativitetens och mortalitetens årliga antecknande af Rikets Presterskap, — hos Rikets då församlade Ständers Secreta-Utskott anmälde nytan och nödvändigheten af ett ordentligt tabellverks inrättande i Riket. Denna Kongl. Akademiens åtgärd hade till påföljd, att Secreta-Utskottet, med förklarande af sin fägnad häröfver, afvensom öfver all den nytta i öfrigt, som genom Kongl. Akademiens inrättning för Riket var åstadkommen, i skrifvelse daterad den 12 December 1747 hos Kongl. Maj:t i underdånighet hemställde, att ej allenast af öfvannämde af

Herr WARGENTIN sammanfattade formulär för anteckning af årliga nativiteten och mortaliteten, utan ock af ett inom samma Utskott utarbetadt formulär för uppgift å Rikets samtliga invånare till ålder, kön och stånd m. m., upplagor på Kongl. Maj:ts och Kronans bekostnad måtte tryckas, för att utdelas, de förra till alla kyrkor i Riket, och de sednare till vederbörande Verk och Autoriteter, så att verkställigheten genast med påföljande året måtte kunna taga sin begynnelse. Med nådigt bifall härtill, täcktes Kongl. Maj:t derefter, genom nådigt bref af den 3 Februari 1748, anbefalla Kongl. Stats-Contoret, att om verkställigheten af hvad då i början på det samma ankom, draga all skyndsam försorg, så att det åsyftade ändamålet ju förr dess hellre måtte kunna vinnas.

Det var emedlertid först med året 1749, som det Svenska Tabellverket tog sin begynnelse; och de för samma år i Consistorierna författade sammandrag af till dem inkomne tabeller utgöra början af den samling af handlingar, som nu hos Kongl. Tabell-Commissionen förvaras.

Utaf en i Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar för år 1769 införd, af Kongl. Commissionens ledamot och först utsedde Sekreterare, ofvanbemälte Herr WARGENTIN, författad afhandling om Stockholms stads tillväxt i folkrikhet från år 1721 till 1766, inhämtas väl emedlertid, att redan på 1730-talet, tabeller öfver årligen födde och döde från de flesta Consistorierna ill dåvarande Kongl. Canzli-Collegii Inrikes Civil-Expedition hade blifvit afgifne, men att någon nöjaktig upplysning i de omständigheter, som rörde befolkningen, af dem icke kunde vinnas, emedan uppgifterna befunnits inrättade efter god-

tycke, och icke efter något visst formulär, hvar-
dan ock Consistorierne, såsom det vill synas,
torde hafva fått tillåtelse att dermed tills vidare
upphöra.

Efter Tabellverkets sålunda först med året
1749 inträffade ordentliga inrättning, finnes Kongl.
Maj:t genom bref till Kongl. Commissionen, da-
teradt den 13 Juli 1762, i nåder hafva för-
ordnat, att, som många för allmänheten intres-
santa och tjenliga upplysningar utur Tabellver-
ket kunde hämtas, så borde Commissionen till
Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar vid
hvarje års slut till införande afgifva hvad, som
till detta ändamål bäst kunde passa sig. Ehu-
ruväl samma Handlingar tid efter annan finnas
vara riktade med flere intressante afhandlingar,
dels om folkmängden, och dels om nativiteten
och mortaliteten såväl i hela Riket, som flere
dess delar särskilt, till Kongl. Akademien in-
gifne, ej allenast af Herr WARGENTIN och dess
2:ne efterträdare i Tabell-Sekreterare-tjensten Her-
rarne RUTHBERG och NICANDER, utan ock från flere
af tabellförfattande personer i landsorterna, saknas
dock i Kongl. Akademiens Handlingar ordentliga
uppgifter från de förra om förhållandet för hvar-
je år, såsom af nyss högstberörde nådiga Förord-
nande skulle synas hafva bordt vara en följd;
men, såsom troligast är, hafva de tabellariska
årssammandragen, som af dessa embetsmän under
tiden blifvit upprättade, befunnits dels för vid-
lyftiga, och dels i afseende på siffertrycket allt
för kostsamma, att i Handlingarne fullständigt
kunna inrymmas. Möjligen torde ock, efter den
tidens tänkesätt, hemlighet i flere hithörande de-
lar ansetts vara af nödvändighet, hvarpå exem-
pel icke eller saknas. Ett ytterligare samt huf-

vudsakligt hinder derföre, omkring 1790-talet, torde ock kunna igenfinnas i den mindre tillförlitlighet i de dels ifrån Consistorierna och dels från Landshöfdinge-Embeten insände tabell-sammandragen, som småningom till den grad upptäcktes, att hela församlingar ur en och annan funnos uteslutne, hvilka betydliga fel icke förr än i början af 1800-talet på nöjaktigt sätt hafva blifvit afhjelpne, hvaruti den 3:de Sekreterarens Herr Canzli-Rådet NICANDERS använda nit i märkbar mån bidrog, och hvarom en af honom angående Tabellverkets tillstånd från 1775 till 1795 ingifven, med alla sina bilagor successivt i Kongl. Akademiens Handlingar för åren 1799, 1800 och 1801 införd, samt sedermera äfven särskilt af trycket utgifven afhandling lemnar en närmare upplysning. Efter sistnämde tid har Herr NICANDER afgifvit 3 fullständiga berättelser för qvinqvennii-perioderna 1800, 1805 och 1810, hvilka alla Kongl. Akademien i sina Handlingar äfvenledes in extenso låtit införa.

Då undertecknad med året 1815 emottog Sekreterare-tjensten vid Tabellverket, undföll högstberörde nådiga stadgande om årliga uppgifter till Kongl. Akademien ingalunda hans kännedom och uppmärksamhet; men för hans uraktlåtenhet att samma stadgande fullgöra, torde följande omständigheter befinnas vara för honom gällande ursäakter:

1:o den tid han behöft, för att sjelf i detta för honom vid tjenstens tillträde alldeles främmande arbete sig inöfva, samt att, efter fullbordandet af dess första qvinqvennii-tabell-arbete för åren 1811 med 1815 och dess jemförelse med det af företrädaren för åren 1806 med 1810 afgifne, så många och så väsendtliga skilj-

aktigheter förefunnos, att ettdera af dessa båda arbeten måste antagas för osannolikt; och det var först efter en längre tid, som, genom särskilt anställda jemförelser, den upptäckten gjordes, att 1810 års sammandragne Qvinqvenzii-Tabellverk, genom från hvarjehanda af krigsoroligheterna år 1809 sig härledande orsaker, i högsta måtto blifvit opålitligt, då derunder från Fält-Consistorierna ordentliga uppgifter hade uteblifvit, samt att ett större antal till Pommern bort-kommenderadt manskap icke allenast år 1810, utan ock redan år 1803 var uteslutet, som sedermera år 1815 i tabellerna återfanns, och var det först vid afslutningen af 1820 års Qvinqvennii-Tabellverk, som öfvertygelsen vanns om 1815 års tabellers större pålitlighet emot dem för 1810, på sätt Kongl. Commissionens under den 9 November 1822 till Kongl. Maj:ts afgifne underdåniga berättelse närmare upplyser; och

2:o att, efter det den af Kongl. Commissionen under den 23 Januari 1818 afgifne qvinqvennii-berättelsen för åren 1811 med 1815, i följd af Rikets Ständers beslut, på Stats-Utskottets föranstaltande blifvit i hela sin vidd, — sjelfva tabellerna dock undantagne, — till trycket befordrad, hafva på Kongl. Maj:ts derom gifne nådiga befallningar, ej allenast alla de sedermera afgifne Qvinqvennale Berättelserne, och nu för tredje gången sjelfva de dertill hörande tabellerna, i hela deras vidd, på lika sätt kommit till allmänhetens kännedom, utan ock de genom Kongl. Brevfet den 25 Maj 1824 äfven emellan qvinqvennii-perioderna anbefalldes årsberättelserna, dels genom i allmänna tidningarne införda utdrag, och dels dem in extenso bifogade, blifvit offentliggjorda. Sålunda, och utom förstnämde 1815 års genom Stats-Ut-

skottets försorg tryckta qvinquennii-berättelse, samt en sedermera af Läkare-Sällskapet utrekvirerad och på dess enskilda bekostnad tryckt tabell öfver nativiteten och mortaliteten m. m. i Riket åren 1816, 1817 och 1818, har

Qvinquennii-berättelsen för åren 1816 med 1820, daterad den 9 November 1822, blifvit ibland Rikets Ständer utdeld, och de öfrige exemplaren af den tryckta upplagan mot lindrig betalning hållits allmänheten tillhanda;

Innehållet af årsberättelsen för åren 1821 och 1822 blifvit infördt i Post- och Inrikes-Tidningen år 1824 N:o 153;

Ett Transumt af 1823 års berättelse likaså intaget i samma tidning år 1825 N:o 52; men sedermera, på nådig befallning, återstoden af denna berättelse, tillika med ett densamma i underdånighet bifogadt general-sammandrag för 75 år, allt ifrån år 1749 tillbaka, utvisande årliga nativiteten; mortaliteten, ingångne och genom döden upplöste äktenskap, årliga antalet döde i kopporna, samt folk-mängden hvarje qvinquennii-år, ej allenast öfver hela Riket, utan ock i Stockholms stad, särskilt tryckt och med Tidningen N:o 205 för år 1825 utdeld;

Årsberättelsen för år 1824 införd i Post- och Inrikes-Tidningen år 1826, N:o 73;

Qvinquennii-berättelsen för åren 1821 med 1825, daterad den 10 Maj 1828, utdeld med samma Tidning för år 1828, N:o 289, hvarförutan af de dertill hörande 42 tabellerne, — i hela deras vidd i stentryck utgifne, — anbefald utdelning blifvit verkställd till de publike Verken, Prosterierna och alla Stadsförsamlingarne i Riket, hvarefter de återstående tabell-exem-

plaren emot lindrigt pris hållits allmänheten tillhanda;

Berättelsen för åren 1826 och 1827, särskilt tryckt, och med Post- och Inrikes-Tidningen år 1829, N:o 118 utdeld,

Årsberättelsen för 1828, intagen i samma Tidning år 1830, N:o 49, och dertill hörande tabell tillika utdeld;

Den för år 1829, likaledes i Tidningen år 1831, N:o 118;

Qvinquennii-berättelsen för åren 1826 med 1830, tryckt och utdeld med Post- och Inrikes-Tidningen år 1833, N:o 170, dock utan att de dertill hörande 51 tabellerna denna gång till trycket befordrades;

Berättelsen för åren 1831 och 1832 i Stats-Tidningen år 1834, N:o 194 intagen, och de dertill hörande 2:ne tabellerna tillika utdelade;

Likaledes Berättelsen och tabellen för år 1833 med Stats-Tidningen år 1835, N:o 98;

Årsberättelsen för år 1834, införd i Stats-Tidningen år 1836, N:o 51, hvarefter på särskilt nådig befallning, såväl den dertill hörande tabellen, som ett särskilt utdrag af Tabellverket, till närmare upplysning i synnerhet om de år 1834 i den då härjande Cholera-farsoten aflidnes antal och ålder m. m., med 1836 års Stats-Tidning, N:o 76, utdelades;

Qvinquennii-berättelsen för åren 1831 med 1835, jemte 3:ne bilagor, till särskilt upplysning om folkmängdens tillväxt sedan år 1795, utdelad med Stats-Tidningen för år 1838, N:o 225, hvarförutan de samma berättelse tillhörande öfriga 48 tabellerna blefvo af trycket utgifne, och på lika sätt som år 1828, dels de Publika Verken, Prosterierna och Stads-

församlingarne delgifne, och dels allmänheten tillhandahållne;

Berättelsen för begge åren 1836 och 1837 med sina General-Sammandrag uti Stats-Tidningen år 1839, N:o 170, införd och utdelad; hvar-
 efter Kongl. Maj:t, genom nådigt bref af den 1 Februari 1841, på Commissionens underdåniga hemställan, behagat tillåta, att därefter alltid såväl sjelfva årsberättelserna, som det till dem hörande General-Sammandraget, får till ett antal af 2500 exemplar hvarje gång tryckas, och till allmänhetens kännedom med Stats-Tidningen utdelas; till underdånig åtlydnad hvaraf,

Årsberättelsen för både 1838 och 1839, såväl som tabellerna, åtföljt nämde Tidning år 1841, N:o 132, och har slutligen

Qvinqvennii-berättelsen för åren 1836 med 1840, afgifven den 6 Maj 1844, blifvit tryckt och med Tidningen, N:o 194 utdelad; men den derjemte till lika utdelning, som åren 1828 och 1838, i nåder anbefallde tryckningen af de dertill hörande 51 Qvinqvennii-Tab. har, i anseende till tryckets besvärligheter, ännu icke hunnit att helt och hållet fullbordas; *)

Och då nu sålunda de upplysningar, som utur Tabellverket kunnat förväntas, utan den särskilta kostnad för Kongl. Akademien, som från siffertabellers tryck är oskiljaktig, kommit till allmän kännedom, har jag trott mig böra afvakta någon lämplig period, då en vidsträcktare jemförelse de säkrare tabell-uppgifterna emellan skulle kunna för Kongl. Akademien framläggas, och då, från år 1815 räknadt, Tjugufem år med

*) Alla dessa tabeller äro numera fullständigt från trycket utkomna.

1840 lupit till ända, under hvilka Sveriges Rike, genom Försynens nåd, njutit ett sällspordt fullkomligt fredslugn, har jag trott tiden nu vara inne för ofvannämde min skyldighets fullgörande genom den afhandling, jag härmedelst vördsammast vågar för Kongl. Akademien framlägga.

Till en början, och såsom en fullföljd af den historik min företrädare ofvannämde år 1799 till Kongl. Akademien ingifne afhandling innefattar, anser jag mig här först böra anföra de anstalter och åtgärder samt förändringar i formulärer och föreskrifter, hvilka under den sedermera framflutna tiden, till förmodad förbättring af Tabellverket, blifvit vidtagne.

Fortfarande afgifver ännu hvarje Kyrkoherde i Riket för sin församling såväl *ärlig* tabell öfver nativiteten och mortaliteten samt ingångne och upplöste äktenskap m. m., som ock — Kyrkoherdarne i Stockholm och Norrköping ensamt undantagne, — *hvert femte år* en särskilt tabell öfver den vid årets slut i församlingen befintliga folkmängden, hvilka tabeller, hvad nämde tvenne städer angå, upprättas och afgifvas genom dervarande Magistraters försorg. Af alla förenämde tabeller för landsbygden, hvilka likväl, på de flere ställen, där församlingarne äro belägne i mer än ett Län, partielt för hvardera länsdelen skola upprättas, sammanräknar och författar hvarje Contracts-Prost en summarisk tabell, eller 2:ne, der Contractet på flere Län är fördeladt, för alla hans Contract underlydande församlingar, hvilka prosteri-tabeller, tillika med dem, som från Städerna afgifvas, till Consistorierna insända, och, efter der undergången granskning, vidare till Kongl. Commissionen fortskaffade, utgöra materielen för de Läns- och Stifts-Tabeller, som, efter deras här ytterligare

till siffran undergångna noggranna revision, numera i Kongl. Tabell-Commissionen blifva upprättade, och utgöra grunden för den så kallade Riks-Tabellen eller det årliga General-Sammandraget. I de med 1800-talets början för begge dessa slags tabeller fastställde och emanerade formulärer blef ingen ändring hufvudsakligen vidtagen förr, än år 1820, då en ny upplaga af dem ägde rum.

Hvad nu först angår dittills gällande formuläret för de årliga, eller de så kallade mortalitets-tabellerna, gällande både för Landsbygden och Städerne, hade de deri tillika föreskrifne uppgifterna angående ungefärliga utsädet under året af råg, hvete, korn, hafra, blandsäd, ärter och potates, äfvensom å kornets förökning af dessa utsäden, på många anledningar tid efter annan befunnits i mer och mindre mån otillförlitliga, och kunde icke gerna blifva annorlunda i anseende till den tillåtna *ungefärliga* uppgiften; hvartill kom ett af Presterskapet sjelft öfverklagadt misstroende och farhåga för högre beskattning, som visade sig hos dem, af hvilka hithörande upplysningar skulle inhämtas. Otillförlitligheten, eller skilnaden emellan dessa uppgifter och verkligheten, ådagalades, ensamt hvad Upsala Län angick, genom en af Landshöfdinge-Embetet derstädes under den 8 November 1816 till Kongl. Maj:t aflåten underdånig skrifvelse, enligt hvilken differencen i Presterskapets uppgifter af utsädet, ensamt för år 1815, emot verkligheten skulle hafva utgjordt icke mindre än 5775 tunnor af samtliga öfvanuppräknade sädesslag, potäterne inberäknade. Af denna förekomne olikhet, och flere i Tabell-Commissionens häröfver infordrade och den 23 Juni 1818 afgifne underdåniga utlåtande

anförda skäl, samt Commissionens på grund af dem gjorda hemställan, behagade Kongl. Maj:t i nådig skrifvelse af den 6 Juli 1821 bifalla, att dessa slags uppgifter, såsom då redan intagne i det för Landshöfdingarnes femårs-berättelse fastställda formuläret, från Presterskapets årstabeller finge uteslutas, hvarefter det derigenom i formuläret ledigblifua rummet begagnades till erhållande af förut *Församlingsvis* saknad specifikation å födde oäkta barn, å dode under 10, emellan 10 och 25, 25 och 50 samt öfver 50 års ålder, och å de vaccinerades antal, uti hvilket allt upplysning hittills endast prosterivis, eller för hela Contract, kunnat här vinnas. Alltifrån Tabellverkets början var i formuläret föreskrift gifven om dödlighetens noggranna specifikation under icke mindre än 34 särskilta sjukdoms-rubriker, hvilka anteckningar under då framflutne 80 år kostat icke mindre tabellförfattarne, än tjänstemännen i Kongl. Commissionen ett sedermera otacksamt besunnit drygt arbete. I hvad mån större tillförlitlighet härutinnan i äldre tider ägt rum, lemnas derhän; men tvifvelsmål kunde, efter år 1815 åtminstone, icke uteblifva, då, enligt Kongl. Commissionens underdåniga skrifvelse daterad den 22 September 1820, icke mindre än 43,950 personer, eller nära 7:de delen af antalet under ett tillryggalagdt Qvinquennium döde, hade blifvit upptagne under den bland uppgifterna då tillåtne rubriken: *Oangifven sjukdom*. Under det den tid herrskande nit om utvägar till en förening af de medicinska med de ecclesiastika bestyren hos Presterskapet, troddes likväl rättelse häruti kunna vinnas, ej allenast genom berörde rubriks uteslutande ifrån, utan ock förmedelst alla de öfriga rubrikernas om-

flyttning i nosologisk ordning i formuläret, och genom ett deri tillika infördt register å synonyma sjukdomar, på hvilket sätt det 1821 emanerade formuläret fördenskull förändrades, hvar efter anteckningarne på sådant sätt ännu sedermera i 10 års tid fortforo, helst som förslaget härtill, afgifvet af Herr Professoren och Riddaren TRAPVENFELT, på det kraftigaste understöddes af Kongl. Commissionens Ledamot Herr Presidenten och Commendören von SCHULZENHEIM. I detta med år 1821 utfärdade och begagnade nya formulär blef det öfriga lediga utrymmet hufvudsakligast användt till 2:ne nya artiklar, den ena för anteckning af olika åldrarne i hvilka äkten-skap ingingos, och den andra för anteckning af In- eller Ut-flyttningarnes särskilta antal i hvarje Prosteri. Vid den sedermera år 1830 inträffade Riksdagen afgaf till Kongl. Maj: Högvördiga Preste-Ståndet åtskillige af dess Ecclesiastik-Utskott vid såväl de årliga, som de qvinqvennale tabellformulärerna gjorda anmärkningar, såsom orden lyda, *"till det afseende desamma möjligen kunde finnas förtjena"*, hvaröfver Tabell-Commissionens underdåniga utlåtande infordrades. Den hufvudsakligaste af dessa anmärkningspunkter var då Ståndets önskan, att Presterskapet alldeles måtte befrias ifrån skyldigheten att specificera dödsorsakerna, hvilken specifikation af Ståndet sjelft medgafs vara ganska opålitlig, och ej kunde blifva annat, då en af Ståndets samt Utskottets egna tabellförfattande ledamöter, uti en anmärkningarne bifogad bilaga, öppet förklarade sig alltid under rubriken: *Andtäppa* bruka införa alla dem, om hvilkas dödsorsak ingen säker uppgift till honom hade blifvit aflemnad. För egen del finnes också
Kongl.

Kongl. Commissionen, i dess för år 1825 afgifne Qvinquennii-berättelse, sig föranlåten att fästa Kongl. Majts nådiga uppmärksamhet på ifrågavarande allt mer och mer uppdagade otillförlitlighet, såsom nästan oundviklig, i anseende till prestgårdarnes i de fleste pastorater ofta betydliga aflägsenhet, hvarigenom den prestman, som anteckningen ålåg, urständsattes att sjelf kunna bedömma dödsorsakens beskaffenhet, utan nödgades dervid förlita sig på af oförstånd och okunnighet oftast vilseledande berättelser af dem, som dödsfallen för honom anmälde; hvarigenom den afsedda pålitlighet, som borde ligga till grund för en önskvärd generel beräkning af hvarje sjukdoms årliga inflytelse på mortaliteten orterna emellan, icke kunde vinnas, om ock prestmannen ägde all den medicinska insigt, som genom sednare tiders vidtagne författningar, ehuru egentligast till sjukdomars botande och förekommande, allmännare än fordom, nu kunde vara att förvänta; hvarförutan, och med undantag af koppsmittan, missfall, epulemiskt härjande farsoter samt inträffande olyckshändelsers närmare beskaffenhet, Commissionen trodde de öfriga dödsorsakernas noggrannare kännedom, åtminstone nu mera, kunna för tabellverket anses likgiltigare än förr, sedan Kongl. Sundhets Collegium, genom dit ingående förbättrade rapporter från provincial-läkarne, blifvit i tillfälle att, säkrare än någon annan autoritet, bedömma de sjukdomar, som lokalt i en eller annan ort, jemförelsevis till andra orter, ägde en större inflytelse på dödligheten. Med åberopande af detta underdåniga utlåtande, iakttog Kongl. Commissionen i dess under den 8 December 1830 afgifne nya förslag till formuläret för den årliga

anteckningen, ett härmed öfverensstämmande utslutande af alla andra dittills begagnade dödsorsaks-rubriker, än af *Barnsbörd*, *Smittkoppor* samt *Olyckshändelser*, likväl med en ibland de på tabellen upptagne anmärkningspunkterna författarne lemnad uttrycklig föreskrift, att i händelse någon epidemiskt härjande farsot, såsom rödsot eller mässling m. fl., skulle åstadkomma någon större dödlighet i orten, då, på lika sätt som tillforene, såväl till antal och olikhet i åldern, som till månaden af året, ombesörja anteckningen; hvarförutan i detta nya formuläret ett särskilt rum lemnades författarne ledigt, för att, utom beskrifning å inträffande märkvärdiga naturhändelser, äfven där meddela närmare upplysning om de epidemier såväl ibland människor som husdjuren, hvilka under årets lopp kunde i en betydligare och ovanlig mån hafva varit gängse. Vid samma tillfälle, samt i öfverensstämmelse med Preste-Ståndets yttrade åsigt och önskan, uteslöts äfven, såsom lika opålitlig ansedd, en i förra formulärerna upptagen särskilt artikel under titel: *döde fattige*; hvaremot en ny artikel infördes för specifikation, så till åldern som döds månaden, af alla dem, som under året aflidit i *Barnhus*, *Fattighus*, derunder jemväl utom desamma *fattigmedel åtnjutande* inbegripna, i *Lazaretter*, *Hospituler* och *Fängelser*, med afskiljande dervid af de äkta eller oäkta barnen, såväl under 1 år, som deremellan och 3 års ålder. Vidare, och i öfverensstämmelse med ett af Biskopen m. m. Herr Doctor HEDRÉN uppgjort förslag, infördes i detta formulär 2:ne nya artiklar för såväl *de föddes* som *de dödas* upptagande efter ståndsklasser, äfvensom den förrvarande artikeln för äktenskapernas anteckning

i enahanda hänseende blef omändrad, för hvilka redan länge förut vigtiga ansedde upplysningar utrymme allt dittills hade saknats. Åtskilliga smärre vidtagna förändringar att förtiga, voro följande 3:ne i öfrigt de hufvudsakligaste, nemligen: Fördelningen af artikeln: *Dödfödde*, till skilnad emellan dem af äkta eller oäkta säng; en ny artikel för *Barna-föderskornas* antecknande *under antingen goda, bergliga eller knappa villkor*; samt slutligen förändring af förra uppgiften å *in- och ut-flyttade* till en formlig kalkul, på sätt af Herr Prosten HAMMARGREN var föreslaget, hvilket förslag till alla delar af Kongl. Commissionen desto hellre antogs, som den derigenom närmare bestämda årliga uppgiften å folkmängden i hvarje prosteri, ehuru icke församlingsvis vunnen, ansågs ledande till någon ytterligare kontroll å efterföljande års qvinquennale tabeller. Sålunda förändrade och fastställde genom Kongl. brefvet af den 29 Januari 1831, hafva dessa nya formulärer ifrån och med samma år tjent vederbörande till efterrättelse för den årliga anteckningen, och slutligen vid den nya upplaga af dem, som år 1840 blef af nöden, har ingen annan väsendtlig förändring blifvit vidtagen, än den, att till följd af Kongl. Maj:ts nådiga befallning i bref af den 26 Juni 1840, den nyss här ofvan omnämnda artikeln för *Barna-föderskornas* åtskiljande i goda, bergliga eller knappa villkor, ökades med en fjerde rubrik: för dem i *fattiga villkor*, till hvilken böra hänföras alla sådana, som i anseende till bristande arbetsförmåga, eller i saknad af egna tillgångar, helt och hållet försörjas genom allmänna eller enskiltas gåfvor och understöd.

Hvad beträffar de 2:ne särskilta tabell-formulärerna för folkmängdens qvinqueunnala antecknande, det ena för landsbygden och det andra för städerna, så hafva desamma emellan åren 1800 och 1840 icke mer än en enda gång, eller år 1825, i öfverensstämmelse med Kongl. brefvet af den 19 Januari samma år, undergått förändring, som då bestod deri, hvad förstnämde formulär eller det för landsbygden vidkom, att, på sätt i ett föregående nådigt bref af den 8:de Maj 1821 var förordnad, de nu mera i Landshöfdingarnes semårs-berättelser ingående uppgifter om *ungefärliga tunnelandtalet öppen jord, dess besädda del, äfvensom antal hästar, oxar, kor, ungboskap och får*, helt och hållet uteslötos, hvarigenom utrymme vanns till förut *församlingsvis saknad specifikation å antalet af matlag, gifta, enklingar och enkor samt ogifta och barn*. Att förtiga åtskilliga i rubrikerna inom hvarje klass, till vinnande af fullkomlighet och tydlighet, gjorda rättelser och tillägg, som uti Kongl. Commissionens underdåniga skrifvelse, redan af den 22 September 1820, hos Kongl. Maj:t hemställdes, och medelst högstberörde bref i nåder gillades, blef genom artiklarnes omställning utrymme beredt ej allenast för några nya §§, dels för *Gästgifvares, Traktörers och Krögares särskilta upptagande*, hvilka, i saknad af bestämd rubrik, förut omvexlingsvis i olika §§ intagits, och dels till afskiljande och närmare specifikation af *Fångar*, som förut ibland fattighjonerna voro inräknade; samt för utsättande af *antalet* för hvarje ort af de i formuläret uppräknade *Bruk och Fabriker* m. m., utan ock för intagandet deri af alla den tiden gällande och nödiga ansedde föreskrifter till författarnes vägledning vid tabellernas

upprättande, hvilka såmedelst dervid alltid skulle ligga dem för ögonen. Enahanda kolumnernes omflyttning och vidsträcktare införda underrättelser för de tabell-författande, iaktogs äfven i formuläret för städerna, hvars hufvudsakligaste förändring i öfrigt bestod af en ny och särskilt § för intagande af i Biket bosatte *Utländningar* och *Mosaiske Trosbekännare*, äfvensom af en för *Fångarnes afskiljande från Fattighjonen*. I begge formulärerna, hvad angick *hushållen*, hvilka förut uppgåfvos under 4 rubriker af *förmögna*, *behållna*, *fattiga* och *utfattiga*, blef, till följd af en särskilt nådig befallning i Kongl. brefvet af den 19 Januari 1825, den för dem bestämda artikeln i så måtto förändrad, att desamma dädanefter i blott 3 afdelningar skulle specificeras, nemligen: sådane, som *af egna tillgångar ägde mer, än hvad till deras försörjande erfordrades*; sådane som *kunde af egna tillgångar sig försörja*, samt slutligen sådane som *det icke kunde förutan andras gåfvor och understöd*.

Med året 1840 blef af sistnämde begge formulärer, liksom, på sätt redan ofvan är nämnt, af det för den årliga anteckningen, en ny upplaga af nöden, i anledning hvaraf Kongl. Commissionen, efter att hafva afgifvit ända dertills med nådig tillåtelse uteblifvet och fördröjt underdånigt svar på Kongl. Majts nådiga remiss å de vid 1830 års riksdag af Preste-Ståndet i afseende äfven på folkmängds-tabellerna framställda anmärkningar, för egen del deri föreslog åtskilliga ganska väsendtliga förändringar, förnämligast bestående deruti, t:o, att då af folkmängds-tabellerna, hvad mankönet beträffade, verkliga personalet i vissa yrken och näringar icke kunnat igenfinnas, af orsak, att, enligt gifven föreskrift, i hela den dithö-

rande särskilta artikeln med titel: *Folkmängden efter stånd och villkor*, ingen person får mer än en gång och på ett enda ställe, i den hans hufvudsakliga tjänst eller yrke tillhörande §, upptagas, hvarigenom fördenskull civila och militära personer och borgare, som tillika äro antingen possessionater eller arrendatorer af landegendom, eller ock bruks- eller fabriks- idkare, hvarpå mångtaliga exempel gifvas, nödvändigt måste minska antalet af de sistnämnda klassernas verkliga numerär, likasom ock handtverkare, som på en gång idka flera yrken, på ettdera stället måste vara uteslutne; till hvilken allmänna föreskrift orsaken låg i de oredor och misstag, hvartill den flerdubbla anteckningen i förra tidens tabeller gifvit anledning, hvarigenom oriktigheter i sjelfva folknummerberäkningen inträffat, hvilket skäl också nu hindrade Commissionen att i samma ännu gällande föreskrift tillstyrka minsta förändring; så hade Commissionen nu, under hvardera af de 3 särskilta §§. som angå *Jordbruket, Bruk och Fabriker*, samt *Handtverkerierna*, i formuläret infört noter, uti hvilka, utan summarisk inräkning i tabellen, författarne borde å nyo anteckna antalet af sådana i de andra §§:na redan upptagna personer, som jemväl kunde finnas nämde 3 §§. tillhörande, hvarigenom Commissionen förmodade den dittills saknade upplysningen i framtiden kunna vinnas, endast med undantag af de handtverkare, som inom en och samma klass utöfva flera yrken på en gång, hvilken saknad dock ansågs mindre väsendtlig. 2:o, att, till ådagaläggande af det gifta mankönets förhållande till det ogifta, äfvensom af de hos sina män hemma vistande hustrurna, i alla rubrikerna hela 3:dje artikeln igenom, som specificera *mankönet till*

stånd och yrken, 2:ne nya kolumner blefvo tillförda, den ena afskiljande de ogifta och enklingarne från de gifta, och den andra för hustrurnas antecknande, hvilka sednare i de förut gällande formulärerna endast klassvis summariskt varit upptagna i en särskilt §, uti hvilken nu deremot endast komme att antecknas de hustrur, som antingen för innehafvande särskilta yrken och näringsfång bo för sig sjelfva, eller ock efter skilnad till säng och säte lefva ensamma. 3:o, att från § *Privatorum tjenstefolk* afsöndrades, och till den, som angår jordbruket öfverflyttades *Gårds-Inspectorer, Rättare, Brännmästare, Trädgårdsmästare och Trädgårdsdrängar, Skogvaktare, Jägare och Fiskare samt Gårdsdrängar på landet*, så att den förstnämde §:n blott bör innefatta den betjening, som för uppässningen inom hus hos privata personer är antagen. 4:o, att § för anteckningen af *Fattighjon* förändrades, utom mera ändamålsenligt till sjelfva titlarne, äfven till upplysnings vinnande om antalet antingen gifta, ogifta eller enklingar och enkor samt de där föräldrarne åtföljande barnen öfver eller under 10 års ålder särskilt. 5:o, att vid den § som är bestämd för *ogifta qvinnor*, en ny kolumn tillfördes, för antecknandet af *hos dem vistande oäktu barn utan skiindad på ålder*. 6:o, att en förut varande särskilt artikel, som innefattade *jemförelse* den ifrågavarande och den förutgående qvinqvenniiperiodens uppgifter emellan, i afseende på folkmängdens tillökning och de emellan varande årens uppgifters öfverensstämmelse dermed, indrogs, och i stället blef sammanslagen med förut varande artikeln om in- och utflyttade personer, som åter förändrades till en efter Kongl. Commissionens formenande, för riktig upplysning i begge delar-

ne, ändamålsenligare kalkel. 7:o, att det igenom in-
 dragningen af nyss omnämde förra 3:dje artikel le-
 digblifna rummet begagnades till en ny not för
 förut saknade upplysningar om antalet *qvin-
 nor, som befatta sig med barna-undervisning, barn,
 som af en sådan undervisning sig begagna, samt
 af i Riket befintliga vansinniga, blinda, döf-
 stumma, lytta och bräckliga eller af alderdom
 vanföra*, hvilka icke i dithörande instituter eller
 barmhertighets-inrättningar blifvit intagna. Med
 förbigående af alla de redactions-förändringar,
 som i öfrigt rubrikerna inom §§:ne undergingo,
 bör slutligen här endast nämnas, att allt det le-
 diga rum formulärerna derefter lemnade, blef be-
 gagnadt: 8:o, till vinnande af uppgift å alla i
 hvarje prosteri och stad befintliga *Läro- och Un-
 dervisnings-anstalter, Fattig- och Välgörenhets-
 inrättningar*, äfvensom å dem för *Hetsovården*.

Vid öfverlemnandet till Nådig fastställelse af
 dessa underdåniga projekt-formulärer, hemställde
 hos Kongl. Maj:t Tabell-Commissionen dock, i
 ofvannämde dess skrifvelse af den 12 December
 1839, om icke desse, såväl som det för den år-
 liga anteckningen, måtte, före formulär-upplagornas
 tryck, vid den då kort derefter inträffande riks-
 dag, i nåder delgifvas det Högvördiga Preste-
 Ståndet till afgifvande af underdånigt utlåtande,
 i fall några ytterligare ändringar, antingen i
 sjelfva formulärerna, eller ock, och synnerligast
 i afseende å de deri intagne föreskrifterna, å dess
 sida kunde vara att föreslå, och som Commis-
 sionen destomer förmodade blifva en till Tabell-
 verkets fullkomnande bidragande åtgärd, som
 ibland detta stånds ledamöter flere säkerligen fun-
 nos, som sjelfva vid tabellverket lagdt och ännu
 lade hand, helst Commissionen mer än en gång

tillförene, hade funnit många olikheter orterna emellan utgöra en ibland de största svårigheterna, att nöjaktigt kunna förtydliga sina i afseende på tabellernas författande gifna föreskrifter; till hvilken underdåniga hemställan Kongl. Majt tacktes lemna nådigt bifall, hvarefter Högvärdiga Ståndet, sedan emedlertid flere förklaringar under tiden directe ifrån Kongl. Commissionen blifvit infördrade, uti underdånig skrifvelse, daterad den 3 Juni 1840, efter åtskilliga föreslagna sedermera också iakttagna mindre redactions-förändringar, och hufvudsakligast yttrad önskan, att i formuläret för den årliga anteckningen vid artikeln om Barnaföderskornas villkor, om den ej helt och hållet kunde få utgå, åtminstone de modifikationer, som i detta hänseende i formuläret för folkmängds-anteckningarne voro gifna, finge begagnas, — hvilket sednare alternativ också sedermera genom ett tillägg i förklaringarne å den årliga tabellen blef vidtaget —, slutligen, såsom orden lyda, "*ansåg sig förbundet anmäla, att de af Högvärdiga Ståndet vid Riksdagen 1828—1830 önskade och föreslagna förändringar eller hemställda anmärkningar vid formulärerna blifvit dels i allo iakttagne, och dels på ett fullt nöjaktigt sätt besvarade*".

Hvartdera af dessa slags tabeller hafva ända ifrån begynnelsen innefattat och innehålla ännu inom sig så många kontroller i deras förnämsta delar: nativitetens och mortalitetens belopp, ingångne och genom döden upplöste äktenskap samt sjelfva folkmängden, att ingen deras författare, utan fullkomlig egen medvetenhet derom, bör kunna meddela oriktiga uppgifter. Vål finnas deribland vissa detaljer, der full visshet är nära nog omöjlig att förvänta, och förnämligast ibland

dem är specifikationen af folkmängden i vissa *alders-afdelningar*, helst mången, i synnerhet af kvinnokönet, torde uppgifva sin ålder mindre än den verkligen är; men sådant har troligen varit lika öfligt i förra, som i närvarande tider, och likväl hafva de Annuitets-beräkningar, på hvilka Allmänna Enke- och Pupill-Cassans af framlidne Herr Öfver-Amiralen m. m. Grefve LAGERBJELCKE så förtjenstfullt utarbetade, med skäl lofordade, och oaktadt så många framflutna år ännu bestånd ägande pensions-reglemente, hvad de olika delaktighets-afgifterna i hvarje ålders-klass angå, sig grundar, förnämligast, om ej uteslutande, stödt sig på uppgifter och upplysningar i detta hänseende hämtade från tabellverket. Handlingarne i dess archiv bevittnar ovedersägligen, att Prestskapet nu, mera än fordom *), inser och erkänner tabellverkets gagn och nytta. De förete ock under sednare tider flertaligare bevis på nit om pålitlighet i uppgifterna, än å förelupne uppenbara fel, änskönt formulärerna ofta nog i åtskilliga delar blifvit klandrade, likväl mestadels utan skäl, och alltid utan uppgift, huru önskade ändringar i dem ändamålsenligt skulle kunna hafva åstadkommits. Afböjandet af missförstånd, äfvensom lättnad vid tabellförfattarnes åtgärder, bör hädanefter så mycket mer blifva en följd af Kongl. Commissionens nyligen beslutade och under den 20 Maj detta år emanerade cirkulär till Rikets samtliga Consistorier, som äfven förslaget dertill vid den nyligen öfverståndna riksdagen

*) Tvenne exempel finnas å för året insända tabeller, som innehållit fullkomlig afskrift af en förut insänd tabell för ett föregående år, som måste anses utgöra ett bevis på då rådande alltför stor liknöjdhet på dessa ställen.

blifvit det Högvärdiga Preste-Ståndets skärskådande understäldt, innefattande en utförligare på ett enda ställe sammanförd förklaring af alla för tabellernas författande tid efter annan gifna, ännu gällande föreskrifter, hvilka under de sednare tiderna, såsom redan är nämdt, å sjelfva formulärerna intagna, måst för utrymmets skull i möjligaste måtto förkortas, hvilkas genom denna åtgärd måhända i framtiden möjliga totala uteslutande från tabellformulärerna, skall bereda utrymme för andra viktiga upplysningar, som då till äfventyrs kunna finnas vara af nöden att inhämta.

Hvad den qvinqvennala folkmängdsuppgiften i synnerhet angår, skulle väl en gen och säker kontroll synas vara att hämta från de till Kongl. Kammarrätten, Riksgälds-Contoret jemte flere andra publika verk årligen ingående räkenskaper och handlingar; men såväl i allmänhet, som särdeles i det fall, att frågan anginge något visst fögderi, ligga tvenne väsendtliga hinder för öfverensstämmelsen i vägen, för det närvarande oöfvervinneliga. Det ena är olikheten i den ecclesiastika mot såväl den camerala, som den militära och juridiciella indelningen i Riket, såsom här nedan närmare skall anföras, och det andra, men tillika hufvudsakligaste, att alla till ofvanberörde verk och stater ingående uppgifter grunda sig på de årliga mantals- och skattskrifningslängderna, hvilka upprättas på olika, äfven orterna emellan, ganska skiljaktiga terminer, ofta flere månader före årets utgång, hvaremot de till tabellverket från Presterskapet inkommande underrättelser innefatta förhållandet vid hvarje års slut, hvadan dessa sednare, såsom på en och samma tid samlade, medverka dertill, att tabellverket såmedelst torde

kunna, hvad folkmängden angår, anses lemna den sannfärdigaste bland alla derom inkommande uppgifter för året.

Den enda för tabellverket i detta hänseende hittills möjliga kontrollen består i öfverensstämmelsen emellan de sammanräknade årligen inkommande tabellerna under en qvinquennii-period, och den det femte året deraf tillika särskilt afgifne qvinquennii-års tabellen, på så sätt, att då nativitetens under samma tid årligen uppgifna öfver- eller under-vigt emot mortaliteten blifvit antingen tillagd eller afräknad ifrån nästföregående qvinquenni-års folkmängd, och sedan de under tiden äfven uppgifna in- eller utflyttades medverkan blifvit behörigen iakttagen, bör resultatet finnas öfverensstämmande med den sist uppgifna folkmängden; men hvilken kontroll, eluru partielt på de fleste ställen användbar, i afseende på Rikets folkmängd i det hela, dock alltid måste blifva ofullständig, just af den här ofvan sist anförda orsak, den nemligen, att qvinquennii-tabellerna för Stockholms stad och Norrköping *) upprättas, icke af presterskapet, utan genom

*) I anseende till dervarande flere både egna och främmande religions-förvandters samt församlingsboarnes blandning om hvarandra, anmäldes hos Kongl. Commissionen, genom Vener. Consistorium, presterskapets derstädes uppgifna hinder för fullständiga folkmängdstabellers upprättande, hvarföre Kongl. Commissionen såg sig nödsakad, att hos Landshöfdinge-Embetet begära, att qvinquennii-tabellen i stället måtte genom Norrköpings magistrats försorg blifva författad och insänd; öfver hvilken Landshöfdinge-Embets i öfverensstämmelse dermed utfärdade föreskrift, magistraten hos Kongl. Majt sedermera anförde sina underdåniga besvär; men genom nådig resolution af

genom magistraternas försorg af dem underlydande mantals-kommissarier, på grund af de af dem flere månader före tabellårets slut förrättade mantalsskrifningarne; hvartill kommer, att de till och ifrån Stockholms stad årligen timande in- och utflyttningarne aldrig kunnat från någon af de härvarande autoriteterna med nöjaktig säkerhet uppgifvas.

Om nu den nyssnämde kontrollen för alla sist framflutne 25 åren anställles, och om man sålunda till den för året 1815 uppgifne folk-

	m.	q.	S:a.
af	1,176,967.	1,288,099.	2,465,066
adderar de under denna tid födde, utgörande ett antal af	1,190,348.	1,137,545.	2,327,893

S:a 2,367,315, 2,425,644. 4,792,959,

men deremot subtraherar de dödas med 840,713. 807,859. 1,648,572;

borde alltså folk-
mängden vid
1840 års slut ut-
göra 1,526,602. 1,617,785, 3,144,387,
men då den är
uppgifven till
belopp af 1,516,429. 1,622,458. 3,138,887

så uppstår en dif-
ferens af — 10,173. + 4,673. — 5,500
eller per medium — 407. + 187. — 220;

den 16 Februari 1827, ålades magistraten skyldig-
heten att såväl då saknade, som framtida sådane ta-
beller afgifva.

hvilken ringa skiljaktighet emot en så lång tid likväl synes innebära någorlunda säkert bevis om iakttagen noggrannhet i anteckningarne, helst då man besinnar, att på landsbygden ensamt finnes närmare 2500 församlingar, från hvilka ett lika antal tabeller hvarje år, och hvar femte år tvenne afgifvas till omkring 170 Contractsprostar, hvilka åter af dem författa de sammandrag, som till Kongl. Commissionen ingå; och hurusom differensen skulle bli mångfaldigt större, om blott en enda person i hvardera af de qvinnennala tabellerna varit utesluten, och ännu större, om dylika fel hade i de årliga tabellerna blifvit begångna. Det bör icke eller här förtigas, att presterskapet i Carlstads stift till Kongl. Commissionen inberättat, att under sednare åren många i de dervarande så kallade Finnmarkerna bosatta personer blifvit upptäckta, hvilka längre tider förut varit presterskapet alldeles okända, hvilka följaktligen ifrån qvinquennii-tabellerna, såväl år 1815, som flere af de efterföljande, varit uteslotne; hvarigenom ofvanstående befunna öfverskott af kvinnokönet lättare förklaras, än genom så stor, dock till någon del möjlig, inflyttning till Riket från utrikes orter. Men bristen deremot å mankönets sida blifver då desto större. Den synes dock förnämligast härleda sig ifrån kringvandrande gesäller och arbetare, om ej ifrån rent af — i synnerhet i sednare tider — till främmande länder utflyttade personer, hvilka, efter det de i hemorten blifvit såsom bortflyttade afförde, icke å de orter, der de sig sedermera intill utresan uppehållit, ordentligen antecknats, och hvad Stockholms stad angår, kan det ej dragas i tvifvel, att ju icke ett betydligt stort antal egentligast af mankönet, genom täta ombyten

af bostad, äfvensom ock i ren saknad af ordentligt hemvist, vid mantalsskrifnings-terminerna undslippa både anteckning i längderna och den dermed åtföljande taxeringen.

I de folkmängds-tabeller, som ifrån Consistorierna stiftsvis för året 1790 hade blifvit upprättade och afgifna, upptäcktes sedermera rättade mindre felaktigheter; men i Linköpings stiftstabell har Norrköpings stad befunnits vara alldeles utesluten, för hvilken, enligt här befintliga anteckningar, icke eller sedermera någon tabell är för nämde år inkommen. Om derföre, vid en lika beskaffad kontrolls anställande med den nyss upptagne för de ifrån året 1790 till och med 1815 förut framflutna 25 åren, man såsom sannolikast antager denna stads sålunda i beräkningen år 1790 uteslutna folkmängd då hafva utgjordt 3000 af man- och 3300 af qvinno-könet, och deremot såsom Finlands inbegripna enskilda folkmängd anser och afräknar Åbo och Borgå begge stiftstabeller, så skulle vid 1790 års slut folkmängden i Sverige ensamt utgöra, i enlighet med samma års

Tabellverk . . . 1,031,831. 1,124,962. 2,156,793.

tillägger man då
nativitetens be-
lopp under de
25 efterföljande
åren, med un-
dantag af sist-
nämde 2:ne stift

972,079. 928,328. 1,900,407.

S:a 2,003,910. 2,053,290. 4,057,200.

men sedan afräk-
nar på lika sätt

	m.	q.	S:a.
samma tids mortalitet med . . .	792,115.	783,891.	1,576,006.
så skulle 1815 års folkmängd hafva utgjort . .	1,211,795.	1,269,399.	2,481,194.
men då den i 1815 års inkomna tabeller är uppgifven, som ofvan	1,176,967.	1,288,099.	2,465,066.
visar sig således differensen för denna tid vida större, eller med	— 34,828.	+ 18,700.	— 16,128.

Denna så ansehlige brist, hvad mankønet angår, härleder sig till största delen uppenbarligen ifrån uteblefna anteckningar i presterskapets årstabeller af den förfärlige mängd, som åren 1808 och 1809 dels stupade i kriget och dels föllo offer för den då härjande fält- och så kallade landtvärns-sjukan. Svårare är att förklara det stora öfverskottet å qvinnokønets sida, som icke sannolikt kan tillskrifvas inflyttningar från det främmande blefna Finland eller andra utrikes orter ensamt till ett så betydligt belopp, utan härleder sig öfverskottet förmodligen derifrån, att såväl under 1790 års här ofvan beräknade folkmängd, som under den ända till året 1809 uppgifne nativiteten och mortaliteten, hvad Hernösands stift angår, många inräknade personer tillhört den förut varande Svenska andelen af Norrbottens Län, som vid fredsslutet 1809 afträdde till Ryssland, men i hvilket fall äfven i samma proportion större brist på mankønets sida uppkommer. Denna suppo-

sition synes emedlertid vinna någon styrka deraf, att Kongl. Tabell-Commissionen i sin den 17 Februari 1825 afgifna underdåniga berättelse till Kongl. Majt, på grund af uppgjorda kalkuler, styrkt verkliga förlusten under sista kriget med Ryssland ensamt, endast af Svenska medbröder, hafva utgjort 45,471, men hvaraf antalet uti 1810 års qvinqvennii-berättelse, daterad den 21 Oktober 1812, endast finnes med 23,027 personer beräknadt. Men, utom de ofelbart till stor mängd från ordentlig anteckning i mortalitets-tabellerna uteslutna krigs-offren, har äfven den sedermera upptäckta omständigheten ett betydligt inflytande på det ofvan upptagna resultatet, att i folk-mängdsberäkningen såväl år 1810, som 1805, det då till Pommern bortkommenderade krigsmanskapet befunnits vara uteslutet *), för hvilket således äfven den årliga anteckningen under de mellanvarande åren troligen blifvit utelemnad.

Vid en så betydlig opålitlighet i tabellerna emellan åren 1805 och 1810, och då, enligt Herr NICANDERS efterlemnade anteckningar, ej allenast ända till 1800-talets början, om ock mindre betydande, dock flertaliga felaktigheter förekommit i tabellerna, som sedermera icke kunnat fullkomligen rättas, utan ock, då Norrköpings stad ifrån 1785 till 1795 icke ingått i beräkning uti de under samma tid från Linköpings Stift inkomna och der sammmandragna Stifts-tabeller, samt i öfrigt, i anseende till den redan omnämnda svårigheten, att ifrån och med år 1791 ända till år 1808, ur Hernösands stifts-tabeller kunna, som

*) Se Tabellen A, bilagd den tryckta underdåniga qvinqvennii-berättelsen af den 30 April 1838, utdelad med samma års Post- och Inrikes-Tidning N:o 225.

vederborde, fränskilja alla födde och döde, som tillhört de af samma stift sedermera till Ryssland afsträdde delarne af nordligaste länet i Riket, har det, mot bättre önskan, för mig varit en omöjlighet, att för den ifrån och med 1791 till och med 1815 framlupne 25-åriga perioden, till en jemförelse emot den efterföljande, kunna utarbета så beskaffade blott någorlunda säkra kalkuler öfver folkmängden, nativiteten och mortaliteten samt ingångne äktenskap m. m., som dem jag nu för åren 1816 med 1820 har den äran att för Kongl. Akademien framlägga, summariska för hela Riket, men tillika särskilt utvisande förhållandet i Stockholms stad, hvarinom jag, till undvikande af alltför mycken vidlyftighet, trott mig böra inskränka detta lilla arbete, ehuru detsamma kunnat, och skall, om Kongl. Akademien så skulle åstunda, äfven länsvis åstadkommas.

Af orsak, som här ofvan redan är anford, att nemligen de år 1790 af Contractsprostarne afgifna tabellerna qvarstannade i Consistorierna, derifrån endast de där gjorda sammandragen till Kongl. Commissionen insändes, utan partiel afdelning för hvart län; och, med antagande af, att den här ofvan för samma år uppgifne, på anfordt sätt rättade, folkmängden är den sannolikaste, som för Sverige ensamt kan beräknas, har jag således uti härhos bifogade kalkul Litt. A. *endast Stiftsvis*, uti första afdelningen deraf kunnat framlägga *folkmängdens tillväxt under hvardera här förut omnämde 2:ne 25-åriga perioderna*, hvilken emedlertid för den sistförflutna perioden i andra afdelningen tillika är länsvis utredd; utvisande denna kalkul, att, öfver hela riket räknad, densamma utgjort:

under åren 1791 med ^{m. A. g. S:a.}
 1815 145,136. 163,137. 308,273.
 och under åren 1816
 med 1840 339,462. 334,359. 673,821.
 samt under alla 50

åren således 484,598. 497,496. 982,094.
 Den så betydligt större tillväxten under den sednare perioden af 194,326 man- och 171,222 qvin-kön, tillhopa 365,548 personer, förnämligast, och med undantag endast af Stockholms stad, uppkommen genom nativitetens öfvervigt mot mortaliteten, får likväl icke ensamt tillskrifvas det sällspordt lyckliga fredslagn, Riket derunder åtnjutit. De med året 1804 vidtagne skydds-anstalterna emot kopp-smittan, hvilka dock först med år 1810 började visa deras så välgörande inflytelse, hafva destomer under de sednaste 25 åren till denna folktillökning bidragit, som dessförrinnan, enligt ett Kongl. Commissionens underdåniga skrifvelse den 17 Februari 1825 bilagdt sammandrag för 75 års tid *), denna farsot tillförene vanligast borttryckte omkring 1500 personer om året, men året 1800 ensamt, ända till 12,032, samt hvartdera året 1795 och 1801 öfver 6000; hvaremot, såsom här nedan närmare skall visas, offren för denna farsot under den sista 25-åriga perioden blott 2:ne år uppgått till 2063, 3 andra år till något öfver 1000, men alla de öfriga åren så betydligt understigit detta förra tidens vanliga belopp, att antalet år 1823 nedgick ända till blott 11, och åren 1821 och 1823 till omkring 40 personer hvartdera i hela Riket.

*) Utdeldt med Post- och Inrikes-Tidningen, N:o 205, år 1825.

Bilagan Litt. A, som här blifvit återopad, specificerar tillika antalet kvadrat-mil i hvarje stift *), belöpande, i proportion af dem, såväl procentvis å den primitiva till grund lagda folk-mängden, tillökningen neml.:

Kvadratmil.	uti	På hvarje kvadratmil						Procenten under		Den större tillökningen under den senaste perioden.			
		under de första 25 åren.			under de sista 25 åren.			1:a perioden.	2:dra perioden.	På kvadrattmil.			1 procent.
		m.	q.	S.a.	m.	q.	S.a.			m.	q.	S.a.	
268,0	Upsala Stift. .	43	61	104	73	71	144	11,86	14,81	30	10	40	2,95
103,3	Svegnäs d:o .	77	82	159	172	163	335	9,82	18,92	95	81	176	9,10
335,0	Wästerås d:o .	5	18	23	54	51	105	3,77	16,53	49	33	82	12,76
188,7	Carlscads d:o .	60	66	126	210	199	409	14,54	40,21	150	133	283	25,67
146,0	Linköpings d:o	86	91	177	230	227	457	11,72	27,02	144	136	280	15,30
151,2	Wexjö d:o . .	80	99	179	185	181	366	17,66	30,53	105	82	187	12,87
50,3	Calmar d:o . .	138	156	294	266	249	515	21,72	31,39	128	93	221	9,67
27,1	Wälsby d:o . .	92	81	173	161	142	303	16,30	24,55	69	61	130	8,25
120,5	Lunds d:o . .	255	268	523	502	472	974	20,80	32,86	247	204	451	12,06
121,8	Götheborgs d:o	175	182	357	313	323	636	20,03	29,60	138	141	278	9,57
105,0	Skara d:o . . .	80	97	177	281	273	554	10,06	28,64	201	176	377	18,58
1961,8	Hennösand d:o	8	8	16	17	17	34	23,11	39,30	9	9	18	16,19
3578,7		39	46	85	94	92	186	14,61	27,70	55	46	101	13,09
0,2	i Stockholms stad							4,70	15,31				10,61
	I hela Riket							14,39	27,33				13,04

*) Grundande sig på ett af aflidne Öfverste-Löjtnanten och Riddaren Hällström år 1825 afgifvet utdrag af

Efter kvadratmilen räknadt igenfinnes alltså folkmängdens största tillökning, såväl under hvardera perioden särskilt, som under alla 50 åren i Lunds stift. Procentvis å folkmängden, visar den sig deremot under första perioden störst uti Hernösands stift, likasom ock under den andra perioden, med undantag endast af Carlstads stift, der procenten under den förra perioden blott uppnådde 14^{1/10}, men under den sednare 40^{1/10}, af hvilket anmärkningsvärda förhållande vill synas följa, att denne sistnämde del af Riket varit den, som i större mån än de öfriga, vidkändts följderna af kriget och af härjande farsoter, eburuväl möjligen ock, dels förändringar med stiftets pastorater, och dels inom detsamma i sednare tider förlagd större militär-styrka, härtill äfven kunna vara bidragande orsaker; omständigheter, hvilka väl förtjenade ej allenast för detta, utan ock för alla de öfriga stiftet, en särskilt närmare undersökning och utredning; men som svåriligen fullkomligt, och i allt fall icke utan ett vidlyftigare och tidödande särskilt arbete, kan nöjaktigt åstadkommas.

Vidkommande nu *den sednare perioden, eller åren 1816 med 1840, som utgör egentliga föremålet för denna afhandling*, så visar andra afdelningen af Bilagan Litt. A folkmängdens derunder vunna tillväxt uti hvarje län i Riket, ej allenast genom nativitetens, endast med undantag af Stockholms stad, vanliga öfvervigt emot mortaliteten, utan ock den inverkan in- eller utflyttningarne orterne emellan i detta afseende medfört. Härvid bör dock icke lemnas oanmärkt, att uppgifterne derå i denna kalkyl ingalunda

triangelmätningarne i Riket, likväl då ännu för de nordligaste delarne ofullbordad.

antyder summariska antalet af de skedde in- eller utflyttningarne, utan endast innefattar den öfvervigt, som å endera sidan sanningsenligt måste derigenom, antingen tillökning eller afdrag uppkomma, om eljest de till tabellverket ingående såväl årliga som qvinquennala uppgifterna med all vederbörlig noggrannhet blifvit sammanfattade. De 2:ne härom i kalkulen intagna kolumnerna utvisa sålunda, att, utom Stockholms stad, äfven Stockholms och Götheborgs län äro de, hvilkas folkmängd både till man- och qvinnokönet vanligast och ständigt nog, genom inflyttningar dit från andra orter, ökas utöfver årliga nativitets-öferskottet i de begge sistnämde länen. Hvad Stockholms stad enskilt angår, skulle den, utan dessa inflyttningars stora öfvervigt, inom icke betydligt lång tid sakna invånare, då mortaliteten derstädes, med ganska få och obetydliga undantag, äger en i förhållande till andra orter högst anmärkningsvärd större öfvervigt emot nativiteten. Till Östergöthlands, Elfsborgs, Christianstads, Blekinge och Gefleborgs län finnes af qvinnokönet äfven de inflyttades antal större, än utflyttades, som förnämligast torde härröra från i dessa län flertaligare herregårdar och fabriker, der tjenste- och arbets-hjon äga lättare tillgång och tillfälle till utkomst; men hvad angår det i kalkulen synliga öferskottet inflyttade af begge könen uti Westerbottens län, bör anmärkas, att flere socknar i detta län sedan år 1815 blifvit derifrån afskilde och lagde under Wester-Norrlands län, och att det i dessa socknar undertiden uppkomna nativitets-öferskottet blifvit sålunda till det sistnämnda länet beräknadt, i hvilken mån fördenskull utflyttningarne ifrån det förstnämnda länet minskas. Utflyttningarne

hafva deremot haft talrikaste öfvervigten ifrån Jönköpings, Södermanlands, Kopparbergs, Nerikes, Uplands och Kronobergs län; varande dock ingen möjlighet för närvarande, att utur tabellverket på önskvärdt sätt utreda från hvilka af dem, eller af de öfriga länen, Stockholms stad vanligast får sin förstärkning i folkmängden, hvilken emedlertid där, i anseende till så många personers ambulatoriska vistelse, torde nära nog alla tider på året vara i en betydlig mån större, än den mantalsskrifningen utvisar, eller den, som hvarje qvinquennii-år till tabellverket uppgifves.

Då uti den till Kongl. Maj:t under den 6 Maj sistlidet är sist afgifna underdåniga qvinquennii-berättelsen *) pag. 29 med 38, icke allenast nativitets- eller mortalitets-öfverskottets, utan ock in- eller utflyttningarnes inverkan på folkmängdens förökning eller förminskning under hela den sista 25-åriga perioden blifvit, ända till fögderivis **), äfvensom för hvarje stad utredd och framlagd, inskränker jag nu här uppgiften af denna tillökning till procenten, och till beloppet på qvadratmilen endast i hvarje län, i ordning efter den förres större belopp inom dem; begge dessa uträkningar grundade på den in margine der frammanföre för hvardera qvinquennii-perioden specificerade och enligt de inkomne tabellernas föranledande för hvarje län uträknade folkmängds-tillökningen.

*) Utdeld med 1844 års Stats-Tidning, N:o 194.

**) Hvad denna fögderivis anställda utredning angår, bör dock anmärkas, att densamma icke närmare än som skedt, och icke med all den noggrannhet som vederborde, kunnat verkställas, i anseende dertill, att, som här nedan närmare anføres, många af församlingarne äro belägne i flere än ett enda fögderi.

I denna ordning belöper på	Tillökningen i folkmängden under				
	1816 med 1820.	1821 med 1825.	1826 med 1830.	1831 d 1835.	1836 med 1840.
Wästerbottens Län	6,877	4,547	5,083	3,150	4,020
Wärmelands d:o . .	7,283	15,112	9,486	13,925	8,763
Norrbottnens d:o . .	3,010	3,482	3,263	1,469	1,411
Elfsborgs d:o	10,406	16,951	10,676	12,562	8,359
Malmöhus d:o	11,205	15,562	7,904	9,481	12,086
Kronoberg d:o	4,139	6,690	6,032	5,415	7,298
Christianstads d:o . .	8,564	10,697	4,992	7,561	7,947
Götheborgs d:o	9,297	11,772	7,363	2,958	7,962
Blekinge d:o	5,984	6,363	420	5,067	5,006
Calmar d:o	9,081	10,819	5,023	8,268	10,546
Jemtlands d:o	1,879	2,228	3,103	2,014	1,530
W. Norrlands d:o . . .	745	5,150	6,184	5,499	1,955
Nerikes d:o	3,675	8,795	7,001	5,275	3,531
Jönköpings d:o	3,992	8,442	7,482	7,375	5,624
Skaraborgs d:o	6,353	11,083	7,770	7,791	5,873
Östergöthlands d:o . .	8,715	9,734	5,329	9,436	9,580
Gefleborgs d:o	3,638	4,975	6,000	4,514	2,547
Gottlands d:o	2,184	2,587	803	1,717	904
Hällands d:o	2,827	5,564	3,318	4,380	1,579
Kopparbergs d:o	3,192	6,548	5,432	4,718	*—1,397
Södermanlands d:o . .	1,701	5,502	1,534	3,506	3,087
Stockholms d:o	359	5,391	995	4,008	2,181
Västmanlands d:o . . .	1,821	2,983	644	2,199	1,033
Upsala d:o	117	1,681	*)—155	3,035	517
S:a	117,044	182,658	115,682	135,323	111,942
Stockholms stad	2,580	3,904	1,148	2,034	1,506
I hela Riket	119,624	186,562	116,830	137,357	113,448

*) — framför siffertalet betyder här minskning i folkmängden.

I denna ordning belöper på	Procenten alla 25 åren			Qvadrat- målet.	Tillökningen på hvar qva- dratmil.		
	af man- kønet.	af qvin- kønet.	af begge kønen.		m.	q.	S:a.
Wästerbottens Län	74,03	67,66	70,71	678,5	18	17	35
Wärmelands d:o . .	40,95	36,63	38,71	150,1	186	179	365
Norrbottnens d:o . .	36,81	37,21	37,02	675,3	9	10	19
Elfsborgs d:o	38,32	35,63	36,92	102,1	289	289	578
Malmöhus d:o	36,00	32,20	34,00	41,4	706	652	1358
Kronobergs d:o	34,30	30,31	32,18	81,8	184	179	363
Christianstads d:o . .	32,70	30,40	31,53	55,0	366	357	723
Götheborgs d:o	30,65	31,97	31,33	42,0	449	488	937
Blekinge d:o	31,02	31,71	31,30	24,0	458	494	952
Calmar d:o	33,86	28,51	31,06	97,4	234	217	451
Jemtlands d:o	32,54	29,01	30,71	404,5	13	13	26
W. Norrlands d:o . . .	30,85	28,17	29,44	205,5	48	48	96
Nerikes d:o	31,08	27,50	29,21	68,2	210	206	416
Jönköpings d:o	29,65	26,49	28,00	92,2	180	177	355
Skaraborgs d:o	28,96	25,84	27,34	68,6	288	279	567
Östergöthlands d:o . .	27,57	24,81	26,12	82,9	258	258	516
Gelleborgs d:o	26,02	23,33	24,60	158,1	68	69	137
Gottlands d:o	27,86	21,80	24,55	27,1	161	142	303
Höllands d:o	25,27	20,73	22,86	39,4	236	213	449
Kopparbergs d:o	26,87	14,23	15,46	265,9	34	36	70
Södermanlands d:o . .	16,26	14,60	15,40	54,5	142	139	281
Stockholms d:o	14,76	11,96	13,29	63,9	107	96	203
Wästmanlands d:o . . .	11,41	9,44	10,36	54,8	82	78	160
Upsala d:o	7,37	5,72	6,48	45,5	61	54	115
På S:an	29,28	26,26	27,70	3578,7	94	92	186
Stockholms stad	14,19	16,27	15,31				
I hela Riket	28,84	25,96	27,33				

Efter qvadratmilen räknad är tillökningen åter helt olika, och deremot störst i Malmöhus län med 1358 personer, dernäst i Götheborgs och Blekinge med emellan 930 och 950; i Christianstads med 723; i Elfsborgs, Skaraborgs och Östergöthlands med emellan 500 och 580; i Calmare, Hallands och Nerikes med emellan 415 och 450; i Wärmelands, Kronobergs, Jönköpings och Gottlands med emellan 300 och 365; i Södermanlands med 281; i Stockholms med 203; i Wästmanlands med 160; i Gefleborgs och Upsala med emellan 115 och 140; i Wäster-Norrlands med 96; i Kopparbergs med 70; i Wästerbottens och Jemtlands med allenast emellan 26 och 35; men i Norrbottens Län aldraminst med blott 19 personer.

Att emedlertid intetdera af dessa begge resultater länsvis kan antagas såsom för framtiden fortgående, bevisas aldramest af den frammanföre upptagne särskilta tillökning under hvardera perioden, hvars så högst betydande olikheter väsendtligen berott och alltid kommer att bero af in- eller utflyttningarne orterne emellan, hvilka väl till deras summariskt inverkan belopp kunna af tabellverket inhämtas, men icke till sina flersfaldiga och omvexlande orsaker utredas.

En någorlunda säker och approximativ beräkning af folkmängdens framtida tillväxt kan således endast för Riket i det hela anställas i anledning ensamt af nativitetens och mortalitetens förhållande under någon förutgående längre tid; och då de nu sist framflutne 25 åren varit så utmärkt lyckligt befriade från med krig alltid förenade olyckor och förluster, synas de härtill vara de tjenligaste. Med grund af nedan närmare åberopade kalkül, litt. D, den jag också af sistnämde

Tab. 1.

Medeltalet af under åren 1816 med 1840								Natio
Födde.			Döde.				Länet.	
m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.		
916	872	1788	474	440	914	Wästerbottens.	44	
787	748	1535	473	458	931	Norrbotlens	31	
2980	2820	5800	1832	1721	3553	Wärmelands.	114	
1930	1845	3775	1196	1197	2393	Kronobergs	73	
3325	3176	6501	2122	2057	4179	Elfsborgs	120	
2250	2137	4387	1362	1358	2720	Jönköpings	88	
1977	1886	3863	1285	1217	2502	Nerrikes	69	
3508	3347	6855	2342	2220	4562	Malmöhus	116	
546	512	1058	295	282	577	Jämtlands.	25	
2827	2700	5527	1847	1847	3694	Calmare.	98	
1242	1188	2430	814	773	1587	Wäster-Norrlands . . .	42	
2526	2416	4942	1697	1658	3355	Christianstads	82	
1551	1504	3055	1102	1044	2146	Blekinge	44	
2845	2700	5545	1972	1922	3894	Skaraborgs	87	
2614	2508	5122	1923	1830	3753	Götheborgs.	69	
557	525	1082	365	372	737	Gottlands.	19	
3098	2972	6070	2200	2180	4380	Östergötlands.	89	
1452	1390	2842	1021	1035	2056	Hallands	43	
1395	1345	2740	957	911	1868	Gefleborgs	43	
1687	1627	3314	1219	1186	2405	Södermanlands	46	
1965	1864	3829	1456	1394	2850	Kopparbergs	50	
1383	1329	2712	1150	1123	2273	Wästmanlands	23	
1272	1227	2499	1060	1035	2095	Upsala	21	
1654	1574	3228	1529	1416	2945	Stockholms.	12	
46,287	44,212	90,499	31,693	30,676	62,369		14,59	
1327	1290	2617	1936	1638	3574	Stockholms Stad	—60	
47,614	45,502	93,116	33,629	32,314	65,943	. . . I hela Riket . . .	13,98	

Nativitets-öfverskottet per medium.			Sålledes den å 1815 års Folkmängd belöpande årliga procenten.			Procentens belopp alla 25 åren tillhopa.	
årligen.						Nativi- tets- öfver- skott.	In- eller utflytta- de.
m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.		
442	432	874	2,761	2,472	2,616	67,08	+3,63
314	290	604	1,926	1,627	1,770	43,05	-6,03
1148	1099	2247	1,691	1,504	1,594	39,84	-1,13
734	648	1382	1,680	1,346	1,504	37,58	-5,40
1203	1119	2322	1,564	1,353	1,454	36,36	+0,56
888	779	1667	1,591	1,262	1,418	35,43	-7,43
692	669	1361	1,502	1,318	1,406	35,14	-5,93
1166	1127	2293	1,434	1,343	1,386	34,70	-0,70
251	230	481	1,486	1,268	1,374	34,35	-3,64
980	853	1833	1,461	1,156	1,302	32,55	-1,49
428	415	843	1,372	1,181	1,271	31,48	-2,04
829	758	1587	1,346	1,174	1,258	31,43	+0,10
449	460	909	1,269	1,223	1,246	31,11	+0,19
873	773	1651	1,279	1,052	1,161	29,04	-1,70
691	678	1369	1,121	1,059	1,090	27,24	+4,09
192	153	345	1,224	0,864	1,038	25,85	-1,30
898	792	1690	1,157	0,919	1,031	25,79	+0,33
431	355	786	1,173	0,877	1,017	25,44	-2,58
438	434	872	1,059	0,928	0,989	24,73	-0,13
468	441	909	0,980	0,850	0,913	22,82	-7,42
509	470	979	0,915	0,732	0,818	20,46	-5,00
233	206	439	0,602	0,457	0,524	13,11	-2,75
212	192	404	0,568	0,448	0,504	12,63	-6,15
125	158	283	0,271	0,308	0,292	7,31	+5,98
14,594	13,536	28,130	1,277	1,084	1,176	29,410	-1,71
Förlust.			Förlust.			Förlust. }	
-609	-348	-957	-1,801	-0,888	-1,311	-32,775	+48,06
Öfverskott			Öfverskott			Öfverskott	
13,985	13,188	27,173	1,188	1,023	1,102	27,330	

(Inhäftas emot sid. 195).

orsak trott mig än mer förbunden att länsvis afven till årtalet specificerad författa, utgör nativitetens, utom i Stockholms stad, eljest alltid vanliga öfvervigt emot mortaliteten i medeltal för alla 25 åren, afvensom procenten deraf, beräknad å 1815 års uppgifne folkmängd, i ordning efter dess högre belopp länen emellan, som följer, nemligen: (Se Tab. N:o 1).

Med beräkning af nu utredda årliga nativitets öfverskott i hela Riket, och under förutsättning af ett än vidare fortfarande lika lyckligt fredstillstånd, synes således antagligt, att Sveriges folkmängd minst inom 115 år härefter är fördubblad.

Begge nu här intagne uträkningarne ådagalägga att folknummerns tillväxt varit störst, procentvis räknad, i de 2:ne nordligaste länen, ehuru, efter kvadratmilen, i Malmöhus Län. Att ett ordentligare lefnadssätt hufvudsakligast bidragit till detta resultat i de 2:ne förre, torde vara lika ovedersägligt, som att motsatsen varit orsaken till den så högst betydligt mindre procenten i de Stockholms stad närmast omgifvande länen.

Folkmängden

åren 1815 och 1840, i anseende till antalet gifta, enklingar och enkor, ogifta öfver 15 år, samt ungdom och barn under sådan ålder, har alla redan för begge desse år i den 1840 års Qvinquennii-berättelse bifogade tabellen N:o 34 blifvit för hvarje län specificerad, hvarföre jag, till vidlyftighets undvikande, här förbigår en så vidtsträckt jemförelse. I nu uppräknade hänseenden inskränker jag således densamma blott till förhållandet i hela Riket ståndsklasserne emel-

lan, sådant det, efter de för desses specifikation begge åren likväl något olika beskaffade formulärerna, blifvit till Kongl. Tabell-Commissionen uppgifvet, nemligen: (Se Tab. N:o 2.)

Hvartdera af de mellanvarande qvinqvenni-åren har folkmängdens belopp inom dessa 6 stånd och klasser, enligt de till Tabellverket ingångne uppgifterna, utgjort,

ibland	År 1820.	År 1825.	År 1830.	År 1835.
Ridderskap och Adeln . .	10,149	10,449	10,458	10,556
Läro-Ståndet	14,883	13,977	14,153	14,632
Ståndspersoner	65,003	72,422	70,091	67,101
Borgare-Ståndet	63,403	66,604	66,693	66,713
Bonde-Ståndet	1,864,272	2,067,375	2,168,915	2,239,918
Alla andra	566,980	540,425	557,772	626,519
Summa	2,584,690	2,771,252	2,888,082	3,025,439

Ehuruval, såsom redan är nämdt, folkmängds-tabell-formulärerna sedan år 1815 undergått flere förändringar, genom hvilka dels åtskilliga rubriker i läro-ståndet och bland ståndspersonerna blifvit omflyttade, och dels, samt isynnerhet inom *Bonde-ståndet*, en mera bestämd klassifikation än år 1815 blifvit vidtagen, till skilnad från klassen: *Alla Andra*, upplyses emedlertid af desse nu framlagde jemförelser, ej allenast, att den ofvan antydda folkmängds-tillökningen aldraförnämligast och med 29,9 procent uppstått inom de 2:ne sista af här ofvan upptagna klasserna; att inom *Läro-ståndet* såväl som ibland *Stånds-personerna* mankönet minskats med 6,2 procent; och att tillökningen bland qvinnokönet ibland dessa 2:ne klasser, sammanlagd med tillökningen af begge

[illegible]

Tab. 2.

År 1815.			År 1840.			Tillökningen eller Minskningen under dessa 25 år.		
m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
1396	1450	2846	1507	1538	3045	+ 111	+ 88	+ 199
2419	2415	4834	2266	2219	4485	— 153	— 196	— 349
11,808	11,869	23,677	8850	8958	17,808	— 2958	— 2911	— 5969
12,224	12,292	24,516	11,556	11,634	23,190	— 668	— 658	— 1326
317,109	317,641	634,750	371,768	372,371	744,139	+ 54,659	+ 54,730	+ 109,389
90,969	92,137	183,106	120,314	121,266	241,580	+ 29,345	+ 29,129	+ 58,474
435,925	437,804	873,729	516,261	517,986	1,034,247	+ 80,336	+ 80,182	+ 160,518
288	695	983	202	739	941	— 86	+ 44	— 42
214	1074	1288	195	1219	1414	— 19	+ 145	+ 126
1286	3896	5182	995	4377	5372	— 291	+ 481	+ 190
1211	4138	5349	1035	4899	5934	— 176	+ 761	+ 585
27,637	81,315	108,952	34,131	92,485	126,616	+ 6494	+ 11,170	+ 17,664
9537	39,453	48,990	12,957	46,598	59,555	+ 3420	+ 7145	+ 10,565
40,173	130,571	170,744	49,515	150,317	199,832	+ 9342	+ 19,746	+ 29,088
1452	1701	3153	1825	2124	3949	+ 373	+ 423	+ 796
1977	1835	3812	1858	2233	4091	— 119	+ 398	+ 279
8738	8212	16,950	10,396	12,113	22,509	+ 1658	+ 3901	+ 5559
6791	6634	13,425	8466	8323	16,789	+ 1675	+ 1689	+ 3364
225,800	243,212	469,012	298,405	297,485	595,890	+ 72,605	+ 54,273	+ 126,878
67,193	68,401	135,594	99,422	103,735	203,157	+ 32,229	+ 35,334	+ 67,563
311,951	329,995	641,946	420,372	426,013	846,385	+ 108,421	+ 96,018	+ 204,439
1351	1358	2709	1516	1618	3134	+ 165	+ 260	+ 425
2399	2340	4739	2422	2583	5005	+ 23	+ 243	+ 266
9780	10,528	20,308	9256	10,068	19,324	— 524	— 460	— 984
10,158	10,654	20,812	11,367	11,863	23,230	+ 1209	+ 1209	+ 2418
286,145	287,024	573,169	384,814	381,208	766,022	+ 98,669	+ 94,134	+ 192,853
79,085	77,825	156,910	120,906	120,802	241,708	+ 41,821	+ 42,977	+ 84,798
388,918	389,729	778,647	530,281	528,142	1,058,423	+ 141,363	+ 138,413	+ 279,776
4477	5204	9681	5050	6019	11,069	+ 573	+ 815	+ 1388
7009	7664	14,673	6741	8254	14,995	— 268	+ 590	+ 322
31,612	34,505	66,117	29,497	35,516	65,013	— 2115	+ 1011	— 1104
30,384	33,718	64,102	32,424	36,719	69,143	+ 2040	+ 3001	+ 5041
856,691	929,192	1,785,883	1,069,118	1,143,549	2,232,667	+ 222,427	+ 214,357	+ 446,784
246,794	277,816	524,610	353,599	392,401	746,000	+ 116,805	+ 114,585	+ 221,390
1,176,967	1,288,099	2,465,066	1,516,429	1,622,458	3,138,887	+ 339,462	+ 334,359	+ 673,821

(Inhäftas emot sid. 196).

Tab. 3.

Af 1840 Års Folkmängd		Ridder- skap och Adel.		Läro- och Präste- Ståndet.		Stånds- Personer.		Borgerskap.		Af Bonde-Ståndet.		Alla Andra.		Af Främ- mande Religion.	
		m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.
I Stockholms Län	{ på Landsbygden . . .	372	432	344	383	1109	1368	81	94	35,077	36,812	13,749	15,725	17	10
	{ i Städerne	20	24	21	25	170	237	688	875			1263	1382	1	
Upsala d:o	{ på Landsbygden . . .	129	146	316	371	607	1151	6	10	25,191	27,127	11,022	12,706		
	{ i Städerne	39	56	63	84	261	373	738	959			1698	2228	5	8
Södermanlands d:o	{ på Landsbygden . . .	223	248	240	320	872	1053	10	10	38,536	40,566	10,949	12,043	2	
	{ i Städerne	22	41	56	99	227	208	1378	1566			2983	3268		
Östergöthlands d:o	{ på Landsbygden . . .	306	335	447	508	1362	1588	205	162	67,514	71,049	19,620	21,734	11	7
	{ i Städerne	65	126	126	155	693	817	1445	1589			7172	9524	33	32
Jönköpings d:o	{ på Landsbygden . . .	247	341	345	390	682	902	87	79	57,424	61,085	10,569	11,149		
	{ i Städerne	74	130	15	32	223	281	938	853			1787	2844		
Kronobergs d:o	{ på Landsbygden . . .	196	240	206	277	449	526	72	64	48,806	52,231	7905	8140		
	{ i Wexjö	23	25	38	44	63	88	202	273			699	887		
Calmar d:o	{ på Landsbygden . . .	173	212	299	315	848	984	293	310	62,367	63,826	20,699	22,708	4	3
	{ i Städerne	21	39	54	96	229	287	1511	1394			3280	4599	2	4
Gottlands d:o	{ på Landsbygden . . .	38	36	130	163	268	335	91	105	12,543	12,939	5124	5644	2	
	{ i Wisby	14	11	28	21	69	78	369	554			1337	1676		
Blekinge d:o	{ på Landsbygden . . .	20	42	60	84	238	266	243	283	25,604	26,805	11,565	12,429	9	11
	{ i Städerne	112	161	33	67	1140	1752	1158	1459			6125	6078	30	33
Christianstads d:o	{ på Landsbygden . . .	140	174	229	299	812	920	352	413	64,660	67,418	12,048	11,717	26	12
	{ i Städerne	65	55	19	25	312	332	721	798			2283	2006	22	22
Malmöhus d:o	{ på Landsbygden . . .	160	149	331	394	900	996	466	439	82,314	83,125	12,798	12,104	11	3
	{ i Städerne	76	93	137	170	995	1159	2615	2933			9970	9308	14	10
Hallands d:o	{ på Landsbygden . . .	66	72	116	181	250	290	183	176	39,571	41,652	3142	2987	3	
	{ i Städerne	12	21	31	48	205	256	1165	1267			1346	1893	1	
Göteborgs d:o	{ på Landsbygden . . .	79	104	139	169	653	732	396	428	49,974	51,180	16,088	17,406	22	13
	{ i Städerne	162	132	80	105	1457	1458	2403	3039			8855	9437	215	248
Elfsborgs d:o	{ på Landsbygden . . .	192	248	312	363	856	1014	45	59	89,775	93,868	10,885	11,941	7	7
	{ i Städerne	42	42	33	32	311	426	1587	1248			2357	2968		
Skaraborgs d:o	{ på Landsbygden . . .	376	457	469	577	1062	1258	73	59	70,207	73,141	12,672	13,497	12	7
	{ i Städerne	46	109	82	102	255	392	712	843			2019	2619	1	1
Wärmelands d:o	{ på Landsbygden . . .	148	179	225	238	1044	1096	137	161	78,973	81,813	12,491	13,106		
	{ i Städerne	39	59	47	62	163	220	610	567			1808	2360		
Nerikes d:o	{ på Landsbygden . . .	138	143	172	184	606	648	33	29	46,224	48,346	10,315	11,504		
	{ i Städerne	30	26	40	56	265	354	724	934			1791	2486	10	3
Wästmanlands d:o	{ på Landsbygden . . .	144	175	253	301	610	701	18	14	26,694	29,415	10,944	12,913	10	7
	{ i Städerne	40	60	61	79	276	419	907	1064			3195	4194		
Kopparbergs d:o	{ på Landsbygden . . .	36	39	170	240	789	889	58	58	52,387	58,321	9102	10,332		
	{ i Städerne	8	12	32	31	194	210	372	459			1869	2533		
Gefleborgs d:o	{ på Landsbygden . . .	36	33	162	213	554	581	21	17	29,541	31,599	16,506	18,881		
	{ i Städerne	8	18	40	41	283	320	1491	1960			3448	4044		
Wäster-Norrlands d:o	{ på Landsbygden . . .	3	3	196	244	304	333	23	28	32,725	35,736	5714	6325	1	2
	{ i Städerne	7	13	49	54	93	105	919	1153			782	1063		
Jämtlands d:o	{ på Landsbygden . . .	24	16	111	134	225	271	14	9	18,172	19,015	3634	3681	2	2
	{ i Östersund	2	5	1	3	25	38	91	87			81	126		
Wästerbottens d:o	{ på Landsbygden . . .	28	40	108	121	270	297	34	36	20,717	21,313	6146	6785		
	{ i Umeå	6	3	4	4	72	84	207	209			272	408		
Norrbottnens d:o	{ på Landsbygden . . .	22	28	90	104	268	265	75	85	14,122	15,167	6677	7548	4	1
	{ i Städerne	7	12	9	12	63	71	326	350			646	815		
I Stockholms Stad		814	854	172	234	5815	7087	6131	7158			25,362	29,895	330	309
Så { på Landsbygden . . .		3296	3892	5470	6573	15,638	18,464	3016	3128	1,089,118	1,143,549	260,364	283,005	143	85
{ i Städerne		1754	2127	1271	1681	13,859	17,052	29,408	33,591			92,428	108,641	664	670
Summa Summarum		5050	6019	6741	8254	29,497	35,516	32,424	36,719	1,089,118	1,143,549	352,792	391,646	807	735

könen inom *Adeln* och *Borgare-ståndet*, deremot icke utgjort mera än 3,6 procent; utan ock, såsom en härtill i betydlig mån bidragande orsak, att giftermålens här nedan närmare ådagalagda ansehlige minskning egentligast igenfinnes bland *Ståndspersonerne*, samt äfven inom *Borgare-* och *Läro-ståndet*, dock till minsta beloppet i detta sistnämnda.

Hvad särskilt angår folkmängden vid 1840 års slut, har jag trott mig icke böra underlåta att på sätt som följer framlägga dess uppgifna fördelning nyss omformälte 6 klasser emellan, särskilt på landshygden, och särskilt såväl i Stockholms stad, som i städerna uti hvarje län af Riket. (Se Tab. N:o 3.)

Så långt olikheten i tabellformulärerna det vill medgifva får jag nu vidare ådagalägga *folkmängden* hvartdera såväl åren 1815 och 1840 som äfven, af skäl här nedan skola anföras, året 1825 till *Yrken och Näringar* m. m., på sätt som följer, nemligen:

År 1815.	<i>Af Mankönet.</i>	År 1840.	Förhållandet år 1825.
	Till Läro-Staten räknade:		
	Presterskap, <i>Professorer</i> och <i>Lärare</i> vid <i>Akademier</i> , <i>Gymnasier</i> och de <i>Publika Skolorna</i> samt <i>Akademier</i> och <i>Gymnasier</i> <i>Betjeningen</i>	4213	4244
3910 3753	Kyrko-Betjening	4190	3852
	Civil-Staten:		
	Embets- och Tjenstemän, högre och lägre, i verklig tjenst	3499	3565
4344			
12,007	Transport . . .	11,902	11,661

År 1815.		År 1840.	År 1825.
12,007	Transport . . .	11,902	11,661
955	Krono-Betjening på landet	1131	1112
	Bergs-, Skogs-, Tull- och Polis-		
	samt Sluss-, Bro-, Färje- och Dy-		
2207	keri-Betjening	2219	2262
	<i>Magistrats-Personer, hvilka icke</i>		
	<i>tillika äro Borgare, och derföre</i>		
	<i>icke under Borgerskapet inräk-</i>		
	<i>nade, samt Städernas enskilda</i>		
	<i>Tjenstemän</i>	527	500
	Medici, Djurläkare och Fält-		
391	skärer	459	381
	Vaktbetjening och Fångvak-		
1003	tare	1385	1438
	Militär-Staten:		
	Officerare, högre och lägre, <i>i verk-</i>		
1856	<i>lig tjenst</i>	1927	2199
	Under-Officerare, Ryttare och		
38,698	Soldater	27,886	30,651
	Till Flottan hörande Matroser,		
	Båtsmän och Skeppsgossar . .	7334	7418
847	Musicanter och Trumslagare . . .	1130	1097
1948	Profosser och öfrige gemenskapen	1895	2081
1122	Stadsvakter och <i>Gens d'armes</i> . .	453	
	Sjöfarande:		
	Kofferdi-skeppare och Ång-		
1802	båtsförare	1253	1109
	Båt- och Skut-skeppare	1356	954
6928	Sjömän på utrikes sjöfart . . .	4451	4165
	inrikes dito	2387	2226
686	Lotsar	763	721
19	Fyrbåksvaktare	28	19
70,469	Transport . . .	68,486	69,994

År 1815.		År 1840.	År 1825.
70,469	Transport . . .	68,486	69,994
	Handlande Borgerskap:		
5562	Husbönder	4353	5502
3094	Contorister och annan till handeln hörande Betjening	4561	3529
	Bruks- och Fabriks-idkare:		
4430	{ Egare deraf	2235	1398
	{ Mästare vid dem	5119	3501
21,495	Contorister och Arbets-betjening	25,527	22,625
	Konstnärer och Handtverkare:		
16,600	Mästare	17,691	18,424
21,556	Gesäller, Lärgossar, Verkdrängar och betjening vid handtverk . .	28,044	25,668
	Possessionater		
629	och Arrendatorer utan tjänst, (och utom Bondeståndet,) som sköta jordbruk	2430	1981
	Bergsmän, som tillika äga jordbruk	3513	4311
	Gästgifvare och krögare med jordbruk	2170	2083
	Studerande öfver 10 års ålder:		
3163	{ Vid Akademier 1294.		926
	{ Gymnasier 677.		
	Publike Sko- lor 5384.	7355	3389
	Private Skolor . 2532.	9887	
	Skolgossar under 10 år	12,552	
146,996	Transport . . .	186,618	163,331

År 1815.		År 1840.	År 1825.
146,998	Transport . . .	186,618	163,331
	Privatorum Betjening:		
26,748	Vid jordbruket till-		
	handagående	24,201	
	För annan uppässning	11,141	36,263
	Bondeståndet:		
147,971	Bönder på egna hemman	156,868	149,432
50,292	på andras dito	44,309	50,385
	<i>Bergs-skatte-Torpare</i>	2459	582
69,228	<i>Jord-Torpare</i>	88,364	81,394
	<i>Stat-Torpare</i>	14,154	9239
4299	Skärbönder, som lefva af fiske . .	3366	3509
3923	Nybyggare	2854	3991
40,863	Arbetsföre Backstugu- och Inhy-		
	ses-män	65,226	48,383
	Söner af Bönder, Båtsmän		
	och Torpare m. fl., som		
	åro i allmogens hus		
	och tjänst öfver 10 års		
277,466	ålder	412,671	306,662
989	Lapp-allmoge, som hafva renar . .	1008	931
	— dito — utan renar, kring-		
862	vandrande	914	990
	Diverse:		
	Jernbärare, Tornväktare, Rod-		
5487	dare och andra arbetskarlar i		
	städerna	10,143	6195
	Landtmän och Stadsboer, som icke		
3637	för något visst yrke äro anteck-		
	nade	4834	4210
778,763	Transport . . .	1,029,130	868,497

År 1815.		År 1840.	År 1825.
778,763	Transport . . .	1,029,130	868,497
	Afskedstagne:		
177	{ af Presterskapet	24	191
	{ af Läro-Staten och Kyr- kobetjeningen	104	
1262	af Civil-Staten	935	1066
14,746	af Militär-Staten	14,072	14,290
388	Sjömän, som upphört med sjöfart	454	586
	Handlande, samt Bruks- och Fa-		
	briks-iddkare, som upphört med		
	handel och rörelse samt handt-		
1880	verkare af lika egenskap	1746	2093
353	{ Afskedstagen dem tillhörande Be-	544	427
	{ tjening		
	{ Afskedstagen Privatorum Betje-	102	427
	{ ning		
40,162	Åldriga Bönder och Torpare, som	37,110	38,489
	upphört med jordbruk		
	Vanföra Backstugu-och		
	Inhysesshjon	14,321	
	Söner		
	öfver 10 års ålder vi-		
	stande hemma hos		
	sina föräldrar utan		
	antagen tjänst, yrke		
	eller näringsfång,		
	gifta	457	
	ogifta	16,687	
	Hos föräldrar hemma-vistande		
	gossebarn under 10 års		
	ålder	103,830	
311,835	Än hos allmoge och lapp-		
	hjon	256,122	
		359,952	376,051
1,149,566	Transport . . .	1,475,638	1,301,690

År 1815.		År 1840.	År 1825.
1,149,566	Transport . . .	1,475,638	1,301,690
	Hossina ogifta mödrar		
	hemma vistande gos-		
	sebarn, äldre och		
	yngre 7372.		
	Än dito af allmo-		
	gen och ibland		
	lapphjonen, d:o . 2319.	9691	
	Fattighjon,		
	Intagne i Fattighusinrättningar,		
	eller fattigdel åtnjutande	20,703	21,216
	Fader- och Moderlösa		
	samt fosterbarn upptagna af,		
26,541	eller inaccorderade hos		
	andra af församlingar-		
	ne, öfver 10 år gam-		
	la 1461.		
	under denna Ål-		
	der 5087.	6548	7219
	Fångar		
860	af mänskön	3042	1833
	I Riket bosatte		
	<i>Mosaiske Trosbekännare och de-</i>		
	<i>ras barn</i>	436	424
	<i>Utländningar med d:o</i>	371	588
1,176,967	Summa . . .	1,516,429	1,332,970
	Af Qvinnokönet:		
	Hustrur,		
	vistande hemma hos sina männer,		
	tillhörande:		
	Läro- och undervisnings-klassen		
5638	samt Kyrkobetjeningen	5815	5694
5638	Transport . . .	5815	5694

År 1815.		År 1840.	År 1825.
5638	Transport . . .	5815	5694
5508	Civilstaten	5738	5841
28,121	{ Militär- staten, { Officerarnes 837. Gemenska- pens 25,129.	25,966	30,824
5037	De Sjöfarandes	5036	4973
2473	{ Handels- } <i>Husböndernas</i> . 2741. klassen, } <i>Betjeningens</i> . . 216.	2957	4689
15,392	{ Bruks- och } <i>Egarnes</i> . . . 1763. Fabriks- } <i>Mästarnes</i> . . 4697. klassen, } <i>Betjeningens</i> 12,039.	18,499	1135
16,128	{ Handtverks } <i>Mästarnes</i> . 14,190. klassen, } <i>Betjeningens</i> 3425.	17,615	14,405
	<i>Possessionaters och Arrendato-</i> <i>rers med deras Betjening</i> . . .	14,962	14,648
321,966	Allmogens hustrur	385,551	3095
	<i>Lapphjonens d:o</i>	1151	23,318
28,981	{ Afskedstagne Embetsmäns afalla klasserne	13,111	363,420
	Privatorum betjentes	1818	1135
	Diverse personers	10,338	8954
	Till hos föräldrar hem- mavistande utan an- tagen tjenst eller yrke sig befinnande söner	457	
976	Hustrur, som sköta annat närings- fång än deras männer	301	686
1953	Hustrur, som lefva ensamme . . .	2400	2740
5631	{ Fattighjon och fattigdel åtnju- tande	5948	6888
	I fängelser	89	60
437,804	Transport . . .	517,752	492,760

År 1815.		År 1840.	År 1825.
437,804	Transport . . .	517,752	492,760
	<i>Hustrur af Mosaiska trosbekän-</i>		
	<i>nelsen</i>	112	118
	<i>af utländsk nation . . .</i>	122	187
	Enkor: *)		
	Ståndspersoners, som sköta landt-		
1562	bruk	818	1404
	{ Bergsmäns och allmoges, ännu		
47,457	idkande gårdsbruk	15,483	12,715
	Backstugu- och Inhy-		
	seshjon	33,681	—
	Enkor, som fortsätta sina aflidne		
	mäns handel, fabrik eller handt-		
1356	verk	1268	1838
10,629	Som lefva af egna medel	35,796	25,415
	{ <i>Arbetande och tjänande vid han-</i>		
34,952	<i>deln, fabriker eller handtverk</i>	812	} 45,356
	{ <i>Som i öfrigt lefva af arbete . .</i>	31,403	
	{ <i>I Privatorum tjänst lagstadde . .</i>	2427	7911
	<i>Lapphjons enkör</i>	326	369
34,615	{ <i>Fattighjon och fattigdel åtnju-</i>		
	<i>tande</i>	28,181	41,574
	<i>Fångar</i>	52	43
	<i>Enkor af Mosaiska trosbekän-</i>		
	<i>nelsen</i>	47	40
	<i>af utländsk nation . . .</i>	23	43
568,375	Transport . . .	668,303	629,773

*) För deras specifikation efter stånd, likasom för flere upplysningar, som äfven i de andra §§:ne skulle synas böra ur tabellverket kunna hämtas, ligger hindret i formulärets knappa utrymme, hvilket, om det skulle utsträckas öfver det

År 1815.		År 1840.	År 1825.
568,375	Transport . . .	668,303	629,773
	Ogifta qvinnor och flickebarn:		
	<i>Skrifna för landtbruk och gårds- skötsel</i>	862	364
3797	Som lefva af egna medel	5895	3952
1496	<i>Bod- och arbetsqvinno- vid han- dela, fabriker och handverk .</i>	2142	2868
14,569	Som bo för sig sjelfva och i öf- rigt lefva af sitt arbete	26,355	17,925
	Ståndspersoners och andras, ut- om allmogens, hos föräldrar hemma vistande döttrar		
105,728	{ öfver 15 år gamla	25,378	127,219
	{ deremellan och 10 år	17,531	
	{ under 10 år	90,518	
1653	Sällskapsfruntimmer	1642	1527
328	Guvernanter	399	322
3699	Hushållerskor	3646	3340
	Kammarjungfrur och pigor i pri- vatorum tjänst,		
	{ öfver 15 års ålder	65,667	71,781
	{ deremellan och 10 år	5312	
562,889	Bonddöttrar och pigor i allmo- gens hus och tjänst,		
	{ öfver 15 års ålder	279,071	205,678
	{ deremellan och 10 år	134,714	88,532
	{ under denna ålder	260,095	256,310
1,262,534	Transport . . .	1,587,530	1,409,591

nuvarande enda arket, skulle medföra en betydlig tillök-
ning i formulärupplagens trycknings-kostnad.

År 1815.		År 1840.	År 1825.
1,262,534	Transport . . .	1,587,530	1,409,591
	Lapphjonens döttrar öfver 10 år	905	} 1615
	under denna ålder	633	
	Hos ogifta mödrar		
	hemma vistande flie-		
	kebarn, äldre och		
	yngre 7604.		
	in ibland allmo-		
	gen och lapphjo-		
	nen d:o 2338.	9942	
25,565	Ogifta i Fattighus och fattigdel		
	åtnjutande	16,509	18,050
	Fader- och moderlösa		
	samt fosterbarn, upptagne af		
	eller inackorderade af		
	församlingarne hos an-		
	dra, öfver 10 år . . 1305.		
	under denna		
	ålder 4555.	5860	8076
	Fångar	628	371
	Ogifta kvinnor och barn af Mo-		
	saiska trosbekännelsen	316	276
	dito af utländsk nation	135	303
1,288,099	Summa	1,622,458	1,438,282

Genom de här ofvan mer omnämde olikheterna tabellformuläerna för åren 1815 och 1840 emellan, blifva resultaten af denna nu upptagne jämförelsen, icke allenast mot önskan ganska ofullständiga, utan öck måhända här och där rent af vilseledande, af hvilken orsak också det till tabellverket uppgifna förhållandet med folk-mängden till yrken och näringar året 1825, så

vidt ske kunnat, blifvit särskilt in margine af jämförelsen infördt. Men denna tillföring har ock skedd i afsigt, att desto tydligare ådagalägga angelägenheten af de, såväl år 1825 som år 1840, i formulärerna vidtagne hufvudsakligaste nya ändringar och föreskrifter, till närmare upplysning om hvilka jag också, i sjelfva contexten af rubrikerna, med *kursiv stil* sökt utmärka dem, som år 1825, och med **fet stil** dem, som år 1840 vidtogos, utvisande siffertalen nogsamt den verkan de medfört; hvaraf, till styrkande ytterligare af ändringarnes angelägenhet, här blott några exempel må anföras, såsom: uti civilstaten, embets- och tjenstemännens antal, hvilket här mot verkligheten vill synas efter 25 år förminskadt, men som härleder sig derifrån, att under det för året 1815 uppgifna antalet, äfven befunnits inbegripne de flere med blott karaktärsfullmakter försedda af denna klass, hvilket äfven gäller om flere andra rubriker, men i synnerhet possessionater på landet, som år 1815 endast med 629 beräknades; bland handlande borgerskapet, som år 1815 är uppgifvet utgöra 5562, hafva sannolikt många inberäknats, hvilka rätteligen bordt upptagas under fabriksidkarne; och den nära likhet i vissa omständigheter dessa sistnämde och handtverkarne emellan, såsom till exempel färgeri- och garfveridkare i den förra, och färgare och garfware i den sednare klassen, har föranlett en vid mer än 3000 tabellförfattandes olika åsigter temligen ursäktlig villrådighet, till hvilkendera afdelningen sådane personer rättast skolat hänföras, då tiden icke eller måhända medgifvit närmare efterfrågan till hvilkendera klassen individerne rättast borde hänföras. I anseende såväl härtill, som ifrån tabellverket flere gånger äskade, men till med-

delande omöjliga befunne upplysningar om rätta hela antalet i riket af fabrikanter, handverkare, men i synnerhet jordbrukare hafva, till ärnående deraf, ofvan omsförmälde under dessa 3 afdelningar ifrån sjelfva sammanräkningen af folkmängden helt och hållet afskilda noter väl redan i det för året 1840 gällande formuläret varit föreskrifne, men, af i underdåniga qvin-
 qvennii-berättelsen för samma år pag. 53 anförda förmodade orsaker, icke genast kommit till full verkställighet, såsom vederbordt; varande dock allt hopp, att denna sålunda ännu saknade upplysning genom de för året 1845 ingående qvin-
 qvennii-tabellerna skall vinnas.

Att nu här ytterligare utreda alla de, hufvudsakligast af rubrikernas omflyttning i olika §§ af formulärerna, uppkomne så i ögonen fallande olikheter sifvertalen desse tre åren emellan, skulle blott medföra en icke gagnande vidlyftighet; men såsom af denne jemförelse likväl ådagalagda säkra resultater, anser jag mig här böra förnäm-
 ligast anmärka de arbetsföre *Backstugu- och In-
 hysesmännens* sedan år 1815 så anseeligt ökade antal (åberopande i detta afseende hvad i 1840 års qvinqvenniiberättelse pag. 72 om såväl de arbetsföre som de vanföre ibland dem utförligare andragits), äfvensom den till pauperismens förökande onekligen bidragande omständigheten, att *stat-
 torparnes* antal, ensamt under de sist framflutne femton åren, är till mer än hälften förökadt. Önskligt hade det väl varit att här hafva kunnat fram-
 lägga de *verkliga* fattighjonens olika förhållande år 1815 emot år 1840, men formulärernas ofullständighet härutinnan förstnämde år har utgjordt ett desto mer öfvervinueligt hinder, som den tiden alla af förbehållet undantag hos egna barn eller hos andra inackorderade personer blefvo bland

fattighjonen inräknade, och ibland fattiga af qvinnokönet, icke allenast alla lapphjon och fångar, utan ock alla backstugu- och inhysesshjonen, utan åtskillnad af dem ibland dem, som likväl, utan egentligt behof af andras understöd, genom arbetsförtjenst ägde bergning och utkomst; hvadan en så fullständig utredning i afseende på fattighjonen, som på grund af de nya formulärerna i qvinqvennii-berättelsen för år 1840 pag. 75 finnes intagen, för den föregående tiden icke ens till någon approximativ visshet kan åstadkommas. Enda pålitliga jemförelsen åren 1815 och 1840 emellan, är i följande 2:ne i begge formulärerna lika beskaffade rubriker verkställbar, dock endast till personalet öfver 15 års ålder,

År 1815.		nemligen:	År 1840.	
m.	q.	i Fattighus, Lazaret-	m.	q.
1931.	7089.	ter och Hospitaler	2881.	8633.
9108.	24,312.	Fattigdel åtnjutande	11,475.	31,112.

Men förhållandet med ungdom och barn under 15 år i dessa delar kunde förut ingalunda utrönas.

Hvad angår *folkmängden till olikhet i ålder*, för anteckningen hvaraf 1815 års formulärer sedermera icke undergått någon förändring, bör nämnas, att ehuruval de årligen inkommande mortalitets-tabellerna innehålla en efter samma grunder, som de qvinqvennala, föreskrifven åldersklassifikation, är, såsom förmodas kunde, dock ingen kontroll af de sednare uppå de förra möjlig, i anseende till in- och utflyttningarne orterna emellan. Osäkerheten i uppgifterna härom oakadt, och då, såsom här ofvan redan är anfördt, desamma likväl bidragit till gagn vid Tontinberäkningar, har jag ansett min skyldighet fordra, att i bilagan litt. B. upptaga de summariska uppgifterna ej allenast för de 2:ne här till

jemförelse antagne, utan ock för de mellanvarande
 qvinqvenniåren. I följd af denna bilaga visar sig
 alltså personalet under de sista 25 åren vara ökad

	m.	q.	S:a.	Tillökningen i procent.		
				m.	q.	S:a.
i åldern under 1 år med	6911	6569	13,480	18,8	18,2	18,5
deremellan och 3 år . .	18,024	17,602	35,626	30,9	30,1	30,5
emellan 3 och 5	14,958	14,075	29,033	25,3	23,4	24,4
5 och 10	56,859	55,035	111,894	48,8	47,1	47,9
10 och 15	44,611	45,132	89,743	37,7	38,1	37,9
S:a . . .	141,363	138,413	279,776	36,3	35,5	35,9
emellan 15 och 20 år . .	53,005	52,996	106,001	46,2	45,8	46,0
20 och 25 . . .	28,102	23,814	51,916	26,4	20,7	23,5
25 och 30 . . .	25,487	19,568	45,055	28,0	19,3	23,4
30 och 35 . . .	14,284	8,384	22,668	17,4	9,0	12,8
35 och 40 . . .	14,712	12,987	27,699	18,6	14,9	16,7
40 och 45 . . .	24,325	21,573	45,898	38,3	29,0	33,6
45 och 50 . . .	18,687	19,607	38,294	31,1	28,3	29,8
50 och 55 . . .	6,422	9,305	15,727	11,7	14,4	13,1
55 och 60 . . .	3,309	5,450	8,759	7,3	9,7	8,5
S:a . . .	188,333	173,684	362,017	27,0	22,2	24,6
emellan 60 och 65 år . .	+4,712	+8,389	13,101	+12,2	+17,0	15,0
65 och 70	— 456	+1,809	1,353	— 1,8	+ 5,2	12,2
70 och 75	+2,499	+5,278	7,777	+16,2	+25,0	20,6
75 och 80	+2,304	+4,357	6,661	+30,6	+38,8	35,0
80 och 85	+ 563	+1,452	2,015	+17,3	+27,0	23,7
85 och 90	+ 145	+ 796	941	+15,3	+51,4	37,8
90 och 95	+ 4	+ 147	151	+ 2,5	+45,9	30,9
95 och 100	— 7	+ 36	29	—32,0	+125,0	57,0
öfver 100 år gamla . . .	+ 2	— 2	—	+66,0	—33,0	—
S:a . . .	9,766	22,262	32,028	10,8	18,1	14,9

Folkmängden året 1815.				Folkmängden året 1840.			Tillökningen eller minskningen i Folkmängden under dessa 25 åren.			Öfvervigten af Födde eller af Döde af hvarje könen i medeltal.	
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.		
418	558	976	Södertälje	510	646	1156	+	92	+	88	*) — 11,1
515	562	1077	Waxholm	485	436	921	—	30	—	126	— 12,5
374	442	816	Norrstälje	478	599	1077	+	104	+	157	— 0,9
324	376	700	Öregrund	263	329	592	—	61	—	47	— 1,6
220	280	500	Östhammar	256	305	561	+	36	+	25	— 0,7
156	217	373	Sigtuna	171	228	399	+	15	+	11	— 5,6
1935	2561	4496	Upsala	2225	2978	5203	+	290	+	417	— 34,7
532	655	1187	Enköping	579	730	1309	+	47	+	75	— 6,3
1097	1356	2453	Nyköping	1593	1893	3486	+	496	+	537	— 6,5
1089	857	1946	Eskilstuna	1764	1496	3266	+	675	+	639	— 4,8
453	609	1062	Strengnäs	437	690	1127	—	16	+	81	— 7,6
409	376	785	Mariefred	244	316	560	—	165	—	60	— 3,4
235	307	542	Thorshälla	245	351	596	+	10	+	44	— 3,3
223	235	458	Trosa	257	272	529	+	34	+	37	— 1,6
74	92	166	Malmköping	126	164	290	+	52	+	72	— 1,3
1406	1732	3138	Linköping	2063	2704	4767	+	657	+	972	— 3,4
4056	5275	9331	Norrköping	5798	7031	12,829	+	1742	+	1756	— 55,6
491	785	1276	Wadstena	774	1178	1952	+	283	+	393	— 15,4
349	508	857	Söderköping	448	697	1145	+	99	+	189	— 6,7
370	481	851	Skenninge	451	633	1084	+	81	+	152	— 2,4
1592	1831	3423	Jönköping	1989	2753	4742	+	397	+	922	— 7,5
475	620	1095	Eksjö	736	964	1700	+	261	+	344	— 8,8
236	300	536	Grenna	312	423	735	+	76	+	123	— 3,4
590	804	1394	Wexjö	1025	1317	2342	+	435	+	513	— 8,8
2029	2507	4536	Calmar	2608	3356	5964	+	579	+	849	— 4,1
1260	1593	2853	Wästervik	1584	1966	3550	+	324	+	373	— 3,2
419	566	985	Wimmerby	671	850	1521	+	252	+	284	— 6,9
1569	2044	3613	Borgholm	234	247	481	+	234	+	247	— 3,3
5770	6090	11,860	Wisby	1817	2340	4157	+	248	+	296	— 10,7
1771	2078	3849	Carlskrona	6113	6343	12,456	+	343	+	253	— 8,4
419	465	884	Carlshamn	1912	2496	4408	+	141	+	418	— 18,9
1595	1167	2762	Söllevitsborg	573	711	1284	+	154	+	246	— 10,7
409	439	848	Christianstad	2406	2134	4540	+	811	+	967	— 3,5
392	325	717	Cimbritshamn	498	548	1046	+	89	+	109	— 7,4
3423	3223	6651	Engelholm	518	556	1074	+	126	+	231	— 3,4
1578	1851	3429	Malmö	5463	4740	10,203	+	2035	+	1517	— 10,6
1498	1688	3186	Lund	2423	2841	5264	+	845	+	990	— 28,8
1072	1227	2299	Ystad	1974	2181	4155	+	476	+	493	— 26,8
1039	1143	2182	Landskrona	1948	1852	3800	+	876	+	625	— 17,6
273	292	565	Helsingborg	1582	1629	3211	+	543	+	486	— 17,8
88	93	181	Skasör	302	327	629	+	29	+	35	— 3,7
			Falsterbo	115	103	218	+	27	+	10	— 1,1
42,228	48,610	90,838	Transport	55,970	64,353	120,323	+	13,742	+	15,743	— 29,485

*) + betyder Nativitetens och — Mortalitetens öfvervigt.

Folkmängden året 1815.				Folkmängden året 1840.			Tillökningen eller minskningen i folkmängden under dessa 25 åren.			Öfverviken af Födde eller af Döde af håge könen i medeltal.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	
42,228	48,610	90,838	Transport	55,970	64,533	120,323	+ 13,742	+ 15,743	+ 29,485	
772	919	1691	Halmstad	1035	1222	2257	+ 263	+ 303	+ 566	+ 10,3
617	745	1362	Warberg	707	853	1660	+ 90	+ 208	+ 298	+ 4,8
382	463	845	Laholm	439	54	993	+ 57	+ 91	+ 148	+ 4,9
286	373	659	Falkenberg	370	49	862	+ 84	+ 119	+ 203	+ 4,9
201	235	436	Kungsbacka	209	264	473	+ 8	+ 29	+ 37	+ 1,0
10,770	11,018	21,788	Götheborg	10,138	10,883	21,021	— 632	— 135	— 767	— 72,3
1641	1909	3550	Uddevalla	1540	2036	3576	— 101	+ 127	+ 26	+ 10,1
684	816	1500	Strömstad	567	735	1302	— 117	— 81	— 198	+ 8,0
559	542	1101	Marstrand	588	355	943	+ 29	— 187	— 158	— 4,0
328	424	752	Kungälf	339	410	749	+ 11	— 14	— 3	— 1,8
863	1007	1870	Wennersborg	1234	1389	2623	+ 371	+ 382	+ 753	+ 5,4
831	1116	1947	Borås	1091	1287	2378	+ 260	+ 171	+ 431	— 4,1
535	558	1093	Åmål	649	801	1450	+ 114	+ 243	+ 357	+ 5,0
437	532	969	Alingsås	557	710	1267	+ 120	+ 178	+ 298	+ 2,9
376	398	774	Ulricæhamn	799	529	1328	+ 423	+ 131	+ 554	+ 3,6
549	691	1240	Mariæstad	676	933	1609	+ 127	+ 242	+ 369	— 3,0
680	872	1552	Lidköping	922	1159	2081	+ 242	+ 287	+ 529	+ 6,0
577	615	1192	Skara	700	938	1638	+ 123	+ 323	+ 446	+ 4,3
253	350	603	Sköfde	277	375	652	+ 24	+ 25	+ 49	+ 0,9
202	244	446	Fahlköping	260	326	586	+ 58	+ 82	+ 140	+ 0,7
168	250	438	Hjo	280	335	615	+ 92	+ 85	+ 177	— 0,5
1064	1309	2373	Carlsiad	1346	1762	3108	+ 282	+ 453	+ 735	— 11,1
621	717	1338	Christinæhamn	806	915	1721	+ 185	+ 198	+ 383	+ 3,6
236	315	551	Philipstad	515	591	1106	+ 279	+ 276	+ 555	+ 7,8
1451	1788	3239	Örebro	1791	2436	4227	+ 340	+ 648	+ 988	+ 0,8
348	454	802	Askersund	423	537	960	+ 75	+ 83	+ 158	+ 4,4
264	328	592	Linde	330	446	776	+ 66	+ 118	+ 184	+ 1,3
254	322	576	Nora	316	440	756	+ 62	+ 118	+ 180	+ 0,4
1262	1645	2907	Wästerås	1492	1922	3414	+ 230	+ 277	+ 507	— 34,6
943	1250	2193	Sala	1479	1906	3385	+ 536	+ 656	+ 1192	— 4,0
519	714	1233	Köping	641	842	1483	+ 122	+ 128	+ 250	— 1,4
649	872	1521	Arboga	867	1146	2013	+ 218	+ 274	+ 492	— 7,1
1731	2454	4185	Fahlun	1759	2402	4161	+ 28	— 52	— 24	— 12,6
224	290	514	Säther	264	286	552	+ 40	— 2	+ 38	+ 3,1
354	458	812	Hedemora	452	555	1007	+ 98	+ 97	+ 195	+ 3,3
2992	3603	6595	Gefle	3612	4525	8137	+ 620	+ 922	+ 1542	+ 6,4
728	881	1609	Hudiksvall	901	1025	1926	+ 173	+ 144	+ 317	+ 10,1
634	763	1397	Söderhamn	757	833	1590	+ 123	+ 70	+ 193	+ 1,0
807	973	1780	Hernösand	921	1242	2163	+ 114	+ 269	+ 383	+ 0,6
706	886	1592	Sundsvall	929	1146	2075	+ 223	+ 260	+ 483	+ 2,7
121	131	252	Östersund	200	259	459	+ 79	+ 129	+ 207	+ 5,0
484	596	1080	Umeå	561	708	1269	+ 77	+ 112	+ 189	+ 10,1
283	342	625	Piteå	531	641	1172	+ 248	+ 299	+ 547	+ 12,2
348	571	919	Luleå	520	619	1139	+ 172	+ 48	+ 220	+ 6,1
80,982	94,349	175,331	Summa	100,71	122,5	218,2	+ 23,876	+ 43,654		

Det är alltså i åldern emellan 5:te och 20:de året, som folkmängdens tillökning visar sig störst. Emellan 15:de och 20:de året är den i närmaste likhet begge könen emellan. Intill och med 45:te året är den större på mankönets, men ifrån samma intill högsta åldern deremot allt större och större på kvinnokönets sida.

Hvad *folkmängden i Rikets samtliga städer utom Stockholm* särskilt angår, har förhållandet under nu ifrågakvarande 25 år varit som följer, nemligen: (Se Tab. N:o 4).

Beträffande Götheborgs stad bör emedlertid anmärkas, att året 1815 räknades till dess folkmängd äfven en del af den nuvarande nära intill staden i Säfvedahls härad belägna Carl Johans församling, hvilken del den tiden kallades Mariebergs församling; men att, i följd af Landshöfdinge-Embetets den 15 December 1836 lemnade upplysning, hela Carl Johans församling numera hörer till landsbygden; hvadan, och om denna Mariebergs år 1815 till 3093 personer *) under Götheborg inräknade folkmängd verkligen varit en oriktighet, borde den för år 1815 här ofvan endast hafva varit upptagen med 18,695

*) Nemligen mankön 1405, deraf 22 räknades höra till Läro- och Civilstaten, 27 till handels-, 7 till fabriks- och 111 till handtverksklassen, 30 tjenstehjon, 10 afskedstagne, och utom 447 omyndige gossebarn utgjordes alla de öfrige 751 af skepps- och fält-timmermän samt arbetskarlar och verkdrängar, utan att någon enda af dem, såsom anteckningen å tabellen lyder, idkade jordbruk. Kvinnokönet upptaget med 1688, bestod af 548 gifta hustrur, 201 enkör, 475 ogifta öfver och 464 flickebarn under 15 års ålder. Inga anledningar förefunnos således år 1815 att betvifla riktigheten af Mariebergs församlings inräknande under Götheborgs stad.

personer; i hvilket fall staden alltså äfven, i stället för den antydde minskningen af 767 invånare, bör antagas hafva under de sista 25 åren vunnit en tillökning af 773 man- och 1553 qvinkön, eller tillsammans 2326 personer, utgörande en vinst af 112,4 procent, i stället för den upptagne förlusten af 72,3 procent.

Vid en 25-årig så beskaffad jemförelse som denne, bör ej eller såsom äfven ett hinder för kontrollers anställande på åldersuppgifterna lemnas oomnämndt det inflytande, som förändringen med i städerna förlagde garnisoner medfört, förekommande hufvudsakligast i Carlskrona, Malmö och Carlshamn, där Garnisonen år 1840 är mindre än 1815, och deremot i Christianstad, Landskrona, Helsingborg och Marstrand, där den år 1840 befinnes större än år 1815; men hvaraf ett närmare utredande, till alltför mycken vidlyftighets undvikande, här är utelemnadt.

Redan här ofvan är ådagalagdt, att Stockholms stad under denne 25-åriga period, genom mortalitetens ständiga och betydliga öfvervigt emot nativiteten, årligen förlorat 975 invånare, som vill säga 1,3 procent af sin numerär, hvilken förlust blefve än större, om ifrån nativiteten där skulle afräknas det likväl nu okända beloppet af de flertaliga där framfödde barnen af mödrar ifrån landsbygden, som för många orsaker, ensamt vid förlossningstiden, vistas i Stockholm. Fordom har man såsom orsak till denne stadens större mortalitet velat anföra klimatets osundare beskaffenhet, men af flere vetenskapsmän har den blifvit vederlagd, och klimatet där af dem tvertom blifvit ansedt sundare än i många andra folkrikare städer. Ehuru onekligt det måste va-

ra, att en större folkmängds sammanflyttning inom ett mindre utrymme, särdeles vid inträffande epidemier, såsom exempelvis vid cholerafarsoten år 1834, är till en större mortalitet medverkande, förekommer i detta afseende emedlertid högst anmärkningsvärdt, att i sjelfva Stockholms stad inom broarne, hvilken är tätast bebodd, och der osundheten i anseende till de många trånga gränderna synes böra antagas som störst, dödligheten likväl vanligast visar sig proportionellt mindre än på de mera glest, men ock, för lindrigare hyrors skull, talrikare af de fattiga bebodde malmarne, hvilket synes vara ett tydligt bevis, att pauperismen är en af de egentligaste orsakerna till Stockholms så stora mortalitet. Då de inflyttningar, hvaraf staden årligen förstärkes, till stor del består af personer, hvilka dels i såväl militär- som civilväg söka och vinna befordran, och dels göra sig förhoppning om större arbetsförtjenst och daglöner än i hemorten, hvilka alla vanligast sedan till dödsdagen här qvarstanna, och då äfven många familjer från landsorten, ofta med sin betjening, ambulatoriskt vistas i hufvudstaden just de månader af året, under hvilka sjukligheten där är störst; så medverka desse omständigheter, flere andra att förtiga, ofelbart betydligt på Stockholms så anseuiga mortalitet. Om derföre en möjlighet gäfves, att i Mortalitetssuppgifterna, de uti hufvustaden födde och uppfödde kunde behörigen afskiljas från dem, som först vid äldre år hitflyttat och sig bosatt, skulle ofelbart resultatet nöjaktigt häfva all vidare farhåga för därvarande klimats osundare beskaffenhet. Deremot torde ett yppigare lefnadssätt icke böra förnekas ett hufvudsakligt inflytande, men troligen då, mera genom ombyte af såväl

klädedrägt som lefnadssätt mot det hvarvid de inflyttande i hemorten förut sig vänt, än genom egentligt frosseri i mat och dryck, när man undantager brännvinsförtäringen och dryckeslasten, som onekligen där, mer än annorstädes i riket, betydligast bidrager till den större osedligheten, och utgör grundorsaken till pauperismen och till öfverklagade alltjemt ökade brott, såväl som till mångtaliga förförelser, för hvilka den ifrån landsbygden hitflyttande ungdomen, särdeles af arbets- och tjenstehjónsklassen, mest blottställes och merendels omsider blifva olyckliga offer.

Att Stockholm emedlertid icke är den enda staden i riket, som lidit af en lika beskaffad nära nog årlig mortalitets-öfvervigt, ådagaläggas af den här ofvan intagne jämförelsen, Tab. 4, i hvars sista kolumn årliga medium af flertaligheten under alla 25 åren antingen födde eller döde i hvar stad är antecknad, hvaraf de särdeles olika resultaten dem emellan synes förtjena särskilt uppmärksamhet. Härvid bör i första rummet likväl icke lemnas oanmärkt, hurusom, enligt den af Kongl. Tabell-Commissionen under den 12 Januari 1836 till Kongl. Maj:t i underdånighet afgifne särskilta utredningen och bilagan Litt. A. *) öfver de 12,637 personer — (hvaraf hufvudsakligast 3751 i Götheborgs och Elfsborgs, men i mer och mindre mån med 1260 i 16 af de öfriga länen, eller tillsammans 5011 på landsbygden) — som år 1834 föllo offer för den då så olyckligt härjande cholerafarsoten, Stockholm deri mistade 3665 och 31 af rikets öfriga städer 3961 personer af begge könen. Ibland desse sednare var antalet störst i Götheborg eller 1709, som då utgjorde hvar 11:te

*) Se Stats-Tidningen för år 1836 N:o 51.

person; i Jönköping 636 eller hvar 7:de; i Uddevalla 260 eller hvar 13:de, i Carlshamn 186 eller hvar 23:dje; i Wenersborg 138 eller hvar 18:de; i Carlstad 110 eller hvar 24:de; i Marstrand 78 eller hvar 12:te; i Westerås 72 eller hvar 47:de; i Alingsås 68 eller hvar 17:de; i Strömstad 64 eller hvar 22:dra; i Lidköping 51 eller hvar 37:de; i Åmål 41 eller hvar 34:de; i Borås 39 eller hvar 56:te; i Upsala 35 eller hvar 133:dje; i Skara 33 eller hvar 56:te; i Askersund äfven 33 eller hvar 25:te; i Wexiö 32 eller hvar 70:de; och i Kungsbacka 31 eller hvar 14:de person. I Wadstena uppgick väl antalet till 215, men hvarunder dock inbegripes länets där särskilt inrättade kurhus; och i de 12 öfrige af farsoten hemsökta städerna uppgick sammanräknade beloppet lyckligtvis endast till 130 personer. *) Dernäst förekommer anmärkningsvärdt, hurusom, på sätt en 1840 års underdåniga qvinquennii-berättelse under N:o 50 bifogad tabell närmare utvisar (med undantag af choleraåret 1834 i de ofvanuppräknade deraf svårast hemsökte städerna Jönköping, Götheborg, Marstrand, Uddevalla och Kungsbacka), både årliga nativiteten och mortaliteten under alla 25 åren varit sins. emellan i nära nog lika förhål-

*) Af landsbygden var, med undantag af Götheborgs och Elfsborgs län, den öfriga delen särdeles lyckligt förskonad ifrån epidemien, hvars belopp i det hela räknadt äfven lyckligtvis understeg antalet af, flere andra år, af vanligare farsoter i riket borttryckta personer; hvarförutan den försigtighet och det ordentligare lefnadssätt cholerasjukdomen föranledde, säkert hade ett betydligt inflytande på 1834 års i öfrigt allmänt lindrigare mortalitet såväl på landsbygden, som i städerna.

lande; men en så mycket större och särdeles uppmärksamhet förtjenar därför den genom of-
 van intagne jämförelse ådagalagde omständigheten,
 att i 10 läns-residens- samt 20 af de öfriga stä-
 derna de dödas antal, likasom i Stockholm, ge-
 menligen eller per medium räknadt finnes större
 än de föddes, då deremot i de öfrige 13 läns-
 residenserna, likasom i alla rikets återstående 43
 städer, nativiteten ägt öfvervigten. Till den för-
 ra kategorien höra Götheborg med en medii-förlust
 af 72, Upsala och Westerås 35 hvardera, Fah-
 lun 13, Carlstad 11, Mariestad och Carlskrona 8
 hvardera, Jönköping 7, Nyköping 6, Christian-
 stad 4, Norrköping 56, Wadstena 15, Waxholm
 13, Södertelje 11, Strengnäs 8, Arboga och Sö-
 derköping 7, Enköping och Sigtuna 6, Borås,
 Marstrand och Sala 4, Mariefred, Thorshälla och
 Westervik 3, Kongelf och Öregrund 2 samt Kö-
 ping, Norrtelje och Hjo 1 hvardera. - Till den
 sednare kategorien höra deremot Piteå med en
 medelvinst af 12 personer, Wisby och Malmö 11
 hvardera, Halmstad och Umeå 10 hvardera,
 Wexiö 9, Gefle 6, Wenersborg och Östersund 5
 hvardera, Calmar 4, Linköping 3, Örebro och
 Hernösand 1 hvardera, Lund 29, Ystad 27,
 Carlshamn 19, Helsingborg och Landskrona 18
 hvardera, Sölfvitsborg 11, Uddevalla och Hu-
 diksvall 10 hvardera, Ekesjö 9, Strömstad och
 Philipstad 8 hvardera, Cimbrishamn och Wim-
 merby 7 hvardera, Luleå och Lidköping 6 hvar-
 dera, Åmål, Laholm, Falkenberg, Eskilstuna och
 Warberg 5 hvardera, Askersund, Skara, Skanör,
 Ulricehamn och Christinehamn 4 hvardera, Gren-
 na, Engelholm, Borgholm, Hedemora, Säter,
 Alingsås och Sundsvall 3 hvardera, Skenninge
 och

och Trosa 2 hvardera, samt Malmköping, Linde Falsterbo, Kungsbacka, Söderhamn, Sköfde, Östhammar, Fablköping och Nora ungefärligen 1 hvardera.

I allmänhet synes af nu uppgifne förhållanden den slutsats kunna dragas, att dödligheten alltid är lindrigare i de vid hafskusten belägne städer, hvarifrån Carlskrona, Söderköping, Westervik och Öregrund här utgöra de enda undantagen. Med de vid de större insjöarne belägne städerna är deremot förhållandet märkbart olika, såsom till exempel: Wenersborg, Lidköping, Åmål, Askersund, Christinehamn och Grenna med nativitets öfverskott, jemförda mot Mariestad, Carlstad, Jönköping, Wadstena, Hjo, Westerås, Arboga, Strengnäs, Södertelje och Sigtuna, där mortaliteten deremot haft öfvervigten. Anmärkningsvärdast synes dock missförhållandet i Norrköping, hvars belägenhet, i såväl nyssnämde, som flere andra hänseenden likväl skulle synas vara bland de förmånligaste; samt likaså att Lund ägt ett nativitets öfverskott i medeltal af närmare 29 personer emot Christianstad, som, ehuru hafskusten närmare belägen, genom större mortalitet per medium lidit en förlust af emellan 3 och 4 inbyggare. I hvad mån klimatet, lefnadssättet eller pauperism må i mer eller mindre grad vara inverkan på de nu här antydde olikheter städerna emellan, är ett ämne, som vill synas högeligen förtjena en närmare och sakkunnigare undersökning, än den jag förmår åstadkomma, och skulle måhända derigenom flere helsoförstörande oseders afskaffande och än vidare förbättrade anstalter för helsovården i framtiden kunna påräknas.

Till ett någorlunda utredande af den närande eller födobringande folkenummers förhållande året 1840 till den så kallade tärande, har Bilagan litt. C. blifvit sammanfattad, hvilken tillika innefattar en summarisk öfversigt af alla här ofvan till yrken och näringar för samma år upptagne folkklasserna. Om man således till den förra, eller den närande klassen, vill räkna alla till jordbruket hörande och dermed egentligen sig sysselsättande personer, utan att deribland inräkna det ännu af omnämnda orsaker okända, men såsom skäl är att förhoppas innan kort tid här-efter bestämdt blifvande antalet tärande samhällsmedlemmar, hvilka i och för sina tjänster eller yrken äfven skulle såsom jordbrukare kunna anses; så utgör antalet af samma särskilt i bilagan sammanförda personer

med hustrur och barn . . .	m.	q.
1,081,679.	1,095,997,	
hvarifrån bör afräknas allmo-		
gens och andras barn un-		
der 10 års ålder upptag-		
ne med.	257,122.	260,728;

hvaremot barnen öfver denna ålder icke afräknas, af orsak att de, vid föräldrarnes sida, om ej redan vid en yngre, åtminstone efter 10 års ålder, kunna besörja hvarjehanda småsysslor, såsom ärenders uträttande, kreatursskötsel m. m., som eljest skulle borttaga äldres och de kraftigarens bättre använda tid;

så återstår den födobringande folkenummern med . .

824,557. 835,269.

Till den tärande höra deremot, ej allenast alla		
de i samma bilaga förut uppräknade klasserna		
med hustrur och de min-	m.	q.
deråriga barnen	425,059.	516,519,
jemte de här nyss afräknade	257,122.	260,728,
utan ock det å bilagan sist		
upptagna beklagligen så		
ansenliga antalet oäkta		
barn, som vistas hos sina		
ogifta mödrar	9,691.	9,942.

Då tärande folkennummern

uppgår till 691,872. 787,189,
 utgörande formulärernas betydliga olikhet år 1815
 en omöjlighet, att efter enahanda grunder upp-
 rätta för samma år någon hithörande säker jem-
 förelse.

Hvad de här ofvan upptagne *Lapphjonen* an-
 går, bör anmärkas, hvad uppgifvit blifvit, att
 deras antal svårligen tillförlitligt kan utrönas och
 uppgifvas, i anseende till deras nomadiska lefnads-
 sätt och deras i och för sina renhjordars föda osta-
 diga vistande ömsom inom Svenska och ömsom
 inom Norrska området, då prestbetyg vid hvarje
 sådan flyttning icke af dem uttages.

Hushållen

eller Matlagen i riket äro för året 1840 till antal och beskaffenhet uppgifne på sätt som följer, nemligen:

	Bestående af					Summan.	
	blott 2 per- soner.	af 3 till och med 5.	af 6 till och med 10.	af 11 till och med 15.	mera än 15 perso- ner.	I hela Riket.	Deraf i Stock- holm.
Sådane, som af egna till- gångar ägde mer, än som till deras uppehälle erfor- drades	4490	17,924	25,606	5078	1697	54,795	1979
som af egna medel eller arbete ägde sitt uppehälle. . .	44,352	177,774	135,059	9429	863	367,477	8674
som af egna medel eller arbete ägde en del af deras uppehälle	27,254	66,204	34,867	2039	107	130,471	2369
som för bristande arbetsförmåga el- ler egna tillgån- gar, helt och hål- let genom all- männa eller en- skiltas understöd och gåfvor för- sörjdes	13,159	14,559	5058	157	30	32,963	1308
S:a . . .	89,255	276,461	200,590	16,703	2697	585,706	14,321

Till antalet voro de under de 5 föregående
 qvinqvenniiperioderna uppgifne på följande sätt,
 nemligen

	Af blott 2 perso- ner.	Af 3 t. o. m. 5.	Af 6 t. o. m. 10.	Af 11 t. o. m. 15.	Mera än 15 perso- ner.	Summan	
						I hela Riket.	Deraf i Stock- holm.
År 1835	83,205	269,029	195,534	14,538	2284	564,590	14,164
1830	81,840	259,550	186,032	14,963	2339	544,724	14,017
1825	77,334	244,641	181,361	16,076	2643	522,055	14,436
1820	73,191	213,262	177,216	17,361	2115	483,145	13,281
1815	71,574	208,832	164,960	16,283	3216	464,865	13,444
Antalet finnes alltså under alla 25 åren, i följd af desse uppgif- ter, vara ökad med	17,681	67,629	35,630	420	519	Till- ök- ning.	Till- ök- ning.
men deremot i sista klassen för- minskadt med .						120,841	983

Såsom här ofvan redan är nämnt hafva for-
 mulärföreskrifterna om hushållens fördelande ef-
 ter bättre eller sämre vilkor trenne gånger un-
 der dessa 25 år undergått betydliga förändringar,
 hvarigenom i detta afseende ingen tillfredsstäl-
 lande jemförelse åren 1815 och 1840 emellan
 kan äga rum. Det förstnämnda året eller 1815
 uppgafs hushållens antal 464,865 emedlertid att
 bestå af, Förmögne 10,044.
 Behållne 143,634.
 Fattige 235,205.
 Utfattige 75,982.

Uppgifterna härutinnan hafva dock alltid berott och bero ännu på hvarje af de talrika tabellfattarnes enskilda åsigter; och huru olika och opålitliga de varit, eller till äfventyrs ännu äro, bevisar aldramest uppgiften i sist upptagne kategori, då det icke gerna kan antagas såsom möjligt, att 1815 års utfattiga hushåll, som synes synonymt med deras, hvilka år 1840 äro upptagne såsom helt och hållet beroende af andras gåfvor och understöd, kunnat under desse 25 åren hafva förminkats med icke mindre än 43,019, eller till mera än hälften af första årets uppgifna belopp. Vid omöjligheten af all slags säker kontroll härutinnan *), så inom, som utom tabellverket, lemnas det derhän, huruvida 1840 års uppgift i denna del, såsom det dock vill synas, må vara trovärdigare, än den för år 1815, som säkert varit öfverdrifven. Tillika bör anmärkas, att äfven i afseende på hushållens totala belopp, hvilkas tillökning dock synes i någorlunda förhållande till folkmängdens, icke eller någon kontroll, såsom lätt kunde förmodas, står att vinna af de giftas uppgifna nummerär, emedan många hushåll existera, där ingen enda gift person finnes, och på andra sidan åter många gifta personer icke äga egna hushåll, helst som numera, allmänna än förr, gifta ingå i årstjänst, oftast mannen på ett, och hustrun på annat ställe, på deras sida med beräknad större trygghet om flerårigt åtnjutande af husrum och bärsliga villkor, och på hushöndernes sida, mån-

*) Om sjelfva församlingstabellerne direkte i stället för blott prosterisammandragen inginge till Kongl. Commissionen, skulle man troligen, såväl härutinnan, som i många andra delar, lättare kunna komma förelöppande oriktigheter och misstag på spåren.

gen gång emot mindre öfverdrifna villkor än dem som af ogifta äskas, i förening med skäligt hopp om större ordentlighet i de gifta tjenstehjonens lefnadssätt. Hushållen torde ock på en och annan ort blifva undertaligare, dels genom sammanflyttning med barn eller andra, till undvikande af matlagspenningars erläggande, dels ock, genom isynnerhet skattehemmans klyfning i så små delar, att ägaren eller åboen icke gerna kan derå vara besutten, utan derigenom föranledes att taga någondera af nyss förut nämde utvägar för egen och de sinas bättre utkomst.

Ibland 1840 års folkmängd räknades följande beklägligen ganska stora antal vanlottade personer,

nemligen:	Under 15 års ålder.		Emellan 15 och 60 år.		Öfver 60 år gamla.		Summa.		
	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	S:a.
<i>Vansinniga . . .</i>	101	106	1265	1297	151	223	1517	1626	3143
<i>Blinda</i>	65	73	614	638	540	709	1219	1420	2639
<i>Döfstumma . . .</i>	216	168	796	722	49	48	1061	938	1999
<i>Döfstumma och Blinda tillika</i>	10	11	32	27	5	5	47	43	90
<i>Lytte och bräck- lige</i>	393	403	4235	4776	2479	3684	7109	8803	15,912
<i>Af ålderdom vanföre</i>	—	—	241	553	10,268	15,382	10,509	15,935	26,444
S:a . .	785	761	7183	8013	13,492	20,051	21,462	28,765	50,227

hvilka alla icke i någon barmhertighetsinrättning voro intagne, och icke eller härunder inbegripne så beskaffade personer i Stockholms stad, derifrån denne år 1840 genom de nya formulärerna för första gången infordrade uppgift icke med säkerhet närmare stått att vinna, än att antalet af

i institutet för blindas och döfstummas vid samma års slut intagna personer utgjorde 35 af män och 15 af kvinnokönet. Huruvida ofvan upptagna antal, hvaraf på landsbygden 47,545 och i provins-städerna 2682, under de sista 25 åren antingen ökats eller minskats, kan icke eller af tabellverket upplysas och utredas.

Då det nu återstår att för den här ifrågasvarande sist framflutne 25-åriga perioden utreda närmare förhållandet med de derunder ingångne äktenskap, samt nativiteten och mortaliteten, får jag i detta afseende bifoga följande ytterligare tabellutdrag, nemligen:

Litt. D, utvisande antalet deraf hvartdera året i hvarje län, i Stockholms stad och i hela riket, samt särskilt summariska årliga beloppet i hela riket både af de ökta födde i 3 lika beskaffade afdelningar, och af de dödfödde *).

Litt. E, antalet i hela riket af de ingångne giftermålen i den ena, och af barnaföderskorne till olikhet i åldern m. m. i den andra afdelningen, under hvardera qvinnii-perioden.

Litt. F, antalet födde äkta eller oäkta barn jemväl till månaden af året samt af dödfödde, dito,

Litt. G, likaså dödlighetens framfart särskilt bland gifta eller ogifta och barn, samt a tergo olikheterna i de dödas ålder.

Till undvikande af alltför mycken vidlyftighet, äro de 3 sistnämde bilagorne emedlertid inskränkte till särskilt upptagande endast af förhållandet i Stockholms stad; men i dem alla,

*) De dödfödde ensamt äro icke under någon af här förekommande nativitetssuppgifter inräknade.

är beloppet under hvardera qvinqvennii-perioden desto hellre specificeradt, som jag derigenom blifvit i tillfälle att kunna här tydligare ådäggas, hurusom den andra qvinqvenniiperioden eller åren 1821 med 1825 i alla nu nämnda hänseenden varit så anmärkningsvärdt förmånlig jemförelsevis mot de öfriga fyra, hvarvid jag ej eller bör lemna oomnämndt att icke eller tillförene någon så gynsam femårig period i det Svenska tabellverkets annaler kunnat igenfinnas. Vid denna så förmånliga period voro omkring 20 år framflutne ifrån det, då vaccinationen genom allvarliga författningar allmänneligen blef påbuden, och obestriddigt vill synas att denna så välgörande anstalt förnämligast bidragit till detta den andra periodens så lyckliga resultat såväl hvad nativiteten, som mortaliteten angår, ehuruval, oaktat vaccinationens alltjemt fortsatta allmännare begagnande, propagationen under de 3 efterföljande qvinqvennierne icke visat sig i den betydligare tillväxt, som nyssnämde lyckligare förhållande under 2:dra perioden gaf skälig anledning att förvänta. Vaccinationens emedlertid så betydliga inflytande äfven denna sednare tid skall här nedan närmare blifva ådagalagd. Vidare bör här icke förbigås, att under 1:a perioden voro åren 1816 till och med 1819 af en allmännare missväxt i riket hemsökta, hvaremot året 1820, som föregick nyss omnämde så lyckliga qvinqvennium var till skörden ett af de rikaste i Sverige, hvilken omständighet, jemte en förmånligare skörd äfven under de näst efterföljande åren, skulle synas gifva stöd åt en för längre tid tillbaka yttrad förmodan, att missväxter på säd gemenligen äro orsaken till en följande årets minskad propagation, eller ock tvertom; men ehuruval missväxtårs inflytelse, om ej på den pro-

duktiva kraften, åtminstone genom en sig dervid insmygande allmännare farhåga för antalets ökande af tärande medlemmar, icke må helt och hållet förnekas, kan dock icke ofvanberörde förmodan såsom en absolut slutföljd antagas, då på sätt den vid 1840 års qvinqvennii-berättelse under N:o 49 bilagde tabellen fullständigare utreder, af mer än 120 exempel på under sist framlupne 25-åriga period i åtskilliga län inträffade goda och ymniga skördeår, 35 likafullt det efterföljande förete mer eller mindre minskning i nativiteten.

Hvad angår i riket

Ingångne Äktenskap,

så har, i öfverenstämmelse med bilagan Litt. D, inom länen särskilt antalet varit störst följande år, nemligen:

1816 i Elfsborgs och Wästmanlands län,

1818 i Kronobergs län,

1822 i Stockholms, Upsala, Jönköpings, Malmöhus, Skaraborgs och Wärmelands län,

1823 i Östergöthlands, Calmare, Gottlands Nerrikes och Kopparbergs län samt i Stockholms stad,

1824 i Södermanlands län,

1827 i Västerbottens län,

1828 i Jämtlands län,

1829 i Gefleborgs, Väster-Norrlands och Norrbottens län,

1834 i Blekinge, Christianstads och Hallands, samt

1835 i Götheborgs län och i Stockholms stad till jemt lika antal som år 1823.

Redan häraf inhämtas giftermålens inträffade allmännare minskning under sista qvinqvennii-perioden, hvilket än närmare upplyses af följande resultat af bilagan för hela riket, nemligen:

Under 1:a perioden	utgjorde de i medeltal	21,590.
2:a d:o	d:o	23,772.
3:dje d:o	d:o	22,021.
4:de d:o	d:o	22,056.
5:te d:o	d:o	20,955.

Och således, ej allenast emot den andra meromnämde så ovanligt lyckliga perioden, utan ock emot den första samt tredje och fjerde, en immerfort gående förminskning i den sista till ett medii belopp af 635, oansedt den under alla 25 åren här ofvan ådagalagde folkmängdstillökningen af mer än 670,000 personer; i afseende hvarå en uti 1840 års underdåniga qvinqvennii-berättelse sid. 41 intagen fullständigare utredning åberopas, hvilken ytterligare upplyser, att under det sista qvinqvennium, jemfördt med det första, giftermålen endast i 6 län af riket, nemligen i Calmare, Wästerbottens, Östergöthlands, Södermanlands, Gefleborgs och Malmöhus samt i Stockholms stad varit flertaligare, men deremot i alla de öfriga 18 länen, och synnerligast i Nerikes, Skaraborgs, Jönköpings och Elfsborgs län förminskats.

Orsaken till detta betydliga missförhållande torde förnämligast igenfinnas i ett emot förra tider nu yppigare lefnadssätt, som föranleder billig farhåga för tillräcklig bergning och utkomst i det giftaståndet, men måhända också till lika om ej större del, i den tilltagande osedlighet, hvarigenom celibatet blifvit allmännare än förr, just inom de samhällsklasser, der en mera vårdad barna-uppföstran bör vara att förvänta, än den, som ändå af föräldra-pligt måste lemnas de numera talrikare födde oäkta barnen, om den, som ofta torde hända, icke helt och hållet åsidosattes.

I enlighet med bilagan Litt. E., första afdelningen, utgör mediitalet af de under alla 25 åren afslutade giftermålen

	I hela riket.	Deraf i Stockholm.
emellan förut ogifte	17,293	509
emellan enkling och ogift	2485	65
emellan ogift och enka	1531	58
emellan enkling och enka	770	16
Tillsammans . .	22,079	648.

Af hvilka giftermål de fleste ingåtts, i hela riket räknadt, i December, samt i Stockholm i Oktober, men varit fåtaligast, såväl där, som i det öfriga af riket i Augusti månad.

Genom med år 1831 vidtagen ändring i formuläret kunna numera de äktenskap fränskiljas, som årligen ingås i så olika ålder makarne emellan, att de böra såsom nästan alldeles ofrukt samma anses. Sålunda finnes i medeltaltal äktenskap ingångne, emellan, Åren 1831 med 1835. Åren 1836 med 1840.

434	{ Män, 25 år gamla och derunder }	med { hustrur af 35 till och med 50 års ålder }	387
33	dito d:o	med { hustrur öfver 50 år gamla }	22

66	{ Män emel- lan 25 och 35 år }	med dito d:o	48
----	--------------------------------------	--------------	----

115	{ Män emel- lan 35 och 50 år }	med dito d:o	91
-----	--------------------------------------	--------------	----

Äktenskap i hvilka både mannen och hustrun varit öfver 50 år

213	gamla	168.
860.	Summa	716.

Barna-

Barna-Föderskor

hafva, på grund af andra afdelningen af Bilagan Litt. E., i medeltal under alla 25 åren utgjort

	I hela riket.	Deraf i Stockholm.
Under 20 års ålder	1703	59
Emellan 20 och 25 d:o	14,268	542
25 och 30	24,467	820
30 och 35	24,583	692
35 och 40	18,572	437
40 och 45	9237	142
45 och 50	1426	14
Öfver 50 år	36	0,2.
S:a	94,292	2706.
Belöpande medeltalet af dem deribland, som nedkommit med tvillingar	1397	38
trillingar	21	0,88
fyrtingar	0,58	0,04
dödfödde barn	2706	125.

Anmärkningsvärdt är, att de med dödfödde nedkomnes antal immerfort ökats, så att detsamma under sista qvinquennium i hela riket räknadt med 681, och i Stockholm med 76, finnes större än under den första perioden.

Tabellerna frånskilja icke de gifta mödrarne ifrån de ogifta, emedan, i följd af Kongl. Förordningen af den 17 October 1778, de sednare böra förblifva okända så till stånd, som antal, i anseende hvartill, då denna föreskrift ännu är gällande, ingen annan utväg finnes till de förras beräknande emot de sednare än proportionen emellan de äkta och oäkta barnens årliga belopp, i mån af hvilkas här nedan närmare utredda antal, af ofvannämde 94,292 mödrar, de gifta barna-

föderskorna vill synas hafva utgjort per medium 87,958 och de ogifta således 6,334, hvilket ock från rätta förhållandet föga torde afvika. Med antagande häraf, och vid jemforelse alltså emot medeltalet af de gifta hustrurne och af de ogifta kvinnorna och pigorna åren 1815 och 1840, det förre utgörande 477,895 och det sednare 378,004, befinnes, under denne 25-åriga period, 10 gifta hustrur bland 54, och 1 ogift ibland ungefärligen 60, årligen hafva kommit i barnsäng, i hela riket räknadt.

Göres jemforelsen ytterligare emellan barnaföderskornes olikhet i åldern emot hela kvinnokönet, så befinnes af

Medeltalet
kvinnor.

142,068	emellan 15 o. 20 år	10 hafva födt barn ibland	834
127,058	emellan 20 o. 25 d:o		89
111,250	emellan 25 o. 30 d:o		45
97,405	emellan 30 o. 35 d:o		40
93,320	emellan 35 o. 40 d:o		50
83,961	emellan 40 o. 45 d:o		91
78,625	emellan 45 o. 50 d:o		551
62,750	emellan 50 o. 60 d:o		17,431.

Nativiteten

befinnes i enlighet med Bilagan Litt. D. inom hvarje län foljande år hafva uppnått högsta numerären, nemligen:

1825 i Upsala, Södermanlands, Götteborgs och Wästmanlands län, samt genom denne merhet äfven öfver hela riket räknadt;

1828 i Wästerbottens län;

1829 i Jönköpings, Skaraborgs, Nerrikes och Kopparbergs län;

1833 i Stockholms, Gottlands; Elfsborgs och Wästmanlands län;

1834 i Östergöthlands och Hallands län;
 1835 i Gefleborgs, Väster-Norrlands, Jämtlands
 och Norrbottens län; samt
 1840 eller periodens sista år, då den likväl i na-
 turlig ordning bordt öfver allt finnas störst,
 sålunda endast i Kronobergs, Calmare, Ble-
 kinge, Christianstads och Malmöhus län
 samt i Stockholms stad.

Under hela 25-åriga perioden utgör, i följd
 af Bilagan Litt. F., medeltalet af de födde

	I hela riket.			Deraf i Stockholm ensamt.		
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
Äkta barn .	44,427,9	42,432,5	86,860,4	815,5	778,7	1594,2
Oäkta. . . .	3185,7	3069,5	6255,2	511,9	511,5	1023,4
S:a . . .	47,613,6	45,502,0	93,115,6	1327,4	1290,2	2617,6

af hvilket antal finnes vara

Födde	I hela riket.			Deraf i Stockholm ensamt.			Aflade
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	
i Januari	4288	4106	8394	115	113	228	i April
Februari	3844	3693	7537	105	104	209	Maj
Mars	4233	4051	8284	119	117	236	Juni
April	3917	3758	7675	111	109	220	Juli
Maj	3829	3682	7511	111	105	216	Augusti
Juni	3555	3415	6970	106	99	205	September
Juli	3630	3457	7087	104	104	208	October
Augusti	3719	3503	7222	106	105	211	November
September	4404	4177	8581	111	108	219	December
October	4148	3970	8118	115	115	230	Januari
November	3884	3715	7599	109	105	214	Februari
December	4162	3975	8137	115	106	221	Mars

Af detta allt visar sig således att fortfarande, ärligen födas flere gosse- än flickebarn; och att fruktsamheten varit störst, i hela riket i September och i Stockholm i Mars; men deremot minst, äfven i Stockholm, i Juni månad.

Af ofvan upptagne medeltal födde barn, utgjorde antalet

	Äkta.	Oäkta.
i Stockholm	1594	1023
i de öfriga städerna	4926	930
samt på landsbygden	80,340	4302.

S:a . . . 86,860 6255.

Desse oäkta barns proportion till de födde har varit per medium,

	I Stockholm.	I öfriga städerna.	På landsbygden.	I hela riket.
Under 1:sta period.	som 1 till 2,72	som 1 till 6,3	som 1 till 18,8	som 1 till 14,5
2:dra d:o	„ 1 „ 2,25	„ 1 „ 6,1	„ 1 „ 18,4	„ 1 „ 13,3
3:dje d:o	„ 1 „ 2,68	„ 1 „ 6,6	„ 1 „ 21,3	„ 1 „ 16,0
4:de d:o	„ 1 „ 2,50	„ 1 „ 6,1	„ 1 „ 20,5	„ 1 „ 15,5
5:te d:o	„ 1 „ 2,38	„ 1 „ 5,9	„ 1 „ 19,6	„ 1 „ 14,5
och under alla 25 åren	„ 1 „ 2,56	„ 1 „ 6,2	„ 1 „ 19,7	„ 1 „ 14,9

De år då minsta antalet oäkta barn blefvo framfödde voro i Stockholm året 1820, i de öfriga städerna sammanräknade året 1819, på landsbygden året 1818, och öfver hela riket året 1832. Största antalet åter visar sig deremot öfver allt under året 1840.

Dödfödde,

hvilka under nyssberörde nativitet icke äro inbegripne, finnas till talrikheten hvarje år, i hela riket räknadt, specificerade i slutet af Bilagan Litt. D.;

och har deras antal, i öfverensstämmelse med hvad om de med sådane barn nedkomne mödrarne redan här ofvan är visadt, allt mer och mer ökats, så att, i enlighet med anteckningen a tergo å Bilagan Litt. F., beloppet utgjort per medium

under	I Stock- holm.	Öfrige städer.	Pålands- bygden.	I hela riket.
1:sta perioden	84,0	176,6	1886,8	2147,4
2:dra d:o	111,2	163,6	2257,2	2532,0
3:dje d:o	124,8	178,8	2289,4	2593,0
4:de d:o	149,2	195,4	2530,6	2875,2
5:te d:o	174,2	241,8	2531,0	2937,0
S:a	643,4	946,2	11,495,0	13,084,6
Och således under alla 25 åren i medeltal	128,7	189,2	2299,0	2616,9
Utom dödfödde tvillingar, trillingar och fyrlingar, ut- görande i lika medeltal särskilt				89,1

Men en särdeles olikhet städerna och landsbygden emellan har härvid, genom sist vidtagen ändring i formuläret, blifvit upptäckt, hvad angår de af äkta eller oäkta säng dödfödde, hvilken olikhet dock blott för de två sista qvinvennierna är upplyst, och således, utan kännedom om förhållandet härutinnan den föregående tiden, är befunnen vara

nemligen:	I medeltal.			
	Åren 1831- med 1835.		Åren 1836 med 1840.	
	Äkta.	Oäkta.	Äkta.	Oäkta.
i Stockholms stad, dödfödde	74,6	74,6	78,2	96,0
i öfrige städerna d:o	148,1	46,8	175,8	56,0
på landsbygden d:o	2253,4	277,2	2271,0	260,0

utvisande således hurusom, då ett ungefärligt lika antal af både äkta och oäkta säng blifvit döde födde i Stockholms stad, har deremot i de öfrige städerna de sednares belopp uppgått till blott tredje delen, och på landsbygden till endast 12:te delen af de förras antal, till hvilken anmärkningsvärda skiljaktighet orsaken af ingen ibland tabellförfattarne blifvit anford, likasom den torde vara ganska svår att säkert utfinna.

Mortaliteten

finnes enligt bilagan Litt. D. inom hvarje län följande år hafva varit

lindrigast

- 1816 i Calmare, Christianstads, Malmöhus och Elfsborgs län;
- 1817 i Västerbottens län;
- 1820 i Kronobergs och Kopparbergs län;
- 1821 i Gottlands och Norrbottens län;
- 1822 i Hallands län;
- 1823 i Väster-Norrlands län;
- 1824 i Uplands, Södermanlands, Östergöthlands, Blekinge, Nerrikes och Gefleborgs län;
- 1825 i Jönköpings, Wärmelands, Wästmanlands och Jämtlands län; samt
- 1835 i Stockholms både stad och län, i Göteborgs och Skaraborgs län äfvensom i hela Riket räknad;

men deremot störst

- 1819 i Jönköpings och Wärmelands län;
- 1828 i Södermanlands, Östergöthlands och Blekinge län;
- 1829 i Stockholms, Uplands, Kronobergs, Calmare, Christianstads och Skaraborgs län, samt i hela riket räknad,

1831 i Malmöhus och Hallands län;

1834 hufvudsakligast genom kolera-farsoten i Stockholms stad samt Göteborgs och Elfsborgs län;

1837 i Väster-Norrlands län;

1838 i Nerikes och Västerbottens län, samt

1839 i Kopparbergs, Västmanlands, Gefleborgs, Jämtlands och Norrbottens län.

Häraf inhämtas således att, då kolera-året 1834 undantages, många äfven svårare mortalitets-år, såväl inom länen särskilt, som öfver hela riket beräknadt, förefunnits; och med enahanda undantag befinnes dödligheten störst i Stockholms stad året 1829, i Göteborgs län året 1831, och i Elfsborgs län år 1837. Merheten döde genom kolera-epidemien ensamt året 1834 uppgick i Stockholm till 2571, och i Elfsborgs län till 791, men i Göteborgs län ända till 3023 personer.

Oberäknadt de dödfödde, belöper i följd af bilagan Litt. G., mortaliteten under alla 25 åren i medeltal:

ibland	I hela riket.			Hvaraf i Stockholms stad ensamt.		
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
Barn under 1 år, äkta .	7660,1	6265,4	13,925,5	201,7	172,4	374,1
oäkta .	937,4	836,4	1773,8	223,9	207,2	431,1
Barn deremellan och 15 år	5996,2	5551,5	11,547,7	228,9	209,5	438,4
Ogifta öfver 15 år	4178,6	3814,6	7993,2	659,7	377,0	1036,7
Gifta	11,013,8	7687,8	18,701,6	481,7	248,4	730,1
Enklingar och enkör . .	3842,4	8158,6	12,001,0	140,5	422,9	563,4
Summa . . .	33,628,5	32,314,3	65,942,8	1936,4	1637,4	3573,8

och till olikhet i åldern:	I hela riket.			Hvaraf i Stockholms stad ensamt.		
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
Under 1 år	8597,5	7101,8	15,699,3	425,6	379,0	805,2
Emellan 1 och 3 år . . .	2958,6	2697,0	5655,6	114,8	107,1	221,9
3 o. 5	1130,8	1073,9	2204,7	44,1	43,4	87,5
5 o. 10	1233,8	1143,8	2377,6	47,4	39,8	87,2
10 o. 15	672,9	636,8	1309,7	22,7	19,1	41,8
15 o. 20	675,2	670,8	1346,0	40,5	26,0	66,5
20 o. 25	923,5	780,0	1703,5	92,6	48,9	141,5
25 o. 30	1011,5	846,0	1857,5	142,0	69,6	211,6
30 o. 35	1128,8	953,0	2081,8	178,9	78,7	257,6
35 o. 40	1235,0	1062,2	2297,2	166,8	87,5	254,3
40 o. 45	1364,0	1140,7	2504,7	148,5	88,2	236,7
45 o. 50	1391,7	1122,3	2514,0	119,9	89,9	209,8
50 o. 55	1533,8	1323,7	2857,5	101,9	90,0	191,9
55 o. 60	1604,7	1507,2	3111,9	76,2	84,4	160,6
60 o. 65	1803,7	1897,5	3701,2	69,0	93,4	162,4
65 o. 70	1833,8	2135,8	3969,6	48,4	93,3	141,7
70 o. 75	1830,2	2296,8	4127,0	35,8	80,5	116,3
75 o. 80	1409,4	1906,0	3315,4	20,8	58,9	79,7
80 o. 85	855,1	1277,1	2132,2	10,6	32,0	42,6
85 o. 90	326,8	559,7	886,5	3,9	15,2	19,1
90 o. 95	71,0	145,5	216,5	1,0	3,6	4,6
95 o. 100	11,0	26,3	37,3	0,3	1,0	1,3
öfver 100 år	1,1	3,3	4,4	—	0,2	0,2
*) Summa . . .	33,603,9	32,307,2	65,911,1	1911,7	1630,3	3542,0

*) Skillnaden emellan denna och ofvanupptagna medii-summa härrör ifrån de här uteslutne politiken i i Stockholm, som till dödsåldern icke kunnat specifikt uppgifvas.

af hvilken mortalitet be-
loppet utgjort

	I hela riket.			Deraf i Stockholms stad ensamt.		
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
i Januari månad	3210,0	3133,2	6343,2	153,6	141,4	295,0
Februari	2977,0	2902,7	5879,7	136,2	122,8	259,0
Mars	3322,0	3247,5	6569,5	157,8	133,8	291,6
April	3335,1	3227,5	6562,6	170,1	147,7	317,8
Maj	3153,7	2998,0	6151,7	179,9	139,3	319,2
Juni	2605,3	2393,7	4999,0	158,9	120,7	279,6
Juli	2328,4	2161,3	4489,7	151,9	127,3	279,2
Augusti	2468,6	2329,2	4797,8	162,8	136,2	299,0
September	2359,8	2276,3	4636,1	210,4	194,8	405,2
October	2389,6	2304,4	4694,0	142,7	121,2	263,9
November	2574,5	2527,9	5102,4	141,2	118,2	259,4
December	2879,9	2805,5	5685,4	146,2	126,9	273,1

Särdeles tillfredsställande är, hvad af den första bland desse tre jemförelser upplyses, att ehuru, sedan år 1815, barnens antal under 1 års ålder år 1840 finnes ökadt med 13,430, och deras emellan 1 och 5 år med 64,659, är dock dödligheten under det sista qvinquennium, jemförd mot första 5-års perioden, icke förökad med mera än 727 årligen ibland de förra och med 160 ibland de sednare. Deremot befinnes mortaliteten i de öfrige här ofvan afskilde klasserna immerfort med den stigande folkmängden i tilltagande, synnerligast ibland de gifta männerna och ibland enkorna.

I allmänhet är qvinnokönet hårdigare att emotstå dödligheten, som ända intill 60:de året å deras vanligast är mindre än å mankönets sida, men efter hvilket ålders-år den å qvinnkönets proportionaliter allt mer förökas. Öfver hela riket har mortaliteten visat sig störst i Mars och

April eller öfvergångsmånaderna från vinter till vår, samt minst i Juni månad. Då kolera-året 1834 undantages, har deremot i Stockholm dödligheten vanligast varit störst i Maj, men lindrigast i Februari och November.

Af de uppgifter, som enligt hvad ofvan är anfördt fortfarande från rikets presterskap inkommit å årligen i barnsbörd, af smittkoppor eller genom olyckshändelser inträffade dödsfall, utgör bilagan Litt. H. ett sammandrag af beloppet under ifrågavarande 25 år, utvisande att medeltalet årligen varit i hela riket:

I barnsbörd och af missfall borttryckte mödrar 590.

Härvid bör icke förbigås, att antalet af dem under de sista 10 åren befinnes betydligt allt mer och mer förminskadt, såsom innebärande ett säkert bevis å i detta afseende vidtagne omsorgsfullare anstalter.

I smittkoppor finnes af begge könen afledne årligen ett antal af 556.

Enligt den närmare utredning i detta ämne, som under den 17 Februari 1825 uti en då sammandragen tabell *) till Kongl. Majt i underdånighet blifvit afgifven, hade antalet af de i Sverige ensamt, och Finland således oberäknadt, i kopporne antecknade dödsfall under åren 1791 med år 1815 utgjort tillsammans 63,914 eller per medium 2557, hvaraf således sig visar, att vaccinationen under den sista 25-åriga perioden inverkat till en årlig besparing häre af 2001 menniskolif emot den föregående.

*) Bilagd Post- och Inrikes-Tidningen N:o 205 för samma år.

Af olyckshändelser

finnes de drunknades antal vara, såsom gemen-
ligen alltid, störst, och har uppgått per
medium till 848,8 af man- och 161,0 af
qvinnekönet, tillsammans 1001,80.

Dernäst förekomma barn, qväfde genom
mödrars eller ammors oförsigtighet,
hvarvid likväl såsom bilagan Litt.
H. utvisar, följande anmärknings-
värda olikheter alltjemt härutinnan
inträffat länen emellan, utgörande
medeltalet

i Wärmelands län årligen . .	51,24
Calmare d:o	44,68
Kronobergs d:o	35,88
Jönköpings d:o	34,52
Skaraborgs d:o	32,52
Östergöthlands d:o	26,16
Elfsborgs d:o	23,36
Christianstads d:o	17,56
Malmöhus d:o	13,80
Hallands d:o	11,92
Blekinge d:o	11,52
Götheborgs d:o	6,96
Uppsala d:o	6,72
Kopparbergs d:o	6,24
Wästmanlands d:o	5,60
Stockholms d:o	4,76
Nerikes d:o	4,44
Gesleborgs d:o	2,04
Södermanlands d:o	1,76
Jämtlands d:o	1,28
Wäster-Norrlands d:o	1,00
Wästerbottens d:o	0,40

Transport 344,36 1001,80.

Transport 344,³⁶ 1001,⁸⁰.

i Norrbottens län årligen . .	0,32	
Gottlands d:o	0,20	
och i Stockholms stad	0,36.	345, ²⁴ .

Af den här förekommande betydliga och årligen jemt fortfarande större differensen i de 10 först uppräknade, mot de efterföljande öfriga länen, vill synas, som skulle några olika sedvanor orterna emellan härtill vara den förnämsta orsaken.

	m.	q.	
Barnamord i medeltal . . .	6,52	4,48=	11,00.
Mördade äldre personer . .	28,28	6,76=	35,04.
Sjelfmördare	132,28	33,28=	165,56.
Döde af starka drycker . .	36,64	2,72=	39,36.
Ihjälfrusne	56,64	13,12=	69,76.
Krossade af fall och utvär-			
tes skador	267,24	42,88=	310,12.
Ihjälosade	19,80	10,16=	29,96.
Ihjälslagne af åskan	5,76	3,88=	9,64.
Af förgift vådligen omkomne	3,44	2,56=	6,00.
Af andra till stor del okän-			
da olyckshändelser . .	151,16	76,00=	227,16.
Och då man härtill lägger			
de i tabellformulärerna			
till denna rubrik räk-			
nade, i följd af laga			
domar aflifvade	9,56	1,88=	11,44.

Uppgår årliga medeltalet af de förmedelst olyckshändelser timade och uppgifne dödsfallen tillsammans till 2262.

Vid beräkning af folkmängdens medeltal åren 1815 och 1840, som utgör

	m.	q.	S:a.
Barn under 1 år	40,288.	39,188.	79,476.
Ungdom deröfver till och med 15 år	419,312.	419,747.	839,059.
Ogifta öfver denna ålder	366,161.	378,004.	744,165.
Gifta personer . .	476,093.	477,895.	953,988.
Enklingar och Enkor	44,844.	140,444.	185,288.


*) Tillsammans 1,346,698. 1,455,273. 2,801,976
och med tillämpning af hvad i denna berättelse sålunda blifvit anfördt, uppkommer följande

Resumé:

Gossebarnens under 1 år proportion till hela
mankönet förhåller sig . . . som 10 till 334.
Flickebarnens d:otill qvinnokönet som 10 till 371.
Af ungdomen emellan 1 och 15
års ålder, gossarnes till man-
könet som 100 till 321.
flickornes till qvin-
nokönet . . . som 100 till 347.
Ogifta män öfver 15 år till man-
könet som 100 till 368.

*) Mankönets så betydliga undervigt mot qvinnokönet, oaktadt den flertaligare nativiteten gosse- än flickebarn, härleder sig från den större mortalitet, för hvilken mannen, mera än qvinnan, efter sitt inträde i verksamhetsåldern, är blottställd, genom i allmänhet tyngre arbete, samt ett för faror, vedermödor och sorger oftare utsatt, men tvifvelsutan också, till icke obetydlig del, mindre ordentligt lefnadssätt.

Ogifta qvinnornas d:o till qvinnokönet	som 100 till 385.
Gifta männernas till mankönet	som 100 till 283.
Gifta hustrurnas till qvinnokönet	som 100 till 305.
Enklingarnes till mankönet	som 10 till 300.
Enkornes till qvinnokönet	som 10 till 104.
De föddes proportion till hela folkmängden	som 10 till 301.
De födde äkta barnens till de gifta hustrurne	som 10 till 55.
De födde oäkta barnens till de ogifta qvinnorne öfver 15 års ålder	som 10 till 604.
De dödes proportion till hela folkmängden	som 10 till 425.
De dödes till de födde	som 100 till 141.
Dödes i första ålders året till de födde äkta barnens	som 100 till 16.
oäkta barnens	som 100 till 28.
Ungefärligen hvar 6:te hustru välsignad med lifsfrukt	
Hvar 68:de barnaföderska nedkommen årligen	med tvillingar.
Hvar 4490:de d:o	med trillingar.
Hvar 160:de d:o	död i barnsäng.
Efter dag räknadt utgör antalet	I hela riket. Deraf i Stockholm.
Födde äkta barn	238 4,4
oäkta d:o	17 255. 2,8 7,2.
Döde	181 9,8.



I afseende på *Svenska Tabellverkets organisation och fortgång, samt de kostnader det samma för statsverket medfördt*, torde det tillåtas mig att slutligen här få tillägga följande:

Vid dess första början år 1749 var det samma stäldt under dåvarande Kongl. Canzli-Collegium, dit tabell-sammandragen ifrån Consistorierne och Landshöfdinge-Embetena under flere års tid blefvo insände, intill dess Kongl. Majt, i nådigt bref af den 11 October 1756, efter öfvervägande, som orden lyda, "*att de göromål, som vid det angelägna tabellverket dagligen föreföllo, skyndsammare genom en särskildt Committé kunde afhjelpas, än om Canzli-Collegium, efter den omgång dittills måst brukas, skulle dermed allijemt besväras,*" behagade till ledamöter i en sådan commission i nåder utse och förordna Stats-Sekreteraren och Riddaren CARLESON, Assessoren RUDENSKÖLD och Öfver-Direktören FAGGOT samt Sekreteraren WARGENTIN, hvilken sistnämde med det egentligaste sammanräkningsarbetet af de såväl förut ingångne, som derefter till denna Commission insände tabeller finnes hafva tillhandagått, ehuruval derjemte Öfver-Direktören FAGGOT son, JACOB FAGGOT, blef förordnad till expeditionsförande med åtnjutande i arfvode och skrifmaterialier af 400 Daler Silfvermynt årligen, hvilken Commission, som tillika erhöill frihet att med Landshöfdingarne, Consistorierne samt flere vederbörande imediate korrespondera öfver hvad der vid kunde finnas i ämnet, dock skulle, i enlighet med Kongl. Majts vid samma tillfälle till Canzli-Collegium aflätne särskilta skrifvelse, denne Commission stå under samma Kongl. Collegii inseende i så måtto, att de Commissionens ledamöter, som derefter tillförordnades, af Collegium borde föreslås, samt att, hvad Commissionen intill hvarje riksdag hade utarbetat, borde med Kongl. Collegii eget utlåtande beledsagas.

År 1769 den 25 Juli blef Hans Excellens, Riksrådet m. m. Herr Baron HERMANSSON till Ordförande i Kongl. Commissionen förordnad, ifrån hvilken tid Kongl. Canzli-Collegii specielare inseende och egna berättelser synes hafva upphört, ehuru något egentligt sådant förordnande icke ur tabellverkets handlingar kan åberopas. Cheferne för Kongl. Canzli-Collegium och sedermera Kongl. Canzli-Styrelsen hafva dock alltse-dermera och intill år 1838 varit Kongl. Commissionens Ordförande, med undantag endast af tvenne tillfällen, då ena gången Herr Justitiæ-Canzleren LODE och den andra gången Herr Biskopen Doktor WALLQUIST dertill i nåder blefvo förordnade.

Till ledamöter, hvilkas antal varierat, hafva i sednare tider, såsom en följd af Kongl. brefvet af den 14 April 1796, gemenligen alltid en af Kongl. Kammar-Collegii och en af Kongl. Sundhets-Collegii medlemmar varit constituerade, och vanligast dessutom Pastor Primarius i Stockholm, samt någon i oeconomica och landthushållningen erfaren person; hvilka alla, utan att derföre hafva åtnjutit eller ännu åtnjutande något arfvode, och änskönt icke i det egentliga arbetet med tabellerna deltagande, ägt och äga tillsynen, att detsamma vederbörligen fortgår; bevitnande handlingarne nogsamt, hurusom desse ledamöters mångsidiga insigter varit af och haft ett stort inflytande på tabellverkets förbättring, synnerligast vid förslagen till de af förändrade tider och omständigheter föranledde nya formulärer med dithörande tabellförfattarne gifne nödiga föreskrifter.

Sekreteraren är deremot den, som ända hittills det egentliga års tabell-arbetet ålegat och förrättat. Efter Herr WARGENTINS död, som dock dess-

förrinnan en längre tid finnes hafva varit biträdd af Direktör RUNEBERG, blef Kongl. Vetenskaps-Akademiens dåvarande Astronom och andre Sekreterare, Protokolls-Sekreteraren, sedermera Canzli-Rådet NICANDER den 15 Mars 1790 i Herr WARGENTINS ställe till Kongl. Commissionens ledamot och Sekreterare i-nåder utnämnd, med hvilken befattning Herr NICANDER ock alltsedermera oafbrutet intill sin död i Februari månad 1815, och alltså i 25 års tid fortfor, då efter honom undertecknad kort förut antagne vice Sekreterare af Kongl. Commissionen till efterträdande Sekreterare samma år blef förordnad. Vid ofvannämde tillfälle år 1790 blef det Herr NICANDER såsom tjensteskyldighet ålagdt, *"att vid sammankomsterna föra protokollet, att vara ansvarig för alla utgående expeditioner, att anmäla vederbörandes inträffande försummelser, att i ordning hålla Tabell-Archivet, och att derutur samla och författa sådana upplysningar, som kunde bidraga till det med Tabell-Commissionens inrättning åsyftade ändamålet"*. Handlingarne innebära talrika bevis å Herr NICANDERS stora tjenstenit, hvarigenom ganska många och betydliga, till en del redan omnämde, felaktigheter upptäcktes i de från Landshöfdingarne och Consistorierne insände läns- och stifts-sammandragen, som den tiden voro de enda materialier Kongl. Commissionen ägde för de här upprättade årliga riks-tabellerna; och det var på Herr NICANDERS förslag, som, till de uppdagade oriktigheternas framtida förekommande, Kongl. Commissionen i underdånighet hemställde, och Kongl. Maj:t genom nådigt bref af den 31 Augusti 1792 biföll, att, i stället för nämde läns- och stifts-sammandrag, hvarigenom Kongl. Commissionen allt dittills också funnit sig ur stånd att

uppgifva folkstyrkan för mindre trakter än hela stift eller län, sjelfva prosteri- och stads-församlings-tabellerna dädaneftcr skulle, till direkt sammanräkning i Kongl. Commissionen, af Consistorierna årligen insändas; vid hvilket tillfälle Kongl. Maj:t äfven, i anseende till de derigenom betydligt ökade göromålen, täcktes förhöja Sekreterarens lönevilkor ifrån dåvarande 50 till 200 R:dr, samt sedermera genom nådigt bref af den 25 Juni 1795 bevilja honom biträde af en Kammarskrifvare med särskilt årlig lön af 100 R:dr, under vilkor likväl, att inom 2:ne år derefter hafva de då, enligt hans egen anmälan, oriktige befundne eller felande tabellerna för de sista 5 åren ordentligen samlade och rättade, samt att derefter årligen afsluta en af de för de föregående åren för samma förekomne felaktigheters skull då saknade general-tabeller, intill dess nya kunde för de följande upprättas. Då genom så hufvudsaklig förändring de inkomne tabellernas årliga antal (Finland likväl den tiden inberäknadt), uppgick till 500, och hvart 5:te år till 1000, blef för deras sammanräkning till stift och län, den antagne Kammarskrifvaren oaktadt, särskilt legohjelp alldeles oundgänglig, hvilken någon tid af Sekreteraren enskilt påkostades och honom sedermera ersattes *); men af denna anledning fann Kongl. Commissionen sig omsider nödsakad att till Kongl. Maj:t, medelst underdånig skrifvelse af den 1 Maj 1802, hemställa nödvändigheten ej allenast af en särskilt Revisors antagande, utan ock af

*) Genom en gratifikation i ett för allt af 400 R:dr, enligt Kongl. brefvet af den 11 Maj 1802; hvarjemte, till fullbordandet af allt då ännu för de 3 sista åren återstående arbete, 600 R:dr särskilt i nåder beviljades.

särskilt anslag i och för nyssnämde legohjelp; på grund af hvilken anmälan, och genom Kongl. brefvet af den 11 Maj samma år, en ordentlig Stat för Kongl. Commissionen första gången, på sätt här nedan närmare skall visas, blef fastställd, deri Sekreterare-lönen ökades till 300 Rdr årligen mot skyldighet, som orden lyda: "*att fortfarande såsom hufvudman ansvara för arbetets behöriga gång, såvidt hans utgård kan sträcka sig: att jämföra årstabellerna med hvarandra och dem kontrollera: att sammansätta rikstabellerna: att efter dem förfutta berättelser, såväl sådane, som af collegier och embetsmän kunna äskas, som dem, hvilka till Kongl. Maj:t årligen böra afgifvas: samt att hafva tabellarchivet under sin vård, och föra korrespondensen med tabellförfattarne uti frågor om tvektigheter och misräkningar*"; hvaremot Sekreteraren befriades ifrån den honom förut ålagde protokollsföringen vid Kongl. Commissionens sammankomster. I dessa tjänsteåligganden, hvarmed dessutom förslags afgifvande till nya formulärer, formulärernas säkra tryck och vederbörliga utdelande, äfvensom års- och qvinquennii-berättelsernas korrektur-läsning samt redovisningsskyldigheten för expensmedlen varit och äro förenade, har sedermera ingen egentlig förändring blifvit vidtagen och anbefalld; men det torde icke böra förtigas, att desse Sekreterarens göromål betydligt ökats, dels genom riks-tabellernes större vidsträcktthet än förr, i anseende till de efter 1820 emanerade nya särdeles folkmängdstabellformulärernas nära nog fördubblade innehåll, och dels genom berättelsernas flertalighet emot förr, och den med deras tryck förenade lika besvärliga, som ansvarsfulla korrekturläsningen.

Revisoren, hvilken såsom nyss är nämdt, först år 1802 med en lön af 200 R:dr årligen blef antagen, har blifvit genom högstberörde nådiga bref ålagd: "*att upprätta läns-tabellerna, samt jemväl stifts-tabeller om så tarfvas, och att vid sammankomsterna föra protokollet, men egentligen att öfverse såväl de inkommande, som de hos Kongl. Commissionen sammanräknade tabellerna*". I dessa Revisoren ålagde skyldigheter har likväl sedermera den förändring skedt, att Kongl. Commissionen, emot befrielse från läns- och stiftsammandragen, som numera emot legohjelp lika med de öfriga ombesörjas, funnit godt anbefalla honom, att föra en för qvinqvennii-riks-tabellens upprättande ousbärlig samt kontrollerande så kallad *Församlings-Special*, genom hvilken fullkomlig visshet är vunnen, att icke ens någon partiel, än mindre någon hel församlings tabell, såsom tillförene händt, kan utur inkommande prosteri-tabeller vara utesluten.

Efter den med året 1802 på Kongl. Commissionens egen hemställan vidtagne indragningen af den någon tid förut bestådda Kammar-skrifvaren, har på Kongl. Commissionens årliga stater ingen annan löntagare blifvit uppförd, än en kammardräng till ärenders uträttande, mot honom nämde år i nåder beviljade 45 R:dr årligen.

Vidkommande sjelfva sammanräkningen till stift och län m. m. af de ifrån prosterierna och stadsförsamlingarne årligen inkommande tabellerna, hvilken, såsom redan är nämdt, ifrån och med år 1792 till 1802 på Sekreterarens enskilda föranstaltande, utöfver hvad dåvarande Kammar-skrifvaren kunnat dertill bidraga, var ombesörjd, anmälde Kongl. Commissionen i ofvanberörde underdåniga skrifvelse af den 1 Maj 1802, hurusom,

efter den erfarenhet Commissionen ägde om detta arbetes beskaffenhet, att nemligen 100 små tabellers sammanräknande nästan helt och hållet sysselsätter en person på de vanliga arbetstimmarne, och då tabellernas antal årligen utgjorde 500, men hvar 5:te år dubbelt eller 1000, ansåg Commissionen sig icke kunna få detta arbete verkställt för mindre än 400 R:dr årligen, och hvar femte år, då sammanräkningen fördubblades, för 800 R:dr, hvilket öfver hufvud hela 10-talet igenom årligen utgjorde 480 R:dr, hvilken summa i anledning af detta Commissionens underdåniga förslag, äfven sedermera såsom legohjelpskostnad i nåder beviljades och i 1802 års stat uppfördes till sedermera befunnen större väsendtlig förmån för tabellverkets skyndsammare fullbordan, än under den tid löntagande person dertill var använd.

Statsverkets betydligare omkostnader för tabellverket inträdde sålunda först med året 1802. Sjelfva aflöningens obetydliga belopp före den tiden är redan här ofvan ådagalagd, och då utredningen af de kostnader formulär-upplagorna dessförinnan erfordrat, icke af inom tabellverket förvarade handlingar kan upplysas, eller utan tidödande möda från andra håll inhämtas, inskränker jag nu här ådagaläggandet af desse kostnader endast ifrån och med året 1802 till innevarande års början, i enlighet med de deröfver i tabellverkets archiv förvarade handlingar och räkenskaper för denna efterföljande tid af 43 år.

Aflöningen för Kongl. Commissionens embetsmän och vaktmästaren var och förblef oförändrad, sådan den här ofvan redan är anförd, intill och med år 1810; men genom Kongl. Maj:ts nådiga

breff af den 12 April 1812 beviljades, på af Commissionen derom gjord underdånig hemställan, följande löntillökningar, nemligen: för Sekreteraren 100, för Revisoren 66½ och för Vaktmästaren 15 R:dr att räkna ifrån 1811 års början, men hvilken tillökning borde af anslaget till tabellarbetets bedrifvande utgå, som då, i anseende till de upphörda Finska tabellerna, ansågs dertill kunna lemna tillgång. Vid 1815 års riksdag, och den då allmänligen förbättrade löneregleringen, dervid vissa tunnor spanmål voro inbegripne att efter årliga varierande riksmarkegången löntagarne särskilt godtgöras, hade Rikets Höglofl. Ständer i deras uppgjorda stat behagat anslå för

Sekreteraren . 600 R:dr med inbegripne 66 T:r Sp.

Revisoren . . . 426½ R:dr och 47 „ „

Vaktmästaren 100 R:dr och 11 „ „

men uppå Stats-Beredningens på aldrig bekantgjorda skäl grundade förslag, blef detta Ständernas egna anslag likväl i 1816 års fastställde stat nedsatt för

Sekreteraren till 480 R:dr och 53 T:r,

Revisoren till 340 R:dr och 37 „

och Vaktmästaren till . . . 78½ R:dr och 8 „

efter hvilken beräkning aflöningen intill år 1845 oförändrad utgått, och, enligt det härhos slutligen bifogade utdraget af de årliga staterna Litt. I., alla 43 åren sammanräknade utgjort ett belopp

Aflöningen

för Sekreteraren inberäknat tvenne honom genom Kongl. brefven af den 30 Mars 1841 och den 10 Juli 1844, i och för afslutandet af 1840 års qvinqvennii - tabellverk nådigst til-

Årliga medium			
566:	18. 5.	lagde gratifikatio- ner	24,354: 23. —
370:	44. 1.	Revisoren	15,949: 23. —
		Kammar- drängen	3627: 44. —
84:	17. 8.		
1021:	32. 2.	Tillsammans *)	43,931: 42. —
		Till <i>skrifmaterialier</i> haf- va, i följd af Kongl. brefvet af den 31 Au- gusti 1792, 50 R:dr årligen varit Sekrete- raren beviljade, och de första 8 åren på Kongl. Commissionens stat uppförda, men de efterföljande 35 åren utgått efter särskilt stat	
50:	— —		2150: — —
		Till <i>tabellarbetets bedrif- vande</i> har, i enlighet med ofvan åberopade bilaga, det till Kongl. Commissionens dispo- sition utanordnade be- loppet under alla 43 åren utgjort	
453:	14. 2.		19,491. 32. —
1524:	46. 4.	S:a . .	65,573. 26. —
<i>Embets- och archiv-rum</i> voro före- trädande Sekreteraren vid tabell- verket i Kongl. Canzlistyrelsens rum upplåtne; men vid denna styrelses egna behof af samma			
Transport			65,573: 26. —

*) Dessa 3 personers årliga ljuspenningar ej inberäknade.

Transport 65,573: 26. —

utrymme år 1816, blef, i brist af annat tjenligt ställe, under-tecknad nödsakad att till egen bostad hemflytta detta archiv, som allt sedermera, utom med formulär-upplagor, tryckta berättelser och vanliga handlingar, ansenligast ökats och immerfort årligen än vidare ökas med årligen per medium inkommande 360 nya tabeller, i anseende hvar till Kongl. Commissionen år 1821 fann godt att, i mån af expens-medels-tillgångarne, af dem tillägga Sekreteraren 50 R:dr årligen till hyreshjelp, räknad från den 1 October samma år, hvilket sedermera för 23½ år med 1166½ R:dr uppburna belopp sålunda icke ökat statsverkets utgifter; men i sammanhang med ett underdånigt förslag till en ny förbättrad aflöningsstat *) hemställde Commis-

Transport 65,573: 26. —

*) Enligt denna stat skulle, utan någon särskilt beräkning af spanmål under lönerna,

Sekreteraren, i motsvarighet med hvad contours-cheferne vid förvaltande och räkenskapsverken åtnjuta, i lön erhålla 1200: —

Revisorn 500: —

1 Canzlist, för renskrifning af bref m. m. 150: —

1 Kammarkrifvare för räkenskaps utdrag 150. —

1 Kammarkdräng 100: —

Till expenser 500: —

S:a . . . 2600: —

Transport 65,573: 26. —

sionen sedermera i underdånig skrifvelse den 6 April 1839, att Sekreteraren, utom de honom redan af expensmedlen beviljade 50 R:dr. hvarutöfver desamma för andra oundgängliga utgifter icke kunde anlitas, särskilt i nåder måtte beviljas 200 R:dr årligen till anskaffande af passande arbets- och archiv-rum. Då efter Kongl. Maj:ts härå aflåtne nådiga propositioner, rikets Höglofl. Ständer, hvad hyresmedlen angingo, ansågo embets- och archiv-rum i stället böra åt Commissionen i något kronans hus utses och anskaffas, men Öfver-Intendents-Embetet, efter härå emottagen nådig re-

Transport 65,573: 26 —

Hvarförutan Kongl. Commissionen behagade för Sekreteraren särskilt föreslå en gratifikation af 3565 R:dr 19 sk. såsom ersättning för belöpande skillnaden till år 1839 emellan de af Rikets Ständer år 1815 beviljade, men af honom icke åtnjutne löneförmåner; hvilken underdåniga hemställan sedermera förnyades under den 8 Dec. 1840 och den 21 Juni 1844. Efter härom af Kongl. Maj:t till Rikets Ständer aflåtne nådiga propositioner, blef vid 1840 års riksdag ifrågavarande underdåniga hemställan med några få rösters pluralitet i förstärkt stats-utskott afslagen; men vid riksdagen år 1844 har sjelfva statsförslaget, med undantag endast af Kammarskrifvarelönen, omsider blifvit af Rikets Ständer antaget och fastställt att utgå från och med år 1845.

Transport 65,573: 26. —

miss, tillkännagifvit att några för Kongl. Commissionen passande rum då icke funnos att tillgå, behagade Kongl. Majt, medelst nådigt bref af den 30 Mars 1841, särskilt och utöfver förenämde 50 R:dr, samt intill dess nödigt utrymme i kronans hus kan beredas, af den på rikstatens andra hufvudtitel till expenser för rikets collegier med flere embets-verk uppförda summan, bevilja en årlig hyra af 200 R:dr, räknad ifrån den 1 September 1839, hvilken sålunda för en tid af 5½ år blifvit utanordnad med

1,066: 32. —

Till *inköp af 2:ne skåp och 1 sigill* finnas, i följd af Kongl. Majts nådiga bref af den 11 Maj 1802, särskilt vara utanordnade 40 R:dr Riksgälds eller

26: 32. —

I och för *tryckningen af de erforderlige och till vederbörande utdelade tabell-formulärerna* har särskilt i nåder blifvit anslaget och utanordnad, nemligen:

År 1802 1533: 16. —

1811 1000: — —

1821 1078: 9. 7.

1831 1900: — —

1841 1803: 16. —

7314: 41. 7.

Uppgående alltså stats-verkets alla utgifter i och för tabellverket

Transport 73,981: 37. 7.

Transport 73,981: 37. 7.
 under de från och med 1802
 framlupne 43 åren tillsammans
 till *) 73,981: 35 7.
 Hvaraf årliga medium utgör 1,720: 24. 3.

Härunder är likväl icke inberäknad den *särskilta gratifikation af 2000 R:dr Banko* hvarmed Rikets Höglofl. Ständer vid 1840 års riksdag, af de under Riksgälds-Contoret ställde medlen, ynnestfullt täcktes hedra undertecknad för dess 25-åriga bemödanden om tabellverkets framgång.

I afseende på den här ofvan upptagne till tabell-arbetets bedrifvande utbetalde summan af 19,491: 32. —
 bör här icke lemnas oanmärkt, huru som densamma under tiden blifvit särskilt förökad på sätt som följer, neml.:

Genom intresset å under åren 1805
 med 1811 förräntade tabellme-
 del 164: 29. 3.

Influtne försäljningsmedel
 för tryckta qvinqvem-
 nii-berättelser och ta-
 beller 130: 32. —

samt slutligen en, förme-
 delst Kongl. brefvet
 af den 14 September
 1836, denna fond
 tillerkänd 5 måna-

Transport 295: 13. 3. 19,491: 32. —

*) Af hvilken summa enligt bilagan Litt. I. belöper
 för åren 1802 med 1815 14,310: — medium 1057: 41. 5.
 1816 med 1840 13,986: 42. „ 1759: 22. 10.
 1841 med 1844 6,776: 32. „ 1694: 8. —

Transport	295: 13. 3.	19,491. 32. —
ders inträffade besparing å revisors-lönen, till ett belopp af	210: 47. 2.	506: 12. 5.
Hvilken sammanräknade tillgång . .	19,997: 44. 5.	
blifvit på följande sätt använd:		
I legohjelp för sammanräkningen till stift och län af de inkomna tabellerna, godtgjord intill år 1804 med 16 sk., derifrån till 1802 med 20 sk., och sedermera med 24 sk. för hvar tabell, till ett belopp af .	11,100: 24. —	
Ofvannämde hyres-ersättning till sekreteraren för de 23 sista åren å 50 R:dr	1,150: — —	
För uppliniering och införing i den så kallade liggaren eller länsvis specifike årliga riks-tabellen	608: — —	
För uppliniering och införingen i församlings-specialen intill år 1836, då denna skyldighet blef revisoren ålagd	399: 2. —	
För inbindning af räkenskaper, protokoll och handlingar samt portefeuilles till tabellernas förvarande	333: 26. 4.	
Till arfvoden för renskrifning af qvinnlii-berättelser och af till tryck befordrade tabeller	802: 42. —	
För stentryck till tabell-manuskripterna	86: 42. 8.	
Tryckningskostnad för på Kongl. Maj:ts nådiga befallning med tidningarne utdelade års-berättelser och tabeller	2847: 18. 5.	
Transport	17,328: 11. 5.	

	Transport	17,328: 11. 5.
Trycket till completering af för vederbörande erforderlige tabell-formulärer, då upplagorne deraf åtgått		1,923: 32. —
För inventarii-persedlar, kartor och böcker, oberäknadt ofvan redan upptagne 26½ R:dr		153: 11. —
Archivets flyttningskostnad		29: 17. —
Gratifikation, i nåder beviljad aflidne revisoren Björnströms enka 50: —		
Än till en vaktmästare		
år 1802	7: 24.	57: 24. —
Arfvoden för med tidningarne utdelade handlingar, frakter och andra smärre utgifter		38: 6. 11.
Behållning af desse medel den 31 December 1844		467: 38. 1.
	S:a	19,997: 44. 5.

För fullständighetens skull, anser jag mig här slutligen icke böra utelemna, att utöfver ofvanstående i och för årsberättelsernas tryck och utdelande af expens-medlen utbetalde 2,847 R:dr 18 sk. 5 rst., hafva, i anseende till samma medels otillräcklighet, följande summor, hufvudsakligast i och för de utförligare qvinqvännii-berättelsernas allmängörande, särskilt blifvit i nåder beviljade och utanordnade, nemligen:

I följd af Kongl. brefvet af den 28 Maj 1828, för 1825 års qvinqvännii-berättelse, med de i stentryck utgifne tabellerna, till fyllnad i den derföre till 3144 R:dr 45 sk. 6 rst. uppgångne kostnaden 1,550: — —

Transport 1,550: — —

Transport 1,550: — —

Enligt Kongl. brefvet af den 24 Augusti 1833, för 1830 års qvin-
qvennii-berättelse ensamt, hvilken
gång sjelfva tabellerna icke af tryc-
ket utgäfvos 420: 24. —

Likmätigt Kongl. brefvet af den 3 Au-
gusti 1838 för 1835 års dito, med
tillhörande tabeller 4,982: 1. 2.

I nådigt bref af den 1 Februari 1841
beviljades för en till utdelning be-
stämd upplaga af 2500 exemplar
af års-berättelsen för åren 1838
och 1839 med dem tillhörande
2:ne generalsammandrag, den der-
till åtgångna kostnads-summan af 285: — —
hvarjemte i nåder blef förord-
nadt och tillätet, att äfven dä-
danefter årsberättelserna, med
dem tillhörande tabell, till ett
lika antal bör tryckas och till all-
mänhetens kännedom med Stats-
Tidningen utdelas, hvarföre belö-
pande kostnaden kommer att godt-
göras af stats-anslaget till tryck-
nings-kostnader.

Varande den, genom Kongl. brefvet af
den 14 Maj 1844, anbefalldes tryck-
ningen af 1840 års qvinqvennii-
berättelse med den samma tillhö-
rande 51 tabellerna ännu, hvad
de sednare angår, ofullbordad,
men emedlertid på kostnaden der-
före förskottsvis utbetalt 2,000: — —

S:a 9,237: 25. 2.

Om det Svenska Tabellverket, som fyra år härefter uppnår 100 års ålder, under denna framflutna tid, genom här uppräknade vidtagne anstalter vunnit den betydliga förbättring, att det kan anses förtjena det loford, som äfven utlänningarne det lemnat, såsom fullständigare än i andra länder, återstår dock åtskilligt, mera önskvärdt än för det närvarande möjligt att ernå, för dess ytterligare fullkomnande, om ock endast inskränkt till de föremål detsamma nu innefattar *). Den vundna förbättringen måste till stor del tillskrifvas det nit rikets presterskap i allt mer tilltagande mån ådagalagt om noggrannhet i afgifne tabeller, desto mer förtjenstfullt å dess sida, som det lärer vara onekligt, att Herrar Kyrkoherdar i sednare tider fått sig uppdragne vida flertaligare municipal- och andra bestyr, än i förra tider, hvilka i betydlig mån taga deras från dem egentligen åliggande embetsgöromål lediga tid i anspråk.

De flesta af de ämnen, som de dem till författande åliggande tabellerna, enlig hvad nu visadt blifvit, innehålla, äro dock af beskaffenhet, att icke ur någon annan och i de mesta fallen säkrare källa kunna hämtas, än utur kyrkoböckerna, och hvad angår sjelfva folkmängden och dess tillväxt, är omöjligheten för det närvarande, att från annat håll derå erhålla säkrare uppgift på en allestädes öfverensstämmande tidpunkt af året redan här ofvan, såsom jag förmodar, tydligt ådagalagd. Med undantag af Stockholm och till äfventyrs några få andra större städer, där innevånarne i afseende på församlingarne torde finnas nog mycket blandade om hvarandra, lär ingen

*) Se noten sid. 204.

närmare än kyrkoherden, synnerligast på landsbygden, äga, eller kunna på lämpligt och ändamålsenligt sätt inhämta kännedom om församlingsboarnes bättre eller sämre villkor, och minst om där befintlige undervisnings-, samt helso- och fattig-vårdsanstalter. Hvad deremot angår folk-mängden i församlingen till sin sysselsättning, eller specifikation till yrken och näringar, att förtiga flere andra speciellare uppgifter, torde noggrannheten ofta fordra en vidsträcktare och särskilt möda i och för dithörande underrättelsers inhämtande, hvarföre det ock, i de af Kongl. Majt i nåder fastställda föreskrifterna, blifvit presterskapet medgifvit, att af mantals-commissarierna i städerna och häradsskrifvarne på landet begära och erhålla de för sådana anteckningar möjligen selande upplysningarne. Hvad som härvid sökas och upplysas bör, är väl både genom sjelfva rubrikerna, samt genom särskilt gifna föreskrifter och förklaringar utredt, men erfarenheten har dock under framfarna tiden visadt, hurusom, allsköns bemödande om tydlighet i de sednare oaktadt, dessa dock esomoftast blifvit missförstådda, eller olika tillämpade, än af contractsprostarne, som nu ombesörja sammanräkningen, och än af contractisterne i de af dem afgifne tabellerna, hvilka olikheter, rättade där de kunnat utrönas, likväl ofta nog torde hafva blifvit, och till någon del måste förblifva oupptäckta vid saknaden af sjelfva församlings-tabellerna. Genom formulärernas här ofvan omnämnda förändringar i thy, att i de årliga hufvudsummorna af födde, vigde och döde samt i de qvin-qvennale, folkmängden så till antal i det hela, som i vissa åldersperioder numera äfven församlingsvis i prosteri-tabellen upptagas, har visser-

ligen, nu emot förr, en större kontroll blifvit vunnen, men till uppdagande af i de andra detaljerna förelöpande oriktigheter, eller ock möjligen miss-summeringar i prosteri-tabellerna, skulle dock kontrollen i min öfvertygelse nära nog till fullkomlighet förökas, om sjelfva församlings-tabellerna, utan att, såsom nu, endast till prosteri-tabeller sammandragas, directe till Kongl. Tabell-Commissionen inginge, då ock en närmare jämförelse med till andra verk ingående uppgifter, i synnerhet i afseende på folkmängdens klassifikation, blefve verkställbar; men i fall en så betydande förändring kunde åstadkommas, borde contracts-prostarne fortsarande vara skyldige, att tabellerna hvar och en för sitt contract insamla, och dem noga granska, samt med skriftliga anmärkningar, där sådane förekommo, beledsaga vid deras insändande till consistorium, derifrån handlingarne sedermera fullständigt skulle till Kongl. Commissionen ingå.

Här ofvan äro ock alla olägenheter för tabell-verket redan antydde, som förorsakas af den ecclesiastika och den camerala indelningens olikhet i riket. En oordning måste det ensamt erkännas redan vara, att, på sätt de för sista qvinnennierna tryckta läns-tabellerna närmare utvisa, så många moder-församlingar finnas, sjelfva inom blott ett fögderi odeladt liggande, hvilkas annexer, äfven lika ostyckade, äro belägna i helt annat fögderi samt till och med län och stift; men för tabell-verket är det synnerligast af ganska menlig följd, att på sätt nu skall visas, församlingar och annexer finnas, som inom sig ensamt äro liggande i, och fördelade på flere län. Desse utgöra till antalet 35, och äro följande:

I Upsala stift,	Wähla församl.	{	hvardera belägne både i Uplands och Wäst- manlands län.
	Harbo d:o		
i Streng- näs stift,	W. Wingåker	{	både i Södermanlands och Nerikes län.
	Askeryd		
I Linkö- pings stift,	Regna	{	både i Östergöthlands och Jönköpings län.
	Boo		
	Rumskulla . . .	{	både i Östergöthlands och Calmar län.
	Yxnerum . . .		
	Lönberga . . .	{	både i Jönköpings och Calmar län.
	Wirserum . . .		
I Calmar stift,	Wissefjärda . .	{	belägen i 3 län neml.: Jönköpings, Calmare och Kronobergs.
	Svanskog . . .		
I Carl- stads stift,	Nysund	{	både i Wärmelands och Elfsborgs län.
I Wä- sterås stift,	Fellingsbro . .	{	belägne både i Wäst- manlands och Neri- kes län.
	Ramsbergs . . .		
	Skedwi		
I Wexiö stift,	Femsjö	{	både i Jönköpings och Kronobergs län.
	Carltorp		
I Skara stift,	Habo	{	både i Skaraborgs och Jönköpings län.
	Börstig, Bjurbeck,		
	Kylingare, Smu- la, Åsaka, Åsarp.	{	alla 6 både i Skara- borgs och Elfsborgs län.
	Bottnaryd . . .		
		{	belägen i 3 län, neml : Skaraborgs, Elfsborgs och Jönköpings.

I Lunds stift,	{ 9 församlingar, nem- ligen: Broby, Köpinge, N. Rörum, Röstånga, Tryde, Strövelstorp, Swensköp, N. Wramb och Öfraby }	både i Christianstads och Malmöhus län.

för hvilka församlingar således dubbla och 3-dubbla kyrkoböcker måste föras för de partiella tabeller, presterskapet derstädes, både kyrkoherdarne och till en del prostarne, äro ålagde upprätta, och utom hvilka ingen fullständig läns-tabell härstädes skulle kunna åstadkommas. Då lika afskilda kyrkoböckers förande icke kunnat åläggas presterskapet i först nämde flertaligare på flere fögderier, ehuru icke på olika län, fördelade församlingar, och sålunda icke eller partiel-tabeller äfven för sådane ingå, har det varit en omöjlighet att, i öfverensstämmelse med en af rikets Höglofl. Ständer vid 1825 års riksdag yttrad önskan, för hvarje fögderi i riket framlägga folk-mängden, så till belopp som andra detaljerade förhållanden, närmare än som i de för de 3 sista qvinqvennierna sammanfattade speciella läns-tabellerna skedt, såmedelst, att alla sådane uti flere härader liggande församlingar blifvit räknade och upptagna under det fögderi, hvari efter största arealvidden den största delen af församlingen befunnits liggande.


För åstadkommandet af dessa 2:ne för tabell-verkets fullkomnande redan längesedan insedda så betydliga förändringar, möta likväl 2:ne, åtminstone för det närvarande, ööfvervinneliga hinder, det ena den betydligt drygare kostnad som på sätt nu slutligen skatt visas, oundvikligen skulle åtfölja tabellernas så vidsträckta insändande, och det andra, att ett af Herr Canzli-Rådet NICANDER

år 1814 till Kongl. Majt i underdånighet ingifvit förslag till den camerala och ecclesiastika församlings-indelningens sammanjemkning, efter af Kongl. Majt deröfver ifrån Kongl. Kammar-Collegium infordradt utlåtande, icke befunnits antagligt, och icke eller något annat bättre förslag dertill allt hittills, mig veterligt, blifvit för detta, tvifvelsutän äfven i många andra afseenden, viktiga ändamåls ernående åstadkommit.

Moderförsamlingarne i riket, sammanräknade med särskilda annexer och kapeller, utgöra för det närvarande ett antal af 2425.
 samt contracts-prostarnes 174.
 hvilka afgifva särskilda partiella tabeller, såsom ofvan är utredt . . . 37. 211.

Genom församlings-tabellernas direkta insändande skulle det till Kongl. Commissionen ingående antalet tabeller således ökas årligen med 2214, samt hvårt 5:te år med dubbelt, utgörande i årligt medeltal 2657 tabeller, för hvilkas sammanräkning till både stift och län, efter nu gällande betalningssätt alltså skulle erfordras en ökad kostnad af aldraminst 2500 R:dr, och då revisionen af så många tabeller, så noggrann som vederbör, omöjligen af en enda person inom årets lopp kan medhinnas, blefve, åtminstone 2 nya revisorers antagande oundvikligt, hvilkas aflöning, à 375 R:dr årligen utgör 750 R:dr. Hvadan, och med förbigående af flere andra smärre lika oundvikliga utgifter, den ökade kostnaden minst skulle utgöra 3250 R:dr eller mer än dubbelt mot hittills varande statsanslag för tabellverket.





Qvadrat- mil.		Stiftet.	Folkmängden År 1790.						F.	
Land.	Sjöar.		m.	q.	S:a.	deraf belöper på qvadratmiln.				m.
						m.	q.	S:a.		
268,059	19,131	Upsala Stift	111,507	122,801	234,308	416	458	874	123,071	
103,275	8,463	Strengnäs	79,006	87,188	166,194	767	846	1613	86,957	
335,030	23,731	Wästerås	97,532	108,166	205,698	291	323	614	99,299	
188,677	20,195	Carlstads	80,674	86,349	167,023	428	460	888	92,222	
145,915	15,626	Linköpings	104,726	116,027	220,753	717	795	1512	117,225	
151,212	16,385	Wexiö	73,741	79,669	153,410	488	528	1016	85,682	
50,329	1,132	Calmar	32,325	35,722	68,047	642	711	1353	39,266	
27,149	0,421	Wisby	13,187	15,514	28,701	488	575	1063	15,677	
120,450	4,286	Lunds	147,844	153,856	301,700	1232	1282	2514	178,480	
121,777	7,463	Götheborgs.	106,013	113,308	219,321	870	931	1801	127,181	
104,997	5,885	Skara	89,175	95,495	184,670	850	909	1759	97,687	
1961,857	138,537	Hernösands	65,122	72,130	137,252	33	37	70	80,396	
3578,727	261,255	S:a	1,000,852	1,086,225	2,087,077	280	303	583	1,143,143	
Mälaren... 10,016		Än								
Hjelmaren 4,537		i Stockholm	30,979	38,737	69,716				33,824	
Wettern... 16,869										
Wenern... 48,150										
340,827		I hela Riket	1,031,831	1,124,962	2,156,793				1,176,967	

Qvadrat- mil.		Länet.	Folkmängden					
Land.	Sjöar.		Året 1815.			belöper på qvadratmiln.		
			m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
63,863	3,321	Stockholms Län och Städer	46,106	51,239	97,345	721	802	1523
45,495	1,171	Uplands d:o	37,325	42,774	80,099	820	940	1760
54,490	5,527	Södermanlands d:o	47,737	51,853	99,590	876	951	1827
82,903	9,821	Östergöthlands d:o	77,603	86,228	163,831	936	1040	1976
92,227	8,305	Jönköpings d:o	55,833	61,729	117,562	607	671	1278
81,798	9,920	Kronobergs d:o	43,693	48,187	91,880	534	589	1123
97,356	5,330	Calmare d:o	67,070	73,750	140,820	689	757	1446
24,149	0,421	Götlands d:o	15,677	17,703	33,380	580	656	1236
29,056	1,333	Blekinge d:o	35,367	37,600	72,967	1473	1567	3040
54,980	2,205	Christianstads d:o	61,558	64,561	126,119	1119	1174	2293
41,414	0,748	Malmöhus d:o	81,555	83,877	165,432	1970	2026	3996
39,406	1,814	Hallands d:o	36,812	40,454	77,266	934	1027	1961
41,952	1,486	Götheborgs d:o	61,631	63,991	125,622	1468	1523	2991
102,100	10,987	Elfsborgs d:o	76,926	82,738	159,664	754	811	1565
68,662	3,230	Skaraborgs d:o	68,230	73,948	142,178	993	1076	2069
150,108	14,761	Wärmelands d:o	67,887	73,090	140,977	452	487	939
68,211	6,064	Nerrikes d:o	46,041	50,743	96,784	677	746	1423
54,758	2,611	Wästmanlands d:o	38,731	45,083	83,814	707	823	1530
265,880	18,772	Kopparbergs d:o	55,632	64,016	119,648	210	246	456
158,132	14,891	Gefleborgs d:o	41,333	46,790	88,123	262	296	558
205,518	9,864	Wäster-Norrlands d:o	31,193	35,149	66,342	151	171	322
404,522	29,917	Jämtlands d:o	16,886	18,129	35,015	42	47	89
678,458	48,631	Wästerbottens d:o	16,011	17,476	33,487	23	26	49
675,289	50,125	Norrbottnens d:o	16,306	17,826	34,132	24	27	51
3578,727	261,255	S:a	1,143,143	1,248,934	2,392,077	319	349	668
0,103		Än						
		Stockholms Stad	33,824	39,165	72,989			
3578,830		I hela Riket	1,176,967	1,288,099	2,465,066			

Tillökningen

Under första 25 åren.			Under de sista 25 åren.			Procenten	
q.	S:a.	m.	q.	S:a.		Under 1:a period.	Under 2:a period.
64	16,235	27,799	19,597	19,218	38,815	11,86	14,81
51	8370	16,321	17,742	16,789	34,531	9,82	18,92
67	5984	7751	17,888	17,401	35,289	3,77	16,53
48	12,735	24,283	39,272	37,643	76,915	14,54	40,21
39	13,376	25,875	33,605	33,039	66,644	11,72	27,02
41	15,144	27,085	27,999	27,113	55,112	17,66	30,53
41	7832	14,773	13,375	12,609	25,984	21,72	31,37
30	2189	4679	4336	3859	8195	16,30	24,55
36	32,182	62,818	60,333	58,506	118,839	20,80	32,86
38	22,129	43,297	38,217	39,518	77,735	20,03	29,60
12	10,083	18,595	29,437	28,779	58,216	10,06	28,64
74	16,450	31,724	32,861	33,513	66,374	23,12	39,30
31	162,709	305,000	334,662	327,987	662,649	14,61	27,70
15	428	3273	4800	6372	11,172	4,70	15,31
36	163,137	308,273	339,462	334,359	673,821	14,29	27,33

ng under de sista 25 åren.

n- tade.	Flere Ut- än Inflyttade.				Summa Tillökning.				Gör i procent.
	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.		
2	5824	—	—	—	6806	6128	12,934	13,29	
—	—	2558	2369	4927	2750	2445	5195	6,48	
—	—	3919	3473	7392	7761	7569	15,330	15,40	
3	1613	1051	—	1051	21,396	21,398	42,794	26,12	
—	—	5628	3116	8744	16,558	16,357	32,915	28,00	
—	—	3382	1573	4955	14,966	14,608	29,574	32,18	
—	—	1790	312	2102	22,710	21,027	43,737	31,06	
3	35	469	—	469	4336	3859	8195	24,55	
5	395	260	—	260	10,970	11,870	22,840	31,30	
7	697	576	—	576	20,131	19,630	39,761	31,53	
—	98	—	1161	1161	29,232	27,006	56,238	34,06	
—	—	1497	495	1992	9279	8389	17,668	22,86	
9	5141	—	—	—	18,892	20,460	39,352	31,33	
0	1510	621	—	621	29,476	29,478	58,954	36,92	
—	—	2091	328	2419	19,756	19,114	38,870	27,34	
—	—	921	682	1603	27,798	26,771	54,569	38,71	
—	—	2992	2740	5732	14,307	13,970	28,277	29,21	
—	—	1423	885	2308	4421	4259	8680	10,36	
—	—	3341	2647	5988	9385	9108	18,493	15,46	
11	91	209	—	209	10,757	10,917	21,674	24,60	
—	—	955	39	1352	9623	9910	19,533	34,30	
—	—	761	513	1274	5496	5254	10,754	30,71	
22	1214	—	—	—	11,853	11,824	23,677	70,70	
—	—	1648	410	2058	6003	6632	12,635	37,0	
22	16,616	36,092	21,101	57,193	334,662	327,987	662,649	27,70	
52	35,077	—	—	—	4800	6372	11,172	15,31	
74	51,693	36,092	21,101	57,193	339,462	334,359	673,821	27,33	

öfverskott.

Folkmängden efter Åldern.			År 1815.			År 1820.			År 1825.		
I hela Riket.			m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
Under 1 år			36,833	35,903	72,736	37,079	36,052	73,131	43,945	43,456	87,401
Emellan 1 och 3 år			58,183	58,457	116,640	67,287	67,287	134,574	81,133	80,427	161,560
" 3 o. 5			59,064	60,032	119,096	64,873	64,974	129,847	73,453	73,268	146,721
" 5 o. 10			116,587	116,885	233,472	130,351	131,518	261,869	147,227	146,661	293,888
" 10 o. 15			118,251	118,452	236,703	115,187	115,626	230,813	130,601	131,342	261,943
" 15 o. 20			114,702	115,570	230,272	115,465	116,868	232,333	116,528	118,731	235,259
" 20 o. 25			106,322	115,151	221,473	110,730	114,758	225,488	110,878	114,549	225,427
" 25 o. 30			90,748	101,466	192,214	105,308	111,270	216,578	106,682	109,841	216,523
" 30 o. 35			82,806	93,213	176,019	88,115	97,691	185,806	101,729	107,727	209,456
" 35 o. 40			79,040	86,827	165,867	77,979	87,492	165,471	82,658	92,400	175,058
" 40 o. 45			63,104	73,174	136,278	73,443	83,021	156,464	73,012	82,836	155,848
" 45 o. 50			59,388	66,821	126,209	57,873	66,806	124,679	66,575	77,078	143,653
" 50 o. 55			54,589	65,097	119,686	53,463	63,969	117,432	51,601	62,114	113,715
" 55 o. 60			45,418	56,183	101,601	46,413	57,715	104,128	45,088	57,349	102,437
" 60 o. 65			38,475	48,701	87,176	37,409	48,001	85,410	38,737	50,489	89,226
" 65 o. 70			26,143	34,464	60,607	28,438	38,206	66,644	28,440	38,311	66,751
" 70 o. 75			15,390	21,125	36,515	17,469	24,436	41,905	19,933	28,182	48,115
" 75 o. 80			7,516	11,375	18,891	8,334	12,251	20,585	9,921	15,135	25,056
" 80 o. 85			3,271	5,297	8,568	3,157	5,151	8,308	3,704	6,070	9,774
" 85 o. 90			943	1,551	2,494	911	1,699	2,610	930	1,827	3,357
" 90 o. 95			169	320	489	167	362	529	173	405	578
" 95 o. 100			22	29	51	22	58	80	17	72	89
Öfver 100 år			3	6	9	2	4	6	5	12	17
S:a			1,176,967	1,288,099	2,465,066	1,239,475	1,345,215	2,584,690	1,332,970	1,438,282	2,771,252
Således under 15 år			388,918	389,729	778,647	414,777	415,457	830,234	476,359	475,154	951,513
emellan 15 och 60 år			696,117	775,502	1,471,619	728,789	799,590	1,528,379	754,751	822,625	1,577,376
öfver 60 år			91,932	122,868	214,800	95,909	130,168	226,077	101,860	140,503	242,363
I Stockholms Stad.											
Under 1 år			643	599	1,242	573	586	1,159	771	758	1,529
Emellan 1 och 3 år			1,342	1,310	2,652	1,184	1,251	2,435	1,460	1,445	2,905
" 3 o. 5			1,110	1,129	2,239	1,311	1,295	2,606	1,400	1,370	2,770
" 5 o. 10			2,221	2,259	4,480	2,820	2,830	5,650	2,821	2,877	5,698
" 10 o. 15			2,449	2,517	4,966	2,099	2,184	4,283	2,833	2,893	5,726
" 15 o. 20			3,482	3,493	6,975	3,126	2,943	6,069	3,039	2,745	5,784
" 20 o. 25			3,691	3,827	7,518	3,973	3,916	7,889	4,556	4,012	8,568
" 25 o. 30			3,824	4,011	7,835	4,667	4,333	9,000	4,911	4,345	9,256
" 30 o. 35			3,458	3,619	7,077	3,552	3,793	7,345	4,130	4,324	8,454
" 35 o. 40			2,918	3,359	6,277	2,973	3,421	6,394	2,947	3,670	6,617
" 40 o. 45			2,235	2,753	4,988	2,268	2,973	5,241	2,100	3,113	5,213
" 45 o. 50			1,966	2,644	4,610	1,805	2,561	4,366	1,730	2,766	4,496
" 50 o. 55			1,606	2,362	3,968	1,407	2,265	3,672	1,163	2,216	3,379
" 55 o. 60			1,091	1,798	2,889	1,130	2,057	3,187	981	1,988	2,969
" 60 o. 65			839	1,581	2,420	707	1,469	2,176	716	1,697	2,413
" 65 o. 70			491	1,082	1,573	557	1,271	1,828	428	1,176	1,604
" 70 o. 75			281	637	918	275	753	1,028	298	835	1,133
" 75 o. 80			107	270	377	163	417	580	146	475	621
" 80 o. 85			48	158	206	34	127	161	46	180	226
" 85 o. 90			17	42	59	15	64	79	16	41	57
" 90 o. 95			4	16	20	5	11	16	5	15	20
" 95 o. 100			1	1	2	—	5	5	—	4	9
Öfver 100 år			—	—	—	—	—	—	—	—	—
S:a			33,824	39,165	72,989	35,044	40,525	75,569	36,497	42,976	79,473
Således under 15 år			7,765	7,812	15,577	7,987	8,146	16,133	9,285	9,343	18,628
emellan 15 och 60 år			24,271	27,566	51,837	25,301	28,262	53,563	25,557	29,209	54,737
öfver 60 år			1,788	3,787	5,575	1,756	4,117	5,873	1,655	4,424	6,108

År 1825.			År 1830.			År 1835.			År 1840.			
m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	
1	43,945	43,456	87,401	40,983	40,132	81,115	43,427	42,466	85,895	43,744	42,472	86,216
4	81,133	80,427	161,560	79,054	79,407	158,461	83,910	83,578	167,488	76,207	76,059	152,266
7	73,453	73,268	146,721	72,528	72,812	145,340	71,440	71,049	142,489	74,022	74,107	148,129
9	147,227	146,661	293,888	170,878	169,870	340,748	167,330	166,926	334,256	173,446	171,920	345,366
3	130,601	131,342	261,943	145,150	145,247	290,397	167,852	167,464	335,316	162,862	163,584	326,446
3	116,528	118,731	235,259	130,368	132,925	263,293	145,969	147,314	293,283	167,707	168,566	336,273
8	110,878	114,549	225,427	107,122	110,585	217,707	121,393	124,433	245,826	134,424	138,965	273,389
8	106,682	109,841	216,523	106,353	110,261	216,614	103,060	106,343	209,403	116,235	121,034	237,269
6	101,729	107,727	209,456	102,105	106,088	208,193	101,365	106,026	207,391	97,090	101,597	198,687
1	82,658	92,400	175,058	93,658	100,661	194,319	95,017	100,115	195,132	93,752	99,814	193,566
4	73,012	82,836	155,848	76,441	87,263	163,704	87,089	95,732	182,821	87,429	94,747	182,176
9	66,575	77,078	143,653	64,762	76,528	141,290	68,758	80,593	149,351	78,075	88,428	166,503
2	51,601	62,114	113,715	58,901	70,808	129,709	57,128	70,118	127,246	61,011	74,402	135,413
8	45,088	57,349	102,437	43,507	54,435	97,942	49,612	62,267	111,879	48,727	61,633	110,360
0	38,737	50,489	89,226	36,505	48,958	85,463	35,715	46,972	82,687	43,187	57,090	100,277
4	28,440	38,311	66,751	28,246	39,092	67,338	27,577	38,069	66,246	25,687	36,273	61,960
5	19,933	28,182	48,115	18,765	27,008	45,773	18,975	27,777	46,752	17,889	26,403	44,292
5	9921	15,135	25,056	19,459	16,028	26,487	10,235	15,913	26,148	9820	15,732	25,552
8	3704	6070	9774	3934	6794	10,728	4347	7471	11,818	3834	6749	10,583
0	930	1827	2757	1009	1824	2833	1171	2199	3370	1088	2347	3435
9	173	405	578	164	362	526	179	372	551	173	467	640
0	17	72	89	27	62	89	26	59	85	15	65	80
6	5	12	17	2	11	13	2	4	6	5	4	9
0	1,332,970	1,438,282	2,771,252	1,390,921	1,497,161	2,888,082	1,461,577	1,563,862	3,025,439	1,516,429	1,622,458	3,138,887
4	476,359	475,154	951,513	508,593	507,468	1,016,061	533,959	531,485	1,065,444	530,281	528,142	1,058,423
9	754,751	822,625	1,577,376	783,217	849,554	1,632,771	829,391	892,941	1,722,332	884,450	949,186	1,833,636
7	101,860	140,503	242,363	99,111	140,139	239,250	98,227	139,436	237,663	101,698	145,130	246,828
9	771	758	1529	699	683	1382	720	744	1464	758	714	1472
5	1460	1445	2905	1297	1402	2699	1303	1395	2698	1281	1321	2602
6	1400	1370	2770	1277	1247	2524	1292	1249	2541	1300	1316	2616
0	2821	2877	5698	3084	3097	6181	2916	2990	5906	3036	2942	5978
3	2833	2893	5726	2837	2828	5665	3238	3055	6293	2836	2808	5644
9	3039	2745	5784	3733	3386	7119	4147	3617	7764	4002	3818	7820
9	4556	4012	8568	4379	3715	8094	5385	4401	9786	5140	4662	9802
0	4911	4345	9256	5259	4618	9877	5223	4373	9596	5654	5239	10,893
5	4130	4324	8454	4340	4216	8556	4429	4289	8718	4257	4197	8454
4	2947	3670	6617	3232	3807	7039	3319	3954	7273	3403	4041	7444
1	2100	3143	5243	2174	3178	5352	2272	3286	5558	2368	3614	5982
6	1730	2766	4496	1557	2695	4252	1518	2729	4247	1616	2952	4568
2	1163	2216	3379	1153	2421	3574	1048	2200	3248	1069	2286	3355
7	981	1988	2969	782	1771	2553	798	1757	2555	701	1861	2562
6	716	1697	2413	623	1751	2374	511	1465	1976	540	1493	2033
8	428	1176	1604	389	1150	1539	374	1031	1405	306	957	1263
8	298	835	1133	239	772	1011	191	691	882	209	715	924
0	146	475	621	116	410	526	111	375	486	95	397	492
1	46	180	226	54	169	223	36	151	187	36	150	186
9	16	41	57	9	52	61	18	38	56	14	48	62
6	5	15	20	5	13	18	3	10	13	3	6	9
5	—	4	4	—	1	1	1	2	3	—	—	—
—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—
9	36,497	42,976	79,473	37,238	43,383	80,621	38,853	43,802	82,655	38,624	45,537	84,161
8	9285	9343	18,628	9194	9257	18,451	9469	9433	18,902	9211	9101	18,312
8	25,557	29,209	54,766	26,609	29,807	56,416	28,139	30,606	58,745	28,210	32,670	60,880
2	1655	4424	6079	1435	4319	5754	1245	3763	5008	1203	3766	4969

År 1840.

Folkmängden till Yrken och Näringar.

	Gifta.		Barn, Ogifta M och Enkling öfver 10
	Männer.	Hustrur.	
Prästerskap och prästvigd Kyrkobetjening	2171	2164	1
Laici, Öfrige till Läro-Statens hörande personer	292	3650	{
Pedeller, Klockare och Kyrkobetjening	3362		
Studerande vid Academier och Skolungdom	1	1	10
Till Civil-Statens hörande högre och lägre Embetsmän	4407	5738	{
Magistraternes och Städernes enskilda d:o	339		
Vakt- och Fångbetjening	1006		
Till Militaire-Statens hörande Officerare	841	837	1
Under-Officerare och Gemenskapen	25,407	25,129	13
Handlande Borgerskap	2993	2741	1
Dithörande Betjeningen i och för handeln	232	216	4
Bruks- och Fabriks-Egare	1884	1763	
Mästare	4401	4697	
Contorister och Betjening	12,233	12,039	13
Konstnärer och Handverkare	14,203	14,190	3
Gesäller, Lärqossar och Betjening	3428	3425	24
Sjöfarande Skeppare och Sjömän	4446	5036	{
Lotsar och Fyrbåksvaktare	593		
Diverse Personer, som ej till någon Titel kunnat hänföras	2876	10,338	{
Järnbärare, Tornvaktare och Arbetskarlar, Roddare m. fl.	7333		
Privatorum Tjenstefolk, oberäknadt nedanupptagne Jordbruket tillhörande Betjening	1840	1818	9
Afskedstagne, eller ur tjenst gånge, eller som upphört med handel m. m.	13,077	13,111	4
Hos Föräldrar hemma vistande Söner öfver 15 års ålder, utan något visst antaget yrke eller tjenst	458	457	16
Dito Barn under denna ålder, utom dem, som höra till Bonde-Ståndet och här nedan särskildt äro upptagne			18
Fattighjon	5883	5948	14
Fader- och Moder-lösa samt Fosterbarn	2		1
Fångar	351	89	2
Åldrige Bönder, som upphört med Landtbruk och Fiske	23,649	23,657	13
Vanföre Inhyser- och Backstugu-hjon	8649	8598	5
Hustrur, som sköta annat näringsfång än deras män		301	
som lefva ensamme		2400	
Enkor, som lefva af egna medel			
som lefva af arbete			
Ogifta Qvinnor, som bo för sig sjelfva och lefva af arbete			
Sällskaps-fruntimmer			
Mosaiske Trosbekännare	110	112	
Utländningar	134	122	
Jordbrukande Possessionater, Arrendatorer och Bergsmän	5099	5099	
D:o Gästgifvare och Krögare	2003	2005	
I och för Jordbruket antagen Betjening	7970	7858	16
Bönder på egna och andras hemman samt Nybyggare	190,270	190,271	16
Jord- och Stat-Torpare	94,566	94,605	7
Skärbönder och Fiskare	2860	2859	
Arbetsföre Backstugu- och Inhysehjon	54,023	53,976	11
Söner, Drängar, Döttrar och Pigor i Allmogens hus och tjenst	11,719	11,585	400
Enkor, skrifna för Gårdsbruk			
Lapp-Allmoge	1150	1151	
Barn hos Ogifta Mödrar	7372	7604	
Än d:o hörande till Bonde-Ståndet	2308	2330	
Än d:o till Lapphjonen	11	8	
Summa	516,261	517,986	632

Sta.	Barn, Ogifta Män och Enklingar öfver 10 år.	Enkor.	Ogifta och Barn af Qvinno- kønnet, öfver 10 år.	Barn under 10 års ålder.		Summa.	
				Gossar.	Flickor.	m.	q.
2164	1250	—	—	—	—	3421	2164
3650	529	—	—	—	—	821	3650
	799	—	—	—	—	4161	
1	10,957	—	—	11,481	—	22,439	1
5738	2901	—	—	—	—	7308	5738
	188	—	—	—	—	527	
	379	—	—	—	—	1385	
837	1086	—	—	—	—	1927	837
25,129	13,291	—	—	—	—	38,698	25,129
2741	1360	340	—	—	—	4353	3081
216	4329	52	93	—	—	4561	361
1763	351	143	—	—	—	2235	1906
4697	718	—	—	—	—	5119	4697
12,039	13,294	682	1770	—	—	25,527	14,491
14,190	3488	785	—	—	—	17,691	14,975
3425	24,616	78	279	—	—	28,044	3782
5036	5001	—	—	—	—	9447	5036
	198	—	—	—	—	791	
10,338	1958	—	—	—	—	4834	10,338
	2810	—	—	—	—	10,143	
1818	9301	2427	74,625	—	—	11,141	78,870
13,111	4904	—	—	—	—	17,981	13,111
457	16,686	—	—	—	—	17,144	457
	18,975	—	42,909	74,485	78,928	93,460	121,837
5948	14,820	28,181	16,509	—	—	20,703	50,638
	1459	—	1305	4087	4555	5548	5860
89	2691	52	628	—	—	3042	769
23,657	13,461	—	—	—	—	37,110	23,657
8598	5672	—	—	—	—	14,321	8598
301	—	—	—	—	—	—	301
2400	—	—	—	—	—	—	2400
	—	35,796	5895	10,370	11,590	10,370	84,684
	—	31,403	—	—	—	—	26,355
	—	—	26,355	—	—	—	2041
	—	—	2041	—	—	—	—
112	223	47	222	103	94	436	475
122	157	23	68	80	67	371	280
5099	894	818	—	—	—	5993	5917
2005	167	—	—	—	—	2170	2005
7858	16,231	—	—	—	—	24,201	7858
190,271	16,220	—	—	—	—	206,490	190,271
94,605	7952	—	—	—	—	102,518	94,605
2859	506	—	—	—	—	3366	2859
53,976	11,203	—	—	—	—	65,226	53,976
11,585	400,952	—	413,785	244,543	247,576	657,214	672,946
	—	49,164	862	11,940	12,519	11,940	62,545
1151	772	326	905	639	633	2561	3015
	—	—	1346	9691	8596	9691	9942
517,986	632,749	150,317	589,597	367,419	364,558	1,516,429	1,622,458

S.a.

m.	q.
425,059.	516,519.

S.a.

m.	q.
1,081,679.	1,095,997.

Litt. D.
I hela Riket.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
44,765	42,879	87,644	... År 1816 ...	28,639	27,586	56,225	23,069
42,743	41,078	83,821	... 1817 ...	30,456	30,407	60,863	20,938
43,971	41,743	85,714	... 1818 ...	31,410	30,335	61,745	21,427
43,168	41,082	84,250	... 1819 ...	35,182	34,699	69,881	20,795
43,514	41,327	84,841	... 1820 ...	31,572	31,358	62,930	21,722
218,161	208,109	426,270	... Summa ...	157,259	154,385	311,644	107,951
47,156	44,916	92,072	... 1821 ...	33,466	32,950	66,416	22,890
48,242	46,067	94,309	... 1822 ...	30,500	28,890	59,390	24,431
50,187	48,072	98,259	... 1823 ...	28,802	27,265	56,067	23,993
47,793	45,784	93,577	... 1824 ...	29,071	27,185	56,256	23,907
51,095	49,220	100,315	... 1825 ...	29,180	27,285	56,465	23,640
244,473	234,059	478,532	... Summa ...	151,019	143,575	294,594	118,861
49,614	47,511	97,125	... 1826 ...	32,387	30,640	63,027	22,525
45,035	43,103	88,138	... 1827 ...	32,963	31,957	64,920	20,339
48,635	46,719	95,354	... 1828 ...	39,226	36,634	75,860	22,440
50,838	48,650	99,488	... 1829 ...	42,415	40,304	82,719	22,581
48,469	46,157	94,626	... 1830 ...	35,783	33,465	69,251	22,222
242,591	232,140	474,731	... Summa ...	182,774	173,003	355,777	110,107
45,374	42,879	88,253	... 1831 ...	38,404	36,870	75,274	19,983
46,036	43,826	89,862	... 1832 ...	34,063	34,015	68,078	20,935
51,316	48,993	100,309	... 1833 ...	32,637	31,310	63,947	23,029
51,293	48,938	100,231	... 1834 ...	39,105	37,189	76,294	23,803
50,172	47,972	98,144	... 1835 ...	28,495	27,243	55,738	22,533
244,191	232,603	476,799	... Summa ...	172,704	166,627	339,331	110,283
49,588	47,269	96,857	... 1836 ...	30,967	29,796	60,763	21,816
48,246	46,370	94,616	... 1837 ...	38,621	36,990	75,611	21,153
46,140	44,425	90,565	... 1838 ...	38,020	36,003	74,309	18,774
46,685	44,678	91,363	... 1839 ...	36,915	35,125	72,988	20,963
50,268	47,892	98,160	... 1840 ...	32,370	30,825	63,555	22,071
40,927	230,634	471,561	... Summa ...	176,957	170,534	347,226	104,777
7,613,7	45,502,0	93,115,7	Medium af alla dessa 25 åren	33,628,5	32,314,4	65,942,9	22,079,2

D:o af Nativitets-
öfverskottet ... 13,985,2 13,187,6 27,172,8

I Stockholms Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1715	1626	3341	... År 1816.	1256	1078	2334	910
1549	1506	3055 1817.	1322	1226	2548	871
1532	1458	2990 1818.	1379	1276	2655	820
1502	1335	2837 1819.	1732	1675	3407	732
1293	1232	2525 1820.	1875	1861	3736	750
7591	7157	14,748 S:a.	7564	7116	14,680	4083
1490	1466	2956 1821.	1612	1594	3206	971
1712	1651	3363 1822.	1305	1186	2491	1134
1831	1677	3508 1823.	1222	1134	2356	979
1704	1624	3328 1824.	1245	1101	2346	967
1768	1783	3551 1825.	1201	1077	2278	978
8505	8201	16,706 S:a.	6585	6092	12,677	5029
1835	1781	3616 1826.	1447	1285	2732	948
1525	1524	3049 1827.	1668	1529	3197	849
1726	1625	3351 1828.	1922	1758	3680	871
1582	1527	3109 1829.	2112	1948	4060	836
1681	1519	3200 1830.	1681	1543	3224	891
8349	7976	16,325 S:a.	8830	8063	16,893	4395
1654	1585	3239 1831.	1793	1681	3474	808
1577	1474	3051 1832.	1547	1504	3051	925
1863	1796	3659 1833.	1468	1278	2746	951
1816	1676	3492 1834.	1638	1470	3128	893
1675	1663	3338 1835.	1207	1066	2273	894
8585	8194	16,779 S:a.	7673	6999	14,672	4471
1695	1583	3278 1836.	1265	1178	2443	841
1636	1616	3252 1837.	1611	1514	3125	801
1550	1555	? 1838.	2095	1925	4020	721
1710	1498	 1839.	1342	1339	2681	758
1711	1591	32 1840.	1243	1159	2402	834
8302	784	3,145 S:a.	7556	7115	14,671	3955
1653,3	1574,8	3228,1	Medium af alla dessa 25 åren	1528,3	1415,4	2943,7	877,3

d:o af Nativitets-

öfverskottet 125,0 159,4 284,4

Uppsala Län.

Födde.				Döde		
m.	q.	S:a.		m.	q.	S.
1358	1325	2683	... År 1816.	980	902	1882
1258	1223	2481	... 1817.	1064	1020	2084
1214	1202	2416	... 1818.	930	946	1876
1185	1056	2241	... 1819.	1251	1222	2473
1125	1071	2196	... 1820.	1188	1151	2339
6140	5877	12,017	... S:a	5413	5291	10,704
1255	1201	2456	... 1821.	1309	1252	2561
1270	1330	2600	... 1822.	990	966	1956
1289	1251	2540	... 1823.	854	852	1706
1313	1317	2630	... 1824.	821	821	1642
1372	1399	2771	... 1825.	920	833	1753
6499	6498	12,997	... S:a	4894	4724	9618
1400	1361	2761	... 1826.	1123	1087	2210
1202	1166	2368	... 1827.	1016	1013	2029
1296	1194	2490	... 1828.	1262	1113	2375
1216	1258	2474	... 1829.	1302	1279	2581
1274	1118	2392	... 1830.	1091	1066	2157
6388	6097	12,485	... S:a	5794	5558	11,352
1297	1192	2489	... 1831.	1120	1118	2238
1279	1186	2465	... 1832.	1064	1090	2154
1439	1295	2734	... 1833.	958	901	1859
1360	1272	2632	... 1834.	1042	1001	2043
1323	1313	2636	... 1835.	857	833	1690
6698	6258	12,956	... S:a	5041	4943	9984
1317	1230	2547	... 1836.	921	871	1792
1153	1215	2368	... 1837.	1260	1220	2480
1218	1189	2407	... 1838.	1201	1232	2433
1113	1141	2254	... 1839.	1118	1201	2319
1282	1179	2461	... 1840.	868	825	1693
6083	5954	12,037	... S:a	5368	5349	10,717
1272,3	1227,4	2499,7	Medium af alla dessa 25 åren	1060,4	1034,6	2095,0

d:o af Nativitets-
öfverskottet 211,9 192,8 404,7

Södermanlands Län.

			Döde.			Vigde par.
f.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1591	3196	...	1048	1059	2107	859
1528	3059	... År 1816	1123	1177	2300	810
1483	3108	... 1817	1078	1019	2097	814
	2930	... 1818	1247	1197	2444	760
	2885	... 1819	1209	1251	2460	793
		... 1820				
7725	153	... S:a	5705	5703	11,408	4036
1722	1557	... 1821	1267	1242	2509	873
1744	1729	... 1822	1149	1080	2229	976
1715	1777	... 1823	1121	985	2106	967
1781	1685	... 1824	1026	967	1993	996
1849	1769	... 1825	1124	1090	2214	938
		... S:a				
8811	8517	... 1826	5687	5364	11,051	4750
1777	1696	... 1827	1211	1000	2211	847
1595	1480	... 1828	1150	1099	2249	863
1698	1645	... 1829	1686	1651	3337	863
1747	1674	... 1830	1554	1517	3071	892
1640	1594	... S:a	1227	1220	2447	846
		... 1831				
8457	8089	... 1832	6828	6487	13,315	4311
1585	1548	... 1833	1202	1244	2446	890
1562	1588	... 1834	1241	1202	2443	823
1805	1756	... 1835	1124	1034	2158	923
1853	1729	... S:a	1297	1207	2504	944
1798	1676	... 1836	1082	1050	2132	850
		... 1837				
8603	8297	... 1838	5946	5737	11,683	4430
1759	1709	... 1839	1146	1170	2316	909
1769	1686	... 1840	1397	1402	2799	806
1596	1668	... S:a	1562	1611	3173	763
1708	1588	... 1836	1119	1103	2222	773
1743	1682	... 1837	1096	1070	2166	837
		... 1838				
8575	8333	... 1839	6320	6356	12,676	4088
		... 1840				
1686,8	1627,6	... S:a				
		Medium				
		af alla dessa 25 åren	1219,4	1185,9	2405,3	865,0

do af Nativitets-
öfverskottet 467,4 441,7 909,1

Östergötlands Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2912	2755	5667	... År 1816	1944	1914	3858	1524
2905	2799	5704	... 1817	2147	2164	4311	1366
3045	2892	5937	... 1818	1822	1830	3652	1470
2861	2719	5580	... 1819	2197	2134	4331	1511
2645	2543	5188	... 1820	2073	2104	4177	1435
14,368	13,708	28,076	... S:a	10,183	10,146	20,329	7306
3022	2894	5916	... 1821	2570	2672	5242	1567
3269	3111	6380	... 1822	2119	2050	4169	1685
3252	3161	6413	... 1823	1832	1767	3599	1709
3123	3006	6129	... 1824	1799	1714	3513	1666
3183	3230	6413	... 1825	1771	1702	3473	1650
15,849	15,402	31,251	... S:a	10,091	9905	19,996	8277
3142	3098	6240	... 1826	2179	2195	4374	1567
2767	2707	5474	... 1827	2108	2215	4323	1498
3080	3040	6120	... 1828	2835	2744	5579	1603
3250	3091	6341	... 1829	3034	3218	6252	1590
3157	2951	6108	... 1830	2496	2237	4733	1670
15,396	14,887	30,283	... S:a	12,652	12,609	25,261	7928
2936	2836	5772	... 1831	2473	2497	4970	1446
2980	2827	5807	... 1832	2312	2333	4645	1476
3312	3196	6508	... 1833	1975	2013	3988	1622
3417	3293	6710	... 1834	2311	2364	4675	1688
3097	3024	6121	... 1835	1947	1863	3810	1493
15,742	15,176	30,918	... S:a	11,018	11,070	22,088	7725
3232	2994	6226	... 1836	1837	1737	3574	1466
3166	3015	6181	... 1837	2647	2582	5229	1502
3162	3029	6191	... 1838	2282	2191	4473	1412
3193	3021	6214	... 1839	2198	2233	4431	1494
3346	3060	6406	... 1840	2099	2034	4133	1544
16,099	15,119	31,218	... S:a	11,063	10,777	21,840	7418
3098,2	2971,7	6069,9	Medium af alla dessa 25 åren	2200,3	2180,3	4380,6	1546,2

d:o af Nativitets-
öfverskottet 897,9 791,4 1689,3

Jönköpings Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2045	2003	4048	... År 1816.	1150	1167	2317	1087
2035	1881	3916 1817.	1330	1336	2666	1004
2139	2021	4160 1818.	1364	1358	2722	1040
2018	1910	3928 1819.	1828	1910	3738	1031
1941	1937	3878 1820.	1386	1375	2761	1027
10,178	9752	19,930 S:a.	7058	7146	14,204	5189
2216	2049	4265 1821.	1285	1383	2668	1050
2267	2096	4363 1822.	1313	1282	2595	1110
2322	2297	4619 1823.	1149	1155	2304	1093
2199	2097	4296 1824.	1250	1229	2479	1070
2422	2276	4698 1825.	1136	1123	2259	1013
11,426	10,815	22,241 S:a.	6133	6172	12,305	5336
2258	2249	4507 1826.	1338	1250	2588	1007
2069	1978	4047 1827.	1128	1151	2279	906
2403	2238	4641 1828.	1354	1290	2644	1071
2498	2347	4845 1829.	1742	1708	3450	982
2275	2185	4460 1830.	1404	1373	2777	982
11,503	10,997	22,500 S:a.	6966	6772	13,738	4948
2235	2061	4296 1831.	1362	1311	2673	999
2299	2153	4452 1832.	1262	1317	2579	1003
2450	2256	4706 1833.	1396	1432	2828	1036
2439	2281	4720 1834.	1645	1646	3291	1061
2349	2234	4583 1835.	1173	1114	2287	1008
11,772	10,985	22,757 S:a.	6838	6820	13,658	5107
2251	2263	4514 1836.	1276	1304	2580	993
2260	2166	4426 1837.	1566	1542	3108	930
2178	2070	4248 1838.	1414	1322	2736	822
2137	2077	4214 1839.	1407	1442	2849	895
2533	2291	4824 1840.	1394	1423	2817	957
11,359	10,867	22,226 S:a.	7057	7033	14,090	4597
2249,5	2136,6	4386,1	Medium af alla dessa 25 åren	1262,1	1357,7	2719,8	1007,1

d:o af Nativitets-
öfverskottet 887,4 778,9 1666,3

Kronobergs Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1625	1654	3279	... År 1816 ...	1167	1207	2374	838
1823	1649	3472	... 1817 ...	1066	1116	2182	795
1877	1692	3569	... 1818 ...	1172	1202	2374	892
1709	1697	3406	... 1819 ...	1324	1306	2630	762
1732	1680	3412	... 1820 ...	973	952	1925	728
8766	8372	17,138	... S:a ...	5702	5783	11,485	4015
1788	1766	3554	... 1821 ...	1229	1190	2419	754
1841	1725	3566	... 1822 ...	1143	1155	2298	914
1995	1854	3849	... 1823 ...	1053	1052	2105	877
1990	1798	3788	... 1824 ...	1039	1055	2094	877
1922	1935	3857	... 1825 ...	1067	1028	2095	845
9536	9078	18,614	... S:a ...	5531	5480	11,011	4267
1947	1820	3767	... 1826 ...	1227	1314	2541	757
1773	1744	3517	... 1827 ...	1081	1133	2214	712
1977	1927	3904	... 1828 ...	1199	1155	2354	810
2049	2025	4074	... 1829 ...	1511	1481	2992	823
2059	2021	4080	... 1830 ...	1361	1355	2716	777
9805	9537	19,342	... S:a ...	6379	6438	12,817	3879
1862	1791	3653	... 1831 ...	1388	1385	2773	725
1959	1790	3749	... 1832 ...	1270	1344	2614	768
2042	1928	3970	... 1833 ...	1332	1240	2572	813
2157	2012	4169	... 1834 ...	1188	1133	2321	847
1971	1896	3867	... 1835 ...	1063	1050	2113	778
9991	9417	19,408	... S:a ...	6241	6152	12,393	3931
1994	1891	3885	... 1836 ...	1130	1095	2225	765
2105	1941	4046	... 1837 ...	1341	1301	2642	735
1870	1807	3677	... 1838 ...	1280	1288	2568	689
1993	1933	3926	... 1839 ...	1158	1197	2355	850
2199	2142	4341	... 1840 ...	1149	1203	2352	846
10,161	9714	19,875	... S:a ...	6058	6084	12,142	3885
1930,4	1844,7	3775,1	Medium af alla dessa 25 åren	1196,4	1197,5	2393,9	799,1

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 734,0 647,2 1381,2

Calmar Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2501	2380	4881	... År 1816.	1384	1452	2836	1273
2598	2453	5051 1817.	1533	1629	3162	1276
2568	2461	5029 1818.	1605	1634	3239	1246
2636	2454	5090 1819.	1690	1691	3381	1293
2494	2312	4806 1820.	1524	1591	3115	1334
12,797	12,060	24,857 S:a.	7736	7997	15,733	6422
2645	2590	5235 1821.	1933	1982	3915	1347
2945	2738	5683 1822.	1611	1515	3126	1368
2912	2739	5651 1823.	1553	1576	3129	1498
2802	2747	5549 1824.	1504	1489	2993	1453
2878	2830	5708 1825.	1553	1542	3095	1459
14,182	13,644	27,826 S:a.	8154	8104	16,258	7125
2848	2757	5605 1826.	1690	1678	3368	1429
2596	2416	5012 1827.	1986	2134	4120	1233
2610	2569	5179 1828.	2611	2603	5214	1338
2913	2827	5740 1829.	2707	2616	5323	1377
2928	2699	5627 1830.	1941	1944	3885	1471
13,895	13,268	27,163 S:a.	10,935	10,975	21,910	6848
2798	2616	5414 1831.	1995	2047	4042	1319
2671	2571	5242 1832.	2135	2183	4318	1366
2987	2966	5953 1833.	2001	1966	3967	1426
3126	3014	6140 1834.	1988	1823	3811	1521
2880	2754	5634 1835.	1675	1668	3343	1334
14,462	13,921	28,383 S:a.	9794	9687	19,481	6966
3025	2768	5793 1836.	1614	1687	3301	1399
3005	3032	6037 1837.	2181	2151	4332	1385
2892	2727	5619 1838.	1846	1829	3675	1321
3180	2884	6064 1839.	1913	1836	3749	1395
3234	3206	6440 1840.	1999	1905	3904	1483
15,336	14,617	29,953 S:a.	9553	9403	18,961	6983
2826,9	2700,4	5527,3	Medium af alla dessa 25 åren	1846,9	1846,8	3693,7	1373,7

d:o af Nativitets-
öfverskottet 980,0 853,6 1833,6

Gottlands Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
520	471	991	... År 1816.	353	345	698	304
516	474	990	... 1817.	343	375	718	343
487	527	1014	... 1818.	321	308	629	322
554	504	1058	... 1819.	302	324	626	283
493	472	970	... 1820.	273	316	589	309
2575	2448	5023	... S:a ...	1592	1668	3260	1561
596	506	1102	... 1821.	280	268	548	307
558	529	1087	... 1822.	329	310	639	330
576	592	1168	... 1823.	362	318	680	358
557	567	1124	... 1824.	358	360	718	357
584	561	1145	... 1825.	338	357	695	318
2871	2755	5626	... S:a ...	1667	1613	3280	1670
627	552	1179	... 1826.	315	311	626	286
562	460	1022	... 1827.	353	350	703	273
556	476	1032	... 1828.	487	432	919	254
574	515	1089	... 1829.	454	423	877	240
494	496	990	... 1830.	384	400	784	289
2813	2499	5312	... S:a ...	1993	1916	3909	1342
539	518	1057	... 1831.	434	462	896	316
532	527	1059	... 1832.	455	555	1010	285
649	589	1238	... 1833.	384	395	779	311
593	598	1191	... 1834.	399	374	773	367
597	545	1142	... 1835.	332	365	697	309
2910	2777	5687	... S:a ...	2004	2151	4155	1588
581	578	1159	... 1836.	305	286	591	299
549	540	1089	... 1837.	329	385	714	259
508	474	982	... 1838.	406	427	833	218
525	487	1012	... 1839.	426	422	848	261
591	569	1160	... 1840.	396	433	829	276
2754	2648	5402	... S:a ...	1862	1953	3815	1313
556,9	525,1	1082,0	Medium af alla dessa 25 åren	364,9	372,0	736,9	299,0

D:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 192,0 153,1 345,1

Blekinge Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1468	1351	2819	. . . År 1816	931	796	1727	712
1456	1393	2849 1817	926	945	1871	675
1560	1445	3005 1818	1058	1016	2074	678
1506	1481	2987 1819	997	1032	2029	669
1488	1439	2927 1820	878	762	1640	662
7478	7109	14,587 S:a	4790	4551	9341	3396
1580	1532	3112 1821	1226	1253	2479	659
1653	1523	3176 1822	972	861	1833	692
1613	1603	3216 1823	904	847	1751	696
1570	1556	3126 1824	886	744	1630	709
1678	1673	3351 1825	995	939	1934	714
8094	7887	15,981 S:a	4983	4644	9627	3470
1560	1515	3075 1826	1109	1119	2228	639
1426	1240	2666 1827	1333	1287	2620	539
1419	1368	2787 1828	1662	1608	3270	551
1509	1418	2927 1829	1544	1471	3015	683
1504	1475	2979 1830	1203	1057	2260	691
7418	7016	14,434 S:a	6851	6542	13,393	3103
1568	1449	3017 1831	1202	1071	2273	607
1365	1419	2784 1832	1111	1135	2246	616
1651	1614	3265 1833	1108	1056	2164	638
1657	1635	3292 1834	1161	1113	2274	754
1560	1498	3058 1835	894	846	1740	625
7801	7615	15,416 S:a	5476	5221	10,697	3240
1499	1512	3011 1836	1111	1035	2146	617
1595	1581	3176 1837	1166	1105	2271	661
1539	1580	3119 1838	1121	1080	2201	577
1603	1634	3237 1839	1056	952	2008	716
1746	1654	3400 1840	989	983	1972	720
7982	7961	15,943 S:a	5443	5155	10,598	3291
1550,9	1503,5	3054,4	Medium af alla dessa 25 åren	1101,7	1044,5	2146,2	660

d:o af Nativitets-
öfverskottet 449,2 459,0 908,2

Christianstads Lån.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2143	2126	4269	... År 1816.	1260	1276	2536	1105
2185	2156	4341	... 1817.	1306	1486	2992	1076
2318	2184	4502	... 1818.	1782	1506	3088	1064
2243	2191	4439	... 1819.	1672	1732	3404	1074
2302	2219	4521	... 1820.	1363	1385	2748	1180
11,196	10,876	22,072	... S:a.	7333	7385	14,768	5499
2451	2334	4835	... 1821.	1876	1888	3764	1168
2496	2408	4904	... 1822.	1537	1569	3106	1178
2605	2465	5070	... 1823.	1505	1425	2933	1203
2526	2386	4912	... 1824.	1377	1274	2651	1246
2747	2537	5334	... 1825.	1464	1423	2887	1201
12,825	12,230	25,055	... S:a.	7759	7582	15,341	5996
2435	2517	5001	... 1826.	1586	1550	3136	1149
2361	2301	4662	... 1827.	1774	1770	3544	995
2581	2421	5002	... 1828.	1849	1823	3672	1039
2721	2479	5200	... 1829.	2406	2289	4695	1058
2526	2362	4888	... 1830.	1940	1991	3931	1214
12,674	12,080	24,754	... S:a.	9555	9423	18,978	5355
2548	2312	4860	... 1831.	2252	2253	4505	1043
2359	2108	4467	... 1832.	2085	2095	4180	1036
2686	2679	5365	... 1833.	1690	1602	3292	1211
2873	2635	5558	... 1834.	1460	1369	2829	1253
2645	2537	5182	... 1835.	1371	1340	2711	1078
13,111	12,321	25,432	... S:a.	8858	8659	17,517	5621
2713	2599	5312	... 1836.	1703	1627	3330	998
2666	2559	5225	... 1837.	1898	1768	3666	1013
2445	2446	4891	... 1838.	2040	1864	3904	1008
2626	2511	5137	... 1839.	1629	1648	3277	1230
2880	2762	5642	... 1840.	1604	1495	3099	1169
13,330	12,877	26,207	... S:a.	8874	8402	17,276	5418
2525,4	2415,4	4940,8	Medium af alla dessa 25 åren	1697,2	1658,0	3355,2	1115,6

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 828,2 757,4 1585,6

Malmöhus Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
3136	3036	6172	... År 1816.	1840	1805	3645	1562
2925	2901	5826	... 1817.	1809	1883	3692	1484
3106	3077	6183	... 1818.	2071	1972	4043	1483
3115	2952	6067	... 1819.	2214	2128	4342	1421
3263	3077	6340	... 1820.	2075	1901	3976	1587
15,545	15,043	30,588	... S:a.	10,009	9689	19,698	7537
3587	3199	6786	... 1821.	2365	2343	4708	1661
3477	3279	6756	... 1822.	1902	1874	3776	1748
3688	3587	7275	... 1823.	2045	1915	3960	1595
3477	3381	6858	... 1824.	1913	1836	3749	1679
3752	3599	7351	... 1825.	2038	1914	3952	1598
17,981	17,045	35,026	... S:a.	10,263	9882	20,145	8281
3717	3471	7188	... 1826.	2177	2039	4216	1612
3285	3193	6478	... 1827.	2488	2370	4858	1349
3496	3447	6943	... 1828.	2591	2425	5016	1517
3589	3479	7068	... 1829.	3107	2899	6006	1580
3492	3237	6729	... 1830.	2556	2443	4999	1588
17,579	16,827	34,406	... S:a.	12,919	12,176	25,095	7646
3436	3297	6733	... 1831.	3559	3256	6815	1439
3095	2862	5957	... 1832.	2898	2859	5757	1487
3865	3618	7483	... 1833.	2646	2572	5218	1653
3896	3724	7620	... 1834.	2185	1920	4105	1742
3666	3513	7179	... 1835.	1962	1875	3837	1580
17,958	17,014	34,972	... S:a.	13,250	12,482	25,732	7901
3827	3639	7466	... 1836.	2215	2166	4381	1476
3713	3546	7259	... 1837.	2461	2179	4640	1505
3530	3394	6924	... 1838.	2678	2347	5025	1383
3560	3526	7086	... 1839.	2564	2533	5097	1486
3996	3650	7646	... 1840.	2196	2063	4259	1715
18,626	17,755	36,381	... S:a.	12,114	11,288	23,402	7565
3507,6	3347,3	6854,9	Medium af alla dessa 25 åren	2342,2	2220,7	4562,9	1557,2

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 1165,4 1126,6 2292,0

Hollands Lan.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1299	1250	2549	... År 1816 ...	926	924	1850	684
1324	1276	2600	... 1817 ...	1037	1118	2155	692
1375	1286	2661	... 1818 ...	976	1060	2036	665
1259	1301	2560	... 1819 ...	1098	1151	2249	594
1294	1276	2570	... 1820 ...	998	1002	2000	674
6551	6389	12,940	... S:a ...	5035	5255	10,290	3309
1460	1461	2921	... 1821 ...	871	997	1868	672
1364	1346	2710	... 1822 ...	832	821	1653	657
1530	1504	3034	... 1823 ...	919	931	1850	673
1430	1399	2829	... 1824 ...	899	966	1865	644
1576	1431	3007	... 1825 ...	839	827	1666	638
7360	7141	14,501	... S:a ...	4360	4542	8902	3284
1509	1542	3051	... 1826 ...	977	1014	1991	684
1503	1367	2870	... 1827 ...	884	854	1738	553
1480	1397	2877	... 1828 ...	1148	1069	2217	731
1601	1512	3113	... 1829 ...	1306	1272	2578	663
1456	1424	2880	... 1830 ...	1235	1195	2430	648
7549	7242	14,791	... S:a ...	5550	5404	10,954	3279
1427	1303	2730	... 1831 ...	1336	1321	2657	591
1363	1357	2720	... 1832 ...	1044	1067	2111	518
1538	1397	2935	... 1833 ...	897	980	1877	719
1692	1534	3226	... 1834 ...	966	1022	1988	770
1522	1463	2985	... 1835 ...	851	859	1710	663
7542	7054	14,596	... S:a ...	5094	5249	10,343	3261
1561	1480	3041	... 1836 ...	937	980	1917	675
1515	1439	2954	... 1837 ...	1205	1180	2385	645
1399	1286	2685	... 1838 ...	1141	1075	2216	452
1322	1272	2594	... 1839 ...	1199	1226	2425	569
1510	1454	2964	... 1840 ...	1012	962	1974	579
7307	6931	14,238	... S:a ...	5494	5423	10,917	2920
1452,4	1390,2	2842,6	Medium af alla dessa 25 åren	1021,3	1034,9	2056,2	642,1

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 431,2 355,2 786,4

Götheborgs Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2646	2567	5213	... År 1816.	1528	1458	2986	1276
2504	2370	4874	... 1817.	1624	1535	3159	1126
2439	2288	4727	... 1818.	1617	1410	3027	1064
2197	2134	4331	... 1819.	2237	2183	4420	1005
2640	2472	5112	... 1820.	1899	2003	3902	1044
12,426	11,831	24,257	... S:a.	8905	8589	17,494	5515
2747	2586	5333	... 1821.	1674	1551	3225	1207
2585	2506	5091	... 1822.	1432	1400	2832	1334
2837	2740	5577	... 1823.	1506	1465	2971	1191
2573	2432	5005	... 1824.	1812	1693	3505	1251
2941	2832	5773	... 1825.	1745	1648	3393	1199
13,683	13,096	26,779	... S:a.	8169	7757	15,926	6182
2771	2746	5517	... 1826.	1628	1574	3202	1212
2644	2456	5100	... 1827.	1744	1664	3408	969
2609	2504	5113	... 1828.	2520	2213	4733	1010
2859	2779	5638	... 1829.	2310	2222	4532	1155
2669	2565	5234	... 1830.	2169	1933	4102	1046
13,552	13,050	26,602	... S:a.	10,371	9606	19,977	5392
2283	2168	4451	... 1831.	2547	2211	4758	791
2447	2462	4909	... 1832.	1698	1787	3485	972
2861	2746	5607	... 1833.	1642	1690	3332	1202
2650	2589	5239	... 1834.	3868	3913	7781	1195
2656	2537	5193	... 1835.	1468	1339	2807	1346
12,897	12,502	25,399	... S:a.	11,223	10,940	22,163	5506
2841	2558	5399	... 1836.	1616	1522	3138	1251
2502	2481	4985	... 1837.	1941	1835	3776	1121
2364	2308	4672	... 1838.	2210	2087	4297	849
2473	2342	4815	... 1839.	2077	1899	3976	958
2600	2514	5114	... 1840.	1556	1508	3064	1069
12,780	12,205	24,985	... S:a.	9400	8831	18,251	5248
			Medium				
2613,5	2507,4	5120,9	af alla dessa 25 åren	1922,7	1829,7	3752,4	1113,7

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 690,8 677,7 1368,5

Elfsborgs Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
3064	2938	6002	... År 1816	1620	1617	3237	1644
2934	2806	5740	... 1817	1862	1928	3790	1381
2936	2818	5754	... 1818	2073	2035	4108	1484
2859	2790	5649	... 1819	2431	2447	4878	1378
3089	3015	6104	... 1820	1962	1992	3954	1491
14,882	14,367	29,249	... S:a	9948	10,019	19,967	7378
3375	3151	6526	... 1821	1910	1825	3735	1611
3394	3236	6630	... 1822	1803	1799	3602	1633
3464	3366	6830	... 1823	1857	1784	3641	1474
3324	3045	6369	... 1824	1955	1844	3799	1545
3601	3455	7056	... 1825	1820	1640	3460	1629
17,158	16,253	33,411	... S:a	9345	8892	18,237	7892
3537	3221	6758	... 1826	1752	1620	3372	1520
2964	2858	5822	... 1827	1833	1822	3655	1202
3569	3430	6999	... 1828	2424	2265	4689	1436
3680	3514	7194	... 1829	2749	2645	5394	1527
3464	3298	6762	... 1830	2222	2030	4252	1413
17,214	16,321	33,535	... S:a	10,980	10,382	21,362	7098
2946	2719	5665	... 1831	2416	2315	4731	1208
3342	3257	6599	... 1832	1840	1962	3802	1382
3765	3507	7272	... 1833	2105	2030	4135	1544
3590	3569	7159	... 1834	3019	2819	5838	1597
3556	3452	7008	... 1835	1880	1780	3660	1567
17,199	16,504	33,703	... S:a	11,260	10,906	22,166	7298
3648	3364	7012	... 1836	1958	1855	3813	1516
3420	3282	6702	... 1837	2556	2491	5047	1429
3128	2966	6094	... 1838	2406	2262	4668	1134
2986	2998	5984	... 1839	2562	2556	5118	1302
3502	3338	6840	... 1840	2025	2062	4087	1422
16,684	15,948	32,632	... S:a	11,507	11,226	22,733	6803
3325,5	3175,7	6501,2	Medium af alla dessa 25 åren	2121,6	2057,0	4178,6	1458,7

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 1203,9 1118,7 2322,6

Skaraborgs Län.

Fö d d e.				Dö d e.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2742	2596	5338	... År 1816.	1684	1704	3388	1551
2535	2435	4970	... 1817.	1971	1842	3813	1314
2712	2531	5243	... 1818.	1999	1997	3996	1331
2639	2472	5111	... 1819.	2046	2020	4066	1271
2674	2462	5136	... 1320.	2010	1917	3927	1326
13,302	12,496	25,798	... S:a ...	9710	9480	19,190	6793
2784	2742	5526	... 1821.	1704	1717	3421	1350
2989	2874	5863	... 1822.	1892	1774	3666	1510
3043	3051	6094	... 1823.	1719	1653	3372	1374
2952	2752	5704	... 1824.	1837	1892	3729	1381
3193	2951	6144	... 1825.	1725	1698	3423	1246
14,961	14,370	29,331	... S:a ...	8877	8734	17,611	6861
2933	2681	5614	... 1826.	1865	1695	3560	1204
2396	2330	4726	... 1827.	1867	1843	3710	973
2974	2885	5859	... 1828.	2047	1972	4019	1262
3265	3057	6322	... 1829.	2456	2418	4874	1382
2844	2788	5632	... 1830.	1937	1909	3846	1239
14,412	13,741	28,153	... S:a ...	10,172	9837	20,009	6060
2396	2317	4713	... 1831.	2191	2126	4317	1112
2796	2658	5454	... 1832.	2044	1930	3974	1207
3201	2907	6108	... 1833.	1932	1839	3771	1349
3052	2918	5970	... 1834.	2138	1999	4137	1303
2882	2748	5630	... 1835.	1677	1638	3315	1258
14,327	13,548	27,875	... S:a ...	9982	9532	19,514	6229
2838	2699	5537	... 1836.	1764	1692	3456	1155
2840	2644	5484	... 1837.	2556	2599	5155	1280
2769	2633	5402	... 1838.	2157	2154	4311	1125
2693	2543	5236	... 1839.	2133	2141	4274	1307
2991	2824	5815	... 1840.	1935	1887	3822	1330
14,131	13,343	27,474	... S:a ...	10,545	10,473	21,018	6197
2845,3	2699,9	5545,2	Medium af alla dessa 25 åren	1971,4	1922,2	3893,6	1286,6

d:o af Nativitets-
öfverskottet 873,9 777,7 1651,6

Wästmanlands Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1535	1383	2918	... År 1816.	1118	1067	2185	852
1387	1373	2760	... 1817.	1114	1108	2222	702
1469	1318	2787	... 1818.	1134	1063	2197	648
1324	1257	2581	... 1819.	1247	1126	2373	683
1361	1294	2655	... 1820.	1161	1217	2378	663
7076	6625	13,701	... S:a.	5774	5581	11,355	3548
1354	1300	2654	... 1821.	1306	1297	2603	702
1526	1451	2977	... 1822.	1111	1024	2135	792
1483	1369	2852	... 1823.	1025	992	2017	771
1396	1333	2729	... 1824.	1001	894	1895	730
1560	1474	3034	... 1825.	934	880	1814	722
7319	6927	14,246	... S:a.	5377	5087	10,464	2717
1400	1368	2768	... 1826.	1130	1039	2169	663
1269	1192	2461	... 1827.	1246	1246	2492	673
1360	1300	2660	... 1828.	1357	1276	2633	766
1392	1310	2702	... 1829.	1520	1492	3012	745
1300	1303	2603	... 1830.	1122	1029	2151	751
6721	6473	13,194	... S:a.	6375	6082	12,457	3598
1260	1324	2584	... 1831.	1237	1247	2484	610
1318	1264	2582	... 1832.	1035	1084	2119	708
1402	1313	2715	... 1833.	1006	991	1997	775
1390	1363	2753	... 1834.	1224	1168	2392	733
1412	1375	2787	... 1835.	971	970	1941	708
6782	6639	13,421	... S:a.	5473	5460	10,933	3534
1384	1416	2800	... 1836.	926	993	1919	721
1344	1232	2576	... 1837.	1357	1376	2733	733
1292	1291	2583	... 1838.	1323	1319	2642	609
1362	1296	2658	... 1839.	1143	1165	2308	645
1314	1320	2634	... 1840.	1002	1012	2014	651
6696	6555	13,251	... S:a.	5751	5865	11,616	3359
1333,7	1328,8	2712,5	Medium af alla dessa 25 åren	1150,0	1123,0	2273,0	710,2

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 233,7 205,8 439,5

Kopparbergs Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2107	1853	3960 År 1816	1392	1210	2602	1037
1648	1561	3209 1817	1351	1410	2761	799
1724	1595	3319 1818	1474	1459	2933	965
1924	1797	3721 1819	1411	1421	2832	996
1894	1741	3635 1820	1173	1132	2305	1052
9297	8547	17,844 S:a	6801	6632	13,433	4849
2007	1946	3953 1821	1362	1314	2676	1023
2052	1891	3943 1822	1452	1334	2786	1083
2189	1970	4159 1823	1372	1266	2638	1128
1996	1973	3969 1824	1198	1161	2359	1034
2188	1973	4161 1825	1343	1111	2454	1087
10,432	9753	20,185 S:a	6727	6186	12,913	5355
2087	1987	4074 1826	1294	1246	2540	985
2041	1979	4020 1827	1281	1200	2481	999
2040	1938	3978 1828	1409	1282	2691	1048
2166	2081	4247 1829	1632	1551	3183	989
2046	1904	3950 1830	1415	1312	2727	905
10,380	9889	20,269 S:a	7031	6591	13,622	4926
1825	1737	3562 1831	1448	1420	2868	839
1996	1791	3787 1832	1309	1243	2552	873
1940	1991	3931 1833	1317	1211	2528	1005
1955	1889	3844 1834	1497	1423	2920	1024
2045	2030	4075 1835	1188	1145	2333	998
9761	9438	19,199 S:a	6759	6442	13,201	4739
1964	1836	3800 1836	1302	1293	2595	1000
1884	1799	3683 1837	1873	1760	3633	854
1726	1702	3428 1838	1695	1723	3418	766
1712	1669	3381 1839	2582	2655	5237	932
1967	1964	3931 1840	1627	1560	3187	997
9253	8970	18,223 S:a	9079	8991	18,070	4549
1964,9	1863,9	3828,8	Medium af alla dessa 25 åren	1455,9	1393,7	2849,6	976,7

d:o af Nativitets-
öfverskottet 509,0 470,2 979,2

Wärmelands Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
2851	2541	5392	. . . År 1816.	1679	1528	3207	1359
2447	2291	4738 1817.	1745	1697	3442	1111
2471	2432	4903 1818.	1897	1848	3745	1274
2720	2558	5278 1819.	2080	1985	4065	1219
2748	2528	5276 1820.	1833	1814	3647	1371
13,237	12,350	25,587 S:a	9234	8872	18,106	6334
3077	2869	5946 1821.	1949	1761	3710	1390
3148	3030	6178 1822.	1755	1642	3397	1601
3340	3033	6373 1823.	1589	1459	3048	1499
3041	2895	5936 1824.	1596	1425	3021	1459
3291	3196	6487 1825.	1598	1384	2982	1466
15,897	15,023	30,920 S:a	8487	7671	16,158	7413
3030	2834	5864 1826.	2056	1988	4044	1123
2587	2491	5078 1827.	1910	1879	3789	1132
3016	2897	5913 1828.	2048	1937	3985	1370
3409	3114	6523 1829.	2049	1885	3934	1358
3006	2904	5910 1830.	1774	1632	3406	1246
15,048	14,240	29,288 S:a	9837	9321	19,158	6229
2540	2437	4977 1831.	1919	1814	3733	1907
3067	2816	5883 1832.	1662	1573	3235	1301
3410	3285	6695 1833.	1555	1459	3014	1327
3224	3195	6419 1834.	1923	1788	3711	1498
3364	3196	6560 1835.	1619	1597	3216	1320
15,605	14,929	30,534 S:a	8678	8231	16,909	6453
3066	2939	6005 1836.	1865	1797	3662	1292
3003	2779	5782 1837.	1997	1813	3810	1122
2709	2535	5244 1838.	1862	1732	3594	944
2863	2684	5547 1839.	2021	1974	3995	1156
3078	3021	6099 1840.	1806	1636	3442	1206
14,719	13,958	28,677 S:a	9551	8952	18,503	5720
2980,2	2820,0	5800,2	Medium af alla dessa 25 åren	1831,5	1721,9	3553,4	1286,0

D:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 1148,7 1098,1 2246,8

Nerrikes Lån.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1787	1781	3568	... År 1816.	1232	1225	2457	845
1743	1656	3399	... 1817.	1357	1382	2739	834
1778	1704	3482	... 1818.	1456	1372	2828	822
1780	1684	3464	... 1819.	1393	1309	2702	833
1893	1804	3697	... 1820.	1170	1160	2330	878
8981	8629	17,610	... S:a.	5608	6448	13,056	4212
2025	1906	3931	... 1821.	1368	1364	2732	979
2080	2051	4131	... 1822.	1192	1159	2351	990
2088	1989	4077	... 1823.	1070	1033	2103	1005
1942	1851	3793	... 1824.	1088	964	2052	890
2164	2120	4284	... 1825.	1070	1013	2083	925
10,299	9917	20,216	... S:a.	5788	5533	11,321	4789
1948	1937	3885	... 1826.	1234	1120	2354	844
1924	1852	3776	... 1827.	1189	1126	2315	872
2109	1955	4064	... 1828.	1391	1233	2624	952
2230	2168	4398	... 1829.	1324	1231	2555	867
2066	1966	4032	... 1830.	1231	1155	2386	876
10,277	9878	20,155	... S:a.	6369	5865	12,234	4411
1867	1728	3595	... 1831.	1405	1308	2713	797
2008	1867	3875	... 1832.	1217	1259	2476	829
2090	1962	4052	... 1833.	1125	1085	2210	872
2102	1927	4029	... 1834.	1293	1195	2488	912
2091	1903	3994	... 1835.	1186	1087	2273	825
10,158	9387	19,545	... S:a.	6226	5934	12,160	4235
1956	1950	3906	... 1836.	1273	1215	2488	857
1943	1869	3812	... 1837.	1492	1420	2912	873
1856	1810	3666	... 1838.	1545	1538	3083	705
1964	1788	3752	... 1839.	1542	1318	2860	861
1993	1919	3912	... 1840.	1285	1166	2451	879
9712	9336	19,048	... S:a.	7137	6657	13,794	4175
1977,1	1885,9	3863,0	Medium af alla dessa 25 åren	1285,1	1217,5	2502,6	872,9

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 692,0 668,4 1360,4

Jämtlands Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a		m.	q.	S:a	
505	492	997	... År 1816.	280	272	552	276
501	465	966	... 1817.	290	249	539	215
446	446	892	... 1818.	251	244	495	259
515	476	991	... 1819.	247	259	506	276
548	492	1040	... 1820.	251	253	504	322
2515	2371	4886	... S:a ...	1319	1277	2596	1348
593	550	1143	... 1821.	315	286	601	292
466	446	912	... 1822.	360	366	726	224
573	531	1104	... 1823.	279	253	532	317
616	520	1136	... 1824.	265	251	516	321
520	471	991	... 1825.	247	227	474	282
2768	2518	5286	... S:a ...	1466	1383	2849	1436
562	538	1100	... 1826.	285	278	563	287
616	585	1201	... 1827.	240	254	494	317
581	559	1140	... 1828.	258	252	510	347
559	628	1187	... 1829.	295	285	580	337
607	521	1128	... 1830.	284	303	587	340
2925	2831	5756	... S:a ...	1362	1372	2734	1628
577	507	1084	... 1831.	348	294	642	303
541	535	1076	... 1832.	307	298	605	244
511	489	1000	... 1833.	299	288	587	258
538	523	1061	... 1834.	277	264	541	272
639	593	1232	... 1835.	269	259	528	302
2806	2647	5453	... S:a ...	1500	1403	2903	1379
582	548	1130	... 1836.	344	271	615	289
520	482	1002	... 1837.	360	340	700	271
558	506	1064	... 1838.	341	316	657	263
510	477	987	... 1839.	384	372	756	249
454	431	885	... 1840.	305	306	611	273
2624	2444	5068	... S:a ...	1734	1605	3339	1345
545,5	512,4	1057,9	Medium af alla dessa 25 åren	295,2	281,6	576,8	285,4

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 250,3 230,8 481,1

Wästerbottens Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
686	669	1355	... År 1816.	362	369	731	275
687	644	1331 1817.	357	347	704	281
779	687	1466 1818.	448	374	822	273
739	685	1424 1819.	408	398	806	274
822	758	1580 1820.	418	346	764	321
3713	3443	7156 S:a.	1993	1834	3827	1424
892	892	1784 1821.	386	386	772	358
849	792	1641 1822.	452	426	878	337
966	943	1909 1823.	408	358	766	380
865	906	1771 1824.	470	420	890	369
988	921	1909 1825.	483	454	937	414
4560	4454	9014 S:a.	2199	2044	4243	1858
1000	991	1991 1826.	488	479	967	400
997	967	1964 1827.	455	424	879	425
1075	999	2074 1828.	429	404	833	399
1060	976	2036 1829.	487	417	904	359
1029	941	1970 1830.	537	449	986	327
5161	4874	10,035 S:a.	2396	2173	4569	1910
980	897	1877 1831.	521	477	998	338
865	851	1716 1832.	529	528	1057	279
974	922	1896 1833.	504	511	1015	344
941	893	1834 1834.	577	503	1080	312
903	802	1705 1835.	457	417	874	397
4663	4365	9028 S:a.	2588	2436	5024	1670
1022	987	2009 1836.	419	396	815	359
969	959	1928 1837.	561	485	1046	370
995	959	1954 1838.	603	562	1165	334
892	917	1809 1839.	603	550	1153	331
911	849	1760 1840.	497	513	1010	348
4789	4671	9460 S:a.	2683	2506	5189	1742
915,4	872,3	1787,7	Medium af alla dessa 25 åren	474,4	439,7	914,1	344,2

d:o af Nativitets-
öfverskottet 441,0 432,6 873,6

Gefleborgs Län.


Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1332	1319	2651	... År 1815.	919	843	1762	764
1204	1170	2374	... 1817.	814	794	1608	688
1253	1202	2455	... 1818.	866	874	1740	760
1303	1254	2557	... 1819.	1055	985	2040	715
1354	1255	2609	... 1820.	856	877	1733	778
6446	6200	12,646	... S:a.	4510	4373	8883	3705
1370	1323	2693	... 1821.	956	946	1902	724
1346	1323	2669	... 1822.	1008	915	1923	750
1431	1338	2769	... 1823.	844	789	1633	781
1305	1312	2617	... 1824.	803	695	1498	811
1506	1436	2942	... 1825.	1033	924	1957	877
6958	6731	13,690	... S:a.	4644	4269	8913	3943
1551	1539	3090	... 1826.	932	866	1798	849
1428	1400	2828	... 1827.	856	722	1578	793
1451	1447	2898	... 1828.	960	919	1879	849
1489	1441	2930	... 1829.	1008	945	1953	829
1517	1469	2986	... 1830.	1019	991	2010	851
7436	7296	14,732	... S:a.	4775	4443	9218	4171
1417	1325	2742	... 1831.	930	918	1848	705
1336	1274	2610	... 1832.	1052	1054	2106	750
1447	1419	2866	... 1833.	963	922	1885	824
1467	1382	2849	... 1834.	980	948	1928	852
1540	1496	3036	... 1835.	810	728	1538	797
7207	6896	14,103	... S:a.	4735	4570	9305	3928
1340	1338	2678	... 1836.	901	855	1756	733
1392	1307	2699	... 1837.	1157	1193	2350	727
1332	1228	2560	... 1838.	1009	957	1966	711
1360	1253	2613	... 1839.	1231	1152	2383	799
1409	1359	2768	... 1840.	952	971	1923	840
6833	6485	13,318	... S:a.	5250	5128	10,378	3810
1395,2	1344,3	2739,5	Medium af alla dessa 25 åren	956,6	911,3	1867,9	782,3

d:o af Nativitets-
öfverskottet . . . 438,6 433,0 871,6

Väster Norrlands Län.

Födde.				Döde.			Vigde par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1114	1130	2244	... År 1816.	728	670	1398	576
1064	1095	2159 1817.	726	669	1395	549
1079	1060	2139 1818.	710	621	1331	552
1128	1037	2165 1819.	866	843	1709	555
1097	1073	2170 1820.	668	676	1344	626
5482	5395	10,877 S:a.	3698	3479	7177	2858
1140	1132	2272 1821.	711	733	1444	602
1122	1014	2136 1822.	846	742	1588	627
1239	1164	2403 1823.	674	603	1277	633
1224	1153	2377 1824.	756	615	1371	652
1302	1223	2525 1825.	704	693	1397	631
6027	5686	11,713 S:a.	3691	3386	7077	3145
1366	1266	2632 1826.	827	772	1599	658
1375	1374	2749 1827.	669	660	1329	65
1332	1304	2636 1828.	792	767	1559	69
1396	1348	2746 1829.	755	767	1522	359
1358	1302	2660 1830.	926	830	1776	327
6829	6594	13,423 S:a.	3969	3816	7785	3228
1294	1183	2477 1831.	984	901	1885	488
1213	1157	2370 1832.	843	741	1584	517
1276	1242	2518 1833.	916	848	1764	565
1327	1188	2515 1834.	935	860	1795	604
1518	1364	2882 1835.	678	659	1337	611
6628	6134	12,762 S:a.	4356	4009	8365	2785
1214	1267	2481 1836.	729	776	1505	592
1255	1249	2504 1837.	1011	1047	2058	612
1320	1171	2491 1838.	903	889	1792	546
1179	1152	2331 1839.	1026	997	2023	523
1113	1064	2177 1840.	965	934	1899	565
6081	5903	11,984 S:a.	4634	4643	9277	2838
1241,9	1188,5	2430,4	Medium af alla dessa 25 åren	813,9	773,3	1587,2	594,2

d:o af Nativitets-
öfverskottet 428,0 415,2 843,2



Ingångne Äktenskap.

Litt. E.

I hela Riket.					Deraf i Stockholms Stad.					I hela R			
Medium					Medium					Mediu			
Åren 1816 med 1820.	Åren 1821 med 1825.	Åren 1826 med 1830.	Åren 1831 med 1835.	Åren 1836 med 1840.		1816 med 1820.	1821 med 1825.	1826 med 1830.	1831 med 1835.	1836 med 1840.	Åren 1816 med 1820.	Åren 1821 med 1825.	Åren 1826 med 1830.
					Emellan								
16,627,4	18,763,8	17,321,8	17,106,6	16,647,0	Ogifta	476,2	550,0	514,4	513,8	489,8	1824,0	*) 1941,8	1707
2540,6	2628,4	2457,4	2555,0	2243,0	Enkling och Ogift	57,2	73,6	61,2	67,2	69,0	13,754,4	14,814,0	14,267
1633,4	1611,8	1500,4	1544,6	1366,0	Ogift och Enka	54,6	63,8	60,2	59,6	55,0	22,690,6	25,701,4	24,709
788,8	768,2	741,8	850,2	699,4	Enkling och Enka	13,4	14,8	16,0	14,8	13,6	21,905,6	25,561,2	25,637
21,590,2	23,772,2	22,021,4	22,056,6	20,955,4 Summa	601,4	702,2	651,8	655,4	627,4	16,537,2	18,101,6	19,079
					Deraf i						8013,8	9139,0	913
1279,8	1397,8	1269,6	1266,2	1119,0	Januarii månad	25,4	37,0	31,2	39,4	40,2	1283,8	1462,4	147
1107,6	1234,0	1043,2	1057,6	969,0	Februarii d:o	33,6	34,8	28,8	28,8	26,8	42,8	44,6	3
1479,0	1538,2	1470,6	1534,2	1406,6	Mars d:o	58,4	57,2	51,8	43,0	45,6	86,052,2	96,766,0	96,04
1725,2	1851,8	1704,8	1701,2	1673,6	April d:o	66,4	77,6	68,2	72,0	57,4			
1296,2	1514,8	1401,0	1417,6	1351,4	Maji d:o	43,0	60,6	62,8	65,4	56,6	1305,0	1429,6	144
1595,6	1913,6	1708,8	1757,0	1678,4	Junii d:o	37,6	40,0	35,6	36,6	39,6	22,0	20,0	2
944,6	1139,4	1047,6	991,8	1134,8	Julii d:o	30,6	35,8	38,4	30,8	36,8	0,2	0,6	
710,2	855,4	810,0	739,0	734,0	Augusti d:o	36,8	40,0	40,0	38,8	35,6	2147,0	2524,6	257
1402,8	1454,0	1286,8	1101,2	1068,0	September d:o	67,0	71,8	55,6	52,2	54,8			
3134,2	3326,4	3051,6	2854,2	2652,4	October d:o	86,6	99,8	91,8	79,8	87,8			
3034,2	3456,4	3306,0	3364,2	3067,6	November d:o	59,0	83,8	81,6	97,2	76,6			
3880,8	4090,4	3921,4	4272,4	4100,6	December d:o	57,0	63,8	66,0	71,4	69,6			

Barnaföderskor.

I hela Riket.						Deraf i Stockholms Stad.					
Medium.						Medium.					
Åren 1816 med 1820.	Åren 1821 med 1825.	Åren 1826 med 1830.	Åren 1831 med 1836.	Åren 1836 med 1840.		1816 med 1820.	1821 med 1825.	1826 med 1830.	1831 med 1835.	1836 med 1840.	
						I åldern					
489,8	1824,0	*) 1941,8	1707,4	1660,2	1382,4	Under 20 år	77,0	57,6	58,8	60,2	44,4
69,0	13,754,4	14,814,0	14,267,4	14,184,8	14,317,0	Emellan 20 och 25 år	553,4	543,2	527,2	525,0	559,8
55,0	22,690,6	25,701,4	24,709,2	24,356,2	24,879,8	25 och 30 år	765,2	851,0	819,0	830,0	833,8
13,6	21,905,6	25,561,2	25,637,6	25,361,6	24,451,2	30 och 35 år	642,8	670,0	682,4	735,0	729,0
627,4	16,537,2	18,101,6	19,079,2	19,790,0	19,349,8	35 och 40 år	413,4	419,6	413,8	459,0	478,0
	8013,8	9139,0	9133,4	9932,0	9966,6	40 och 45 år	125,6	138,2	144,6	147,6	152,6
	1283,8	1462,4	1477,0	1404,4	1503,0	45 och 50 år	14,4	16,8	17,2	11,8	11,6
40,2	42,8	44,6	33,4	33,4	26,2	Öfver 50 år	0,4	0,4	—	—	—
26,8	86,052,2	96,766,0	96,044,6	96,722,6	95,876,0 Summa	2592,2	2696,8	2663,0	2768,6	2809,2
45,6						Deraf voro nedkomne med					
57,4	1305,0	1429,6	1449,8	1472,8	1329,2	Tvilingar	40,6	44,2	36,2	36,2	32,6
56,6	22,0	20,0	22,0	18,6	20,8	Trilingar	1,0	1,6	0,2	1,2	0,4
39,6	0,2	0,6	0,2	0,6	0,8	Fytingar	—	0,2	—	—	—
36,8						Och med					
35,6	2147,0	2524,6	2577,8	2775,8	2828,0	Döfödde Barn	84,0	109,8	124,4	145,0	160,0
54,8											
87,8											
76,6											
69,6											

Födde lefvande Barn.

		Medium Åren 1816 med 1820.			Medium Åren 1821 med 1825.			Medium Åren 1826 med 1830.			Medium Åren 1831 med 1835.			Åre
		m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	
I hela Riket.														
Äkta Barn		40,634,6	38,723,4	79,358,0	45,490,4	43,502,8	88,993,2	45,511,8	43,510,2	89,022,0	45,637,4	43,464,6	89,102,0	44,865,4
Oäkta		2997,0	2898,0	5895,0	3404,2	3309,0	6713,2	3006,4	2917,8	5924,2	3200,8	3057,0	6257,8	3320,4
S:a		43,631,6	41,621,4	85,253,0	48,894,6	46,811,8	95,706,4	48,518,2	46,428,0	94,946,2	48,838,2	46,521,6	95,359,8	48,185,8
Deraf														
I Januarii månad		3965,2	3780,8	7746,0	4471,6	4240,0	8711,6	4351,2	4135,4	8486,6	4288,2	4188,8	8477,0	4362,2
Februarii		3616,4	3415,6	7032,0	3905,2	3789,6	7694,8	3942,0	3798,2	7740,2	3851,0	3685,6	7536,6	3906,6
Mars		3912,4	3743,8	7656,2	4362,2	4151,0	8513,2	4356,0	4159,0	8515,0	4283,0	4092,2	8375,2	4252,4
April		3594,0	3465,0	7059,0	4018,8	3858,6	7877,4	3987,6	3848,8	7836,4	4050,6	3845,2	7895,8	3932,6
Maji		3400,0	3301,2	6701,2	3917,8	3724,4	7642,2	3940,8	3860,2	7801,0	3974,2	3800,4	7774,6	3910,4
Junii		3171,6	3016,8	6188,4	3633,8	3506,6	7140,4	3689,0	3585,6	7274,6	3658,2	3473,4	7131,6	3624,4
Julii		3249,8	3099,4	6349,2	3669,8	3545,4	7215,2	3758,0	3569,6	7327,6	3768,2	3553,2	7321,4	3705,0
Augusti		3401,0	3207,8	6608,8	3752,2	3532,0	7284,2	3866,6	3625,4	7492,0	3820,2	3595,6	7415,8	3757,0
September		4021,8	3835,8	7857,6	4492,8	4296,2	8789,0	4506,4	4299,8	8806,2	4519,2	4222,4	8741,6	4479,6
October		3814,2	3634,0	7448,2	4265,0	4130,4	8395,4	4174,0	3980,4	8154,4	4304,2	4148,6	8452,8	4181,6
November		3613,6	3426,4	7040,0	4031,6	3882,4	7914,0	3841,2	3700,0	7541,2	4062,4	3843,8	7906,2	3873,6
December		3871,6	3694,8	7566,4	4373,8	4155,2	8529,0	4105,4	3865,6	7971,0	4258,8	4072,4	8331,2	4200,0
I Stockholms Stad.														
Äkta Barn		818,4	790,8	1609,2	840,4	783,4	1623,8	823,0	789,6	1612,6	804,6	771,8	1576,4	791,0
Oäkta		463,2	478,4	941,6	492,4	518,4	1010,8	483,8	478,6	962,4	550,6	531,2	1081,8	569,4
S:a		1281,6	1269,2	2550,8	1332,8	1301,8	2634,6	1306,8	1268,2	2575,0	1355,2	1303,0	2658,2	1360,4
Deraf														
I Januarii månad		114,6	117,4	232,0	117,4	110,8	228,2	112,8	114,0	226,8	110,8	115,6	226,4	120,2
Februarii		107,2	100,8	208,0	104,6	97,6	202,2	102,8	97,0	199,8	106,2	103,6	209,8	113,8
Mars		118,6	116,2	234,8	114,2	126,2	240,4	116,6	106,8	223,4	116,6	114,2	230,8	129,6
April		118,6	104,8	223,4	108,4	112,8	221,2	105,8	110,2	216,0	113,4	102,0	215,4	111,0
Maji		101,8	106,2	208,0	112,0	108,6	220,6	117,0	98,2	215,2	114,0	102,6	216,6	108,4
Junii		103,0	94,2	197,2	102,8	104,2	207,0	106,8	96,0	202,8	107,0	99,8	206,8	110,6
Julii		89,2	101,4	190,6	104,0	103,6	207,6	117,2	108,8	226,0	101,4	105,6	207,0	106,4
Augusti		101,2	105,4	206,6	102,6	103,6	206,2	101,0	102,2	203,2	114,6	113,4	228,0	109,8
September		107,8	111,4	219,2	114,2	101,2	215,4	108,4	110,2	218,6	118,0	111,4	229,4	107,6
October		110,4	113,6	224,0	122,2	117,2	239,4	113,4	106,6	220,0	117,8	121,2	239,0	113,2
November		104,8	103,4	208,2	116,2	104,4	220,6	99,8	105,8	205,6	117,8	104,8	222,6	107,8
December		104,4	94,4	198,8	114,2	111,6	225,8	105,2	112,4	217,6	117,6	108,8	226,4	122,0

35.	Medium			Åren 1836 med 1840.
	S:a.	m.	q.	
9,102,0	44,865,0	42,961,4	87,826,4	
6257,8	3320,4	3165,4	6485,8	
7,359,8	48,185,4	46,126,8	94,312,2	
				Aflade i
8477,0	4362,2	4187,2	8549,4	April.
7536,6	3906,6	3774,8	7681,4	Maji.
8375,2	4252,4	4110,0	8362,4	Junii.
7895,8	3932,6	3771,4	7704,0	Julii.
7774,6	3910,4	3728,2	7638,6	Augusti.
7131,6	3624,4	3489,2	7113,6	September.
7321,4	3705,0	3518,4	7223,4	October.
7415,8	3757,0	3551,6	7308,6	November.
8741,6	4479,6	4229,0	8708,6	December.
8452,8	4181,6	3956,6	8138,2	Januarii.
7906,2	3873,6	3722,6	7596,2	Februarii.
8331,2	4200,0	4087,8	8287,8	Mars.
1576,4	791,0	758,0	1549,0	
1081,8	569,4	550,6	1120,0	
2658,2	1360,4	1308,6	2669,0	
				Aflade i
226,4	120,2	108,4	228,6	April.
209,8	113,8	110,8	224,6	Maji.
230,8	129,6	121,0	250,6	Junii.
215,4	111,0	113,4	224,4	Julii.
216,6	108,4	111,2	219,6	Augusti.
206,8	110,6	97,8	208,4	September.
207,0	106,4	102,8	209,2	October.
228,0	109,8	103,4	213,2	November.
229,4	107,6	104,4	212,0	December.
239,0	113,2	113,6	226,8	Januarii.
222,6	107,8	105,4	213,2	Februarii.
226,4	122,0	116,4	238,4	Mars.

Dödlödde Barn.

Medium	Åren 1816 med 1820.	Åren 1821 med 1825.	Åren 1826 med 1830.	Åren 1831 med 1835.	Åren 1836 med 1840.	
I hela Riket	2147,4	2532,0	2593,0	{ 2476,6 308,6	2525,0 412,0	af äkta säng. oäkta d:o
				2875,2	2937,0	Summa.
Deraf						
I Stockholms Stad	84,0	111,2	124,8	{ 74,6 74,6	78,2 96,0	af äkta säng. oäkta d:o
				149,2	174,2	Summa.
I öfrige Städerna	176,6	163,6	178,8	{ 148,6 46,8	175,8 56,0	af äkta säng. oäkta d:o
				195,4	231,8	Summa.
På Landsbygden	1886,8	2257,2	2289,4	{ 2253,4 277,2	2271,0 260,0	af äkta säng. oäkta d:o
				2530,6	2531,0	Summa.

Dode.

				Medium Åren 1816 med 1820.			Medium Åren 1821 med 1825.			Åren	
				m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	
I hela Riket.											
Barn, under 1 år, äkta				7160,4	5775,8	12,936,2	7382,0	6064,6	13,446,6	8283,4	
" " " " " "				1048,4	978,0	2026,4	933,6	822,8	1756,4	841,6	
" " " " " "				6012,2	5522,2	11,534,4	5328,6	5028,0	10,356,6	6439,8	
Ogifta öfver 15 år				3700,4	3703,2	7403,6	3637,6	3247,2	6884,8	4582,0	
Gifta Personer				10,030,4	7348,2	17,378,6	9606,4	6708,2	16,314,6	12,272,4	
Enklingar och Enkor				3500,4	7549,2	11,049,6	3315,6	6844,2	10,159,8	4135,6	
S:a				31,452,2	30,876,6	62,328,8	30,203,8	28,715,0	58,918,8	36,554,8	
I Stockholms Stad.											
Barn, under 1 år, äkta				202,0	161,8	363,8	191,6	173,6	365,2	204,6	
" " " " " "				215,0	206,6	421,6	208,6	195,6	404,2	201,8	
" " " " " "				228,4	217,8	446,2	154,4	156,6	311,0	260,4	
Ogifta öfver 15 år				466,2	352,6	818,8	527,2	278,6	805,8	839,4	
Gifta Personer				457,2	265,2	722,4	418,2	200,4	618,6	613,8	
Enklingar och Enkor				139,2	412,2	551,4	128,8	330,6	459,4	157,8	
S:a				1708,0	1616,2	3324,2	1628,8	1335,4	2964,2	2277,8	
Dödligheten i hela Riket.											
I Januarii månad				2932,4	2883,8	5816,2	2952,0	2851,0	5803,0	3541,2	
Februarii				2663,4	2639,2	5302,6	2711,6	2609,0	5320,6	3369,6	
Mars				3033,4	2981,6	6015,0	3080,2	2980,6	6060,8	3713,4	
April				3027,4	2965,6	5993,0	2967,6	2900,0	5867,6	3875,0	
Maji				2964,2	2836,4	5800,6	2741,8	2566,0	5307,8	3562,4	
Juni				2384,4	2274,0	4658,4	2390,0	2186,0	4576,0	2854,8	
Juli				2223,6	2102,6	4326,2	2234,0	2038,0	4272,0	2423,2	
Augusti				2428,4	2306,2	4734,6	2062,2	1937,8	4000,0	2435,0	
September				2232,8	2192,0	4424,8	1991,0	1890,4	3881,4	2305,8	
October				2339,6	2393,4	4733,0	2188,0	2049,0	4237,0	2486,4	
November				2445,8	2497,8	4943,6	2345,2	2259,2	4604,4	2826,4	
December				2776,8	2804,0	5580,8	2540,2	2448,0	4988,2	3161,6	
Än döde fundne så kallade Politie-lik i Stockholm, till döds- månaden osäkra *)											
I Stockholms Stad.											
I Januarii månad				129,2	132,8	262,0	131,6	117,2	248,8	198,6	
Februarii				121,8	120,8	242,6	118,2	113,6	231,8	170,2	
Mars				145,6	139,8	285,4	141,0	121,6	262,6	200,2	
April				163,6	161,0	324,6	146,0	126,0	272,0	234,6	
Maji				164,4	141,4	305,8	158,6	114,0	272,6	244,2	
Juni				144,4	117,4	261,8	151,8	111,2	263,0	192,4	
Juli				150,0	131,2	281,2	136,6	118,2	254,8	172,8	
Augusti				165,0	146,8	311,8	130,4	108,2	238,6	181,8	
September				135,8	128,0	263,8	124,0	100,6	224,6	162,0	
October				134,8	136,2	271,0	124,4	97,4	221,8	169,0	
November				124,8	124,6	249,4	128,0	102,8	230,8	171,0	
December				128,6	136,2	264,8	138,2	104,6	242,8	181,0	
Än de s. k. Politie-likn											

Lill. G.

Döde.


Medium Åren 1821 med 1825.			Medium Åren 1826 med 1830.			Medium Åren 1831 med 1835.			Medium Åren 1836 med 1840.		
m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.
7382,0	6064,6	13,446,6	8283,4	6808,0	15,091,4	7838,8	6432,6	14,271,4	7636,2	6245,8	13,882,0
933,6	822,8	1756,4	841,6	754,6	1,596,2	907,2	775,8	1683,0	956,2	851,0	1807,2
6328,6	5028,0	10,356,6	6439,8	5928,8	12,368,6	5940,4	5455,2	11,395,6	6259,8	5823,4	12,083,2
6337,6	3247,2	6884,8	4582,0	4047,6	8629,6	4395,0	3976,0	8371,0	4578,0	4099,0	8677,0
9606,4	6708,2	16,314,6	12,272,4	8300,2	20,572,6	11,424,8	7978,4	19,403,2	11,735,2	8103,8	19,839,0
8315,6	6844,2	10,159,8	4135,6	8761,4	12,897,0	4034,6	8707,4	12,742,0	4226,0	8930,8	13,156,8
203,8	28,715,0	58,918,8	36,554,8	34,600,6	71,155,4	34,540,8	33,325,4	67,866,2	35,391,4	34,053,8	69,445,2
191,6	173,6	365,2	204,6	182,6	387,2	194,6	165,6	360,2	215,8	178,2	394,0
208,6	195,6	404,2	201,8	189,0	390,8	228,4	206,8	435,2	265,6	238,0	503,6
154,4	156,6	311,0	260,4	230,4	490,8	227,4	212,2	439,6	273,8	230,6	504,4
527,2	278,6	805,8	839,4	418,4	1257,8	739,6	432,4	1172,0	726,2	403,0	1129,2
418,2	200,4	618,6	613,8	272,8	886,6	501,8	292,0	793,8	417,4	211,8	629,2
128,8	330,6	459,4	157,8	465,0	622,8	151,4	531,6	683,0	125,2	375,6	500,2
628,8	1335,4	2964,2	2277,8	1758,2	4036,0	2043,2	1840,6	3883,8	2024,0	1636,6	3660,6
2952,0	2851,0	5803,0	3541,2	3454,6	6995,8	3173,4	3072,8	6246,2	3451,0	3403,2	6854,2
2711,6	2609,0	5320,6	3369,6	3230,8	6600,4	2896,0	2782,2	5678,2	3244,4	3252,2	6496,6
3080,2	2980,6	6060,8	3713,4	3600,0	7313,4	3244,0	3215,8	6459,8	3538,8	3459,6	6998,4
2967,6	2900,0	5867,6	3875,0	3632,2	7507,2	3295,2	3238,0	6533,2	3510,2	3402,0	6912,2
2741,8	2566,0	5307,8	3562,4	3382,2	6944,6	3263,4	3162,6	6426,0	3237,0	3042,8	6279,8
2390,0	2186,0	4576,0	2854,8	2553,2	5408,0	2694,8	2496,2	5191,0	2702,6	2459,2	5161,8
2234,0	2038,0	4272,0	2423,2	2210,0	4633,2	2321,6	2161,6	4483,2	2439,6	2294,2	4733,8
2062,2	1937,8	4000,0	2435,0	2244,8	4679,8	2893,4	2788,2	5681,6	2524,0	2369,0	4893,0
1991,0	1890,4	3881,4	2305,8	2191,8	4497,6	2913,6	2832,4	5746,0	2355,8	2275,2	4631,0
2188,0	2049,0	4237,0	2486,4	2328,6	4815,0	2397,6	2280,6	4678,2	2536,4	2470,4	5006,8
2345,2	2259,2	4604,4	2826,4	2697,6	5524,0	2569,8	2546,2	5116,0	2685,2	2639,0	5324,2
2540,2	2448,0	4988,2	3161,6	3074,8	6236,4	2878,0	2748,8	5626,8	3042,8	2951,8	5994,6
									123,6	35,2	158,8
131,6	117,2	248,8	198,6	168,2	366,8	135,8	128,4	264,2	172,8	160,2	333,0
118,2	113,6	231,8	170,2	138,8	309,0	121,2	109,2	236,4	149,4	131,8	281,2
141,0	121,6	262,6	200,2	155,4	355,6	145,2	117,8	263,0	157,2	134,2	291,4
146,0	126,0	272,0	234,6	180,8	415,4	150,4	137,8	288,2	155,8	133,2	289,0
158,6	114,0	272,6	244,2	174,0	418,2	171,4	131,6	303,0	161,0	135,4	296,4
151,8	111,2	263,0	192,4	140,2	332,6	149,4	116,6	266,0	156,4	118,4	274,8
136,6	118,2	254,8	172,8	134,0	306,8	138,6	119,4	258,0	161,4	133,8	295,2
130,4	108,2	238,6	181,8	133,8	315,6	153,4	148,0	301,4	183,6	144,0	327,6
124,0	100,6	224,6	162,0	133,2	295,2	479,0	478,2	957,2	151,0	134,0	285,0
124,4	97,4	221,8	169,0	125,8	294,8	135,4	123,6	259,0	150,0	122,6	272,6
128,0	102,8	230,8	171,0	133,6	304,6	133,4	112,8	246,2	147,8	117,4	265,2
138,2	104,6	242,8	181,0	140,4	321,4	130,0	117,2	247,2	154,0	136,4	290,4
									123,6	35,2	158,8

uppgifvas; så hafva de här ofvan blifvit samtelige inräknade bland Ogifta öfver 15 år.

Dödligheten efter olikhet i åldern.	I hela Riket.														
	Medium År 1816 med 1820.			Medium År 1821 med 1825.			Medium År 1826 med 1830.			Medium År 1831 med 1835.			Medium År 1836 med		
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	
Under 1 år	8208,8	6753,8	14,962,6	8315,6	6887,4	15,203,0	9125,0	7562,6	16,687,6	8746,0	7208,4	15,954,4	8592,4	7096,8	
Emellan 1 och 3 år	3048,2	2734,8	5783,0	2798,4	2550,2	5348,6	3163,6	2882,6	6046,2	2834,8	2593,2	5428,0	2948,2	2723,8	
" 3 o. 5	1144,8	1095,8	2240,4	1001,2	974,8	1976,0	1279,0	1218,0	2497,0	1064,0	1005,0	2069,0	1165,2	1076,0	
" 5 o. 10	1205,0	1099,4	2304,4	980,8	954,2	1935,0	1350,2	1222,2	2572,4	1293,4	1172,4	2465,8	1339,6	1270,8	
" 10 o. 15	614,6	592,2	1206,8	548,2	548,8	1097,0	647,0	605,4	1252,4	748,2	684,6	1432,8	806,6	753,0	
" 15 o. 20	672,8	674,6	1347,4	566,8	577,8	1144,6	636,0	626,0	1262,0	706,4	678,0	1384,4	794,0	797,6	
" 20 o. 25	905,2	850,6	1755,8	830,2	691,4	1521,6	939,6	759,8	1699,4	947,6	774,2	1721,8	995,0	824,0	
" 25 o. 30	885,8	851,6	1737,4	909,0	779,4	1688,4	1141,8	881,6	2023,4	1087,6	869,8	1957,4	1033,2	847,6	
" 30 o. 35	870,8	892,8	1763,6	952,6	831,2	1783,8	1354,8	1052,4	2407,2	1286,6	1036,8	2323,4	1179,0	951,6	
" 35 o. 40	1025,4	1056,8	2082,2	933,4	876,4	1809,8	1418,0	1142,8	2560,8	1432,2	1159,4	2591,6	1366,2	1075,4	
" 40 o. 45	1134,2	1055,2	2189,4	1153,2	965,0	2118,2	1476,8	1176,4	2653,2	1465,4	1255,8	2721,2	1590,4	1251,0	
" 45 o. 50	1138,6	988,4	2127,0	1180,4	896,4	2076,8	1609,4	1230,2	2839,6	1443,8	1256,4	2700,2	1586,0	1240,2	
" 50 o. 55	1422,0	1294,4	2716,4	1253,0	1033,0	2286,0	1716,2	1411,6	3127,8	1686,8	1456,8	3143,6	1591,0	1422,8	
" 55 o. 60	1565,2	1497,6	3062,8	1460,8	1314,4	2775,2	1645,0	1507,6	3152,6	1621,8	1556,2	3178,0	1730,8	1660,2	
" 60 o. 65	1818,6	1919,6	3738,2	1668,4	1744,2	3412,6	1966,2	2059,8	4026,0	1707,8	1817,8	3525,6	1857,4	1946,4	
" 65 o. 70	1827,2	2120,2	3947,4	1686,4	1885,4	3571,8	2044,6	2345,6	4390,2	1832,2	2231,6	4063,8	1778,8	2096,4	
" 70 o. 75	1683,0	2087,4	3770,4	1691,8	2001,8	3693,6	2033,6	2527,0	4560,6	1829,4	2373,6	4203,0	1913,2	2494,2	
" 75 o. 80	1177,0	1547,8	2724,8	1208,6	1572,8	2781,4	1640,2	2243,8	3884,0	1466,2	2021,2	3487,4	1554,4	2144,6	
" 80 o. 85	712,6	1085,2	1797,8	706,6	1001,0	1707,6	957,4	1386,4	2343,8	931,8	1435,8	2367,6	967,4	1477,0	
" 85 o. 90	310,0	509,2	819,2	268,6	442,6	711,2	322,0	561,4	883,4	338,8	582,4	921,2	394,4	702,8	
" 90 o. 95	65,8	136,0	201,8	76,6	152,4	229,0	71,8	156,0	227,8	63,4	135,2	198,6	77,4	148,0	
" 95 o. 100	15,4	30,2	45,6	11,4	31,0	42,4	15,2	36,6	51,8	6,0	17,0	23,0	6,8	17,0	
Öfver 100 år	1,4	3,0	4,4	1,8	3,4	5,2	1,4	4,8	6,2	0,6	3,8	4,4	0,4	1,4	
Politie-Lik i Stockholm	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,6	35,2	
Summa	31,452,2	30,876,6	62,328,8	30,203,8	28,715,0	58,918,8	36,554,8	34,600,6	71,155,4	34,540,8	33,325,4	67,866,2	35,391,4	34,053,8	

I Stockholms Stad.

Medium med 1835.					Medium År 1836 med 1840.					Medium År 1816 med 1820.					Medium År 1821 med 1825.					Medium År 1826 med 1830.					Medium År 1831 med 1835.					Medium År 1816 med 1840.				
q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:									
7208,4	15,954,4	8592,4	7093,8	15,689,2	417,0	368,4	785,4	400,2	369,2	769,4	406,4	371,6	778,0	423,0	372,4	795,4	481,4	416,2	897,6															
2593,2	5428,0	2948,2	2723,8	5672,0	118,0	114,8	232,8	79,6	84,4	164,0	130,0	116,4	246,4	107,6	109,8	217,4	139,0	110,2	249,2															
1005,0	2069,0	1165,2	1076,0	2241,2	42,8	48,8	91,6	25,6	29,6	55,2	51,0	48,8	99,8	45,0	38,8	83,8	56,0	51,0	107,0															
1172,4	2465,8	1339,6	1270,8	2610,4	47,8	39,8	87,6	32,0	28,0	60,0	53,6	46,4	100,0	49,2	39,6	88,8	54,2	45,4	99,6															
684,6	1432,8	806,6	753,0	1559,6	20,4	14,2	34,6	17,2	14,6	31,8	25,8	18,8	44,6	25,6	24,0	49,6	24,6	24,0	48,6															
678,0	1384,4	794,0	797,6	1591,6	38,4	28,2	66,6	30,0	18,8	48,8	45,8	25,6	71,4	43,6	26,6	70,2	44,8	31,0	75,8															
774,2	1721,8	995,0	824,0	1819,0	75,8	54,6	130,4	74,6	35,0	109,6	107,4	49,8	157,2	108,4	48,0	156,4	96,8	57,2	154,0															
869,8	1957,4	1033,2	847,6	1880,8	91,8	69,0	160,8	121,2	54,6	175,8	202,4	78,4	280,8	166,8	79,0	245,8	127,6	67,0																
1036,8	2323,4	1179,0	951,6	2130,6	99,0	66,6	165,6	134,4	59,4	193,8	249,0	89,4	338,4	235,6	100,6	336,2	176,8	77,4																
1159,4	2591,6	1366,2	1075,4	2441,6	115,4	79,0	194,4	117,4	61,2	178,6	220,4	92,4	312,8	207,4	119,0	326,4	173,2	85,8	259,															
1255,8	2721,2	1590,4	1251,0	2841,4	114,4	74,2	188,6	126,4	66,4	192,8	183,0	91,6	274,6	167,8	119,2	287,0	151,0	89,4	240,4															
1256,4	2700,2	1586,0	1240,2	2826,2	103,2	84,0	187,2	106,8	63,0	169,8	157,6	105,2	262,8	123,2	115,2	238,4	108,6	82,2	190,8															
1456,8	3143,6	1591,0	1422,8	3013,8	108,4	83,0	191,4	90,0	69,4	159,4	133,2	107,2	240,4	99,6	117,0	216,6	78,4	73,4	151,8															
1556,2	3178,0	1730,8	1660,2	3391,0	90,2	90,6	180,8	76,4	69,4	145,8	91,6	93,6	185,2	67,4	97,2	164,6	55,4	71,0	126,4															
1817,8	3525,6	1857,4	1946,4	3803,8	80,4	97,4	177,8	74,4	77,6	152,0	80,8	113,6	194,4	61,6	104,6	166,2	47,6	73,8	121,4															
2231,6	4063,8	1778,8	2096,4	3875,2	59,6	102,0	161,6	48,6	76,0	124,6	56,4	104,2	160,6	47,0	109,8	156,8	30,6	74,4	105,0															
2373,6	4203,0	1913,2	2494,2	4407,4	46,6	87,4	134,0	35,2	66,2	101,4	40,0	84,4	124,4	31,0	92,2	123,2	26,4	72,4	98,8															
2021,2	3487,4	1554,4	2144,6	3699,0	23,4	60,0	83,4	19,8	49,0	68,8	26,0	66,8	92,8	18,2	66,8	85,0	16,4	52,0	68,4															
1435,8	2367,6	967,4	1477,0	2444,4	10,4	30,8	41,2	14,4	25,0	39,4	11,6	35,4	47,0	11,4	39,2	50,6	5,4	29,6	35,0															
582,4	921,2	394,4	702,8	1097,2	4,2	17,2	21,4	3,6	12,4	16,0	3,6	14,0	17,6	3,2	17,4	20,6	5,0	14,8	19,8															
135,2	198,6	77,4	148,0	225,4	0,6	4,6	5,2	0,6	4,8	5,4	2,0	3,0	5,0	0,6	3,0	3,6	1,0	2,6	3,6															
17,0	23,0	6,8	17,0	23,8	0,8	1,2	2,0	0,4	1,2	1,6	0,2	1,0	1,2	—	1,0	1,0	0,2	0,6	0,8															
3,8	4,4	0,4	1,4	1,8	—	0,2	0,2	—	0,2	0,2	—	0,6	0,6	—	0,2	0,2	—	—	—															
—	—	123,6	35,2	158,8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123,6	35,2	158,8															
325,4	67,866,2	35,391,4	34,053,8	69,445,2	1708,6	1616,0	3324,6	1628,8	1335,4	2964,2	2277,8	1758,2	4036,0	2043,2	1840,6	3883,8	2024,0	1636,6	3660,6															



Norrbottens Län.

Födde.				Döde.			Vigde Par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
670	631	1301 År 1816	365	383	748	283
640	642	1282 1817	439	421	860	274
767	663	1430 1818	407	364	771	288
708	632	1340 1819	388	373	761	302
701	697	1398 1820	450	450	900	286
3486	3265	6751 S:a	2049	1991	4040	1433
744	722	1466 1821	392	352	744	324
747	679	1426 1822	402	347	749	259
813	759	1572 1823	396	381	777	325
741	703	1444 1824	398	394	792	320
763	745	1508 1825	410	378	788	298
308	3608	7416 S:a	1998	1852	3850	1526
868	759	1627 1826	437	409	846	332
825	809	1634 1827	492	438	930	332
859	816	1675 1828	554	579	1133	352
866	833	1699 1829	496	474	970	360
858	880	1738 1830	517	461	978	329
4276	4097	8373 S:a	2496	2361	4857	1705
805	758	1563 1831	490	434	924	304
791	800	1591 1832	482	445	927	270
752	720	1472 1833	613	568	1181	282
781	745	1526 1834	471	493	964	256
1078	1052	2130 1835	419	451	870	327
4207	4075	8282 S:a	2475	2391	4866	1439
832	777	1609 1836	446	473	919	290
745	725	1470 1837	593	574	1167	254
827	754	1581 1838	523	575	1098	271
734	708	1442 1839	686	654	1340	309
771	690	1461 1840	556	570	1126	286
3909	3654	7563 S:a	2804	2846	5650	1410
787,4	748,0	1535,4	Medium af alla dessa 25 åren	472,9	457,6	930,5	300,5

d:o af Nativitets-
öfverskottet 314,5 290,4 604,9 000

I Stockholms Stad.

Födde.				Döde.			Vigde Par.
m.	q.	S:a.		m.	q.	S:a.	
1399	1411	2810	... År 1816	1493	1315	2808	754
1344	1331	2675	... 1817	1600	1550	3150	581
1272	1271	2543	... 1818	1720	1547	3267	603
1263	1252	2515	... 1819	1821	1840	3661	560
1130	1081	2211	... 1820	1906	1828	3734	509
6408	6346	12,754	... S:a	8540	8080	16,620	3007
1236	1192	2428	... 1821	1610	1354	2964	608
1342	1309	2651	... 1822	1593	1293	2886	697
1393	1312	2705	... 1823	1544	1269	2813	763
1346	1346	2692	... 1824	1775	1381	3156	711
1347	1350	2697	... 1825	1622	1380	3002	732
6664	6509	13,173	... S:a	8144	6677	14,821	3511
1456	1285	2741	... 1826	2080	1712	3792	745
1305	1234	2539	... 1827	2212	1774	3986	586
1338	1338	2676	... 1828	2431	1864	4295	650
1216	1249	2465	... 1829	2555	1851	4406	626
1219	1235	2454	... 1830	2111	1590	3701	652
6534	6341	12,875	... S:a	11,389	8791	20,180	3259
1299	1271	2570	... 1831	1852	1759	3611	605
1275	1232	2507	... 1832	1621	1427	3048	581
1400	1400	2800	... 1833	1681	1399	3080	664
1397	1304	2701	... 1834	3603	3374	6977	664
1405	1308	2713	... 1835	1459	1244	2703	763
6776	6515	13,291	... S:a	10,216	9203	19,419	3277
1447	1344	2791	... 1836	1964	1522	3486	701
1297	1224	2521	... 1837	2105	1728	3833	674
1377	1337	2714	... 1838	2443	1918	4361	572
1287	1279	2566	... 1839	1794	1510	3304	607
1394	1359	2753	... 1840	1814	1505	3319	583
6802	6543	13,345	... S:a	10,120	8183	18,303	3137
1327,6	1290,1	2617,7	Medium af alla dessa 25 åren	1936,4	1637,3	3573,7	647,6

d:o af Mortalitetens
609,0 347,2 956,2 ... öfverskott.



I hela Riket.

	Födde Oäkta Barn.												Död-födde.
	I Stockholm.			I Öfrige Städerne.			På Landsbygden.			Summa.			
	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	m.	q.	S:a.	
År 1816	504	549	1053	466	472	938	2266	2132	4398	3236	3153	6389	2221
1817	502	522	1024	411	447	858	2118	1979	4097	3031	2948	5979	2089
1818	453	468	921	423	410	833	2026	1974	4000	2902	2852	5754	2110
1819	455	467	922	405	412	817	2141	1980	4121	3001	2859	5860	2169
1820	402	386	788	408	419	827	2065	1873	3881	2818	2678	5496	2148
S:a	2316	2392	4708	2113	2160	4273	10,559	9938	20,497	14,988	14,490	29,478	10,737
År 1821	472	459	931	460	432	892	2286	2157	4443	3218	3048	6266	2423
1822	524	525	1049	558	481	1039	2513	2324	4837	3595	3330	6925	2547
1823	506	502	1008	498	560	1058	2544	2570	5114	3548	3632	7180	2539
1824	476	578	1054	496	446	942	2344	2154	4498	3316	3178	6494	2499
1825	484	528	1012	490	502	992	2370	2327	4697	3344	3357	6701	2652
S:a	2462	2592	5054	2502	2421	4923	12,057	11,532	23,589	17,021	16,545	33,566	12,660
År 1826	564	497	1061	520	497	1017	2360	2206	4566	3444	3200	6644	2565
1827	475	452	927	431	437	868	1902	1891	3793	2808	2780	5588	2382
1828	487	515	1002	407	434	841	1889	1847	3736	2783	2796	5579	2604
1829	452	446	898	397	433	830	2224	2011	4235	3073	2890	5963	2797
1830	441	483	924	476	450	926	2007	1990	3997	2924	2923	5847	2619
S:a	2419	2393	4812	2231	2251	4482	10,382	9945	20,327	15,032	14,589	29,621	12,967
År 1831	494	492	986	440	418	858	2005	1922	3927	2939	2832	5771	2571
1832	510	470	980	437	430	867	1831	1782	3613	2778	2682	5460	2685
1833	528	563	1091	484	451	935	2266	2096	4362	3278	3110	6388	2933
1834	628	568	1196	516	501	1017	2475	2308	4783	3619	3377	6996	3116
1835	593	563	1156	499	485	984	2298	2236	4534	3390	3284	6674	3071
S:a	2753	2656	5409	2376	2285	4661	10,875	10,344	21,219	16,004	15,285	31,289	14,376
År 1836	619	554	1173	542	471	1013	2191	2129	4320	3352	3154	6506	3022
1837	519	468	987	502	493	995	2150	2131	4281	3171	3092	6263	2807
1838	554	583	1137	477	449	926	2129	1975	4104	3160	3007	6167	2805
1839	540	534	1074	472	435	907	2122	2011	4133	3134	2980	6114	2882
1840	615	614	1229	583	496	1079	2587	2484	5071	3785	3594	7379	3169
S:a	2847	2753	5600	2576	2344	4920	11,179	10,730	21,909	16,602	15,827	32,429	14,685
Medium af alla dessa 25 åren	511,9	511,4	1023,3	471,9	458,4	930,3	2202,1	2099,5	4301,6	3185,9	3069,4	6255,3	2617,4

Litt. H.

Döde.

I Barns- börd och af Missfall.	I Smitt- koppor.	I hela Riket.	Af Olyck nelser.																		
			Barn- mörd.	Mördade äldre personer.		Sjelf- mördare.		Af starka drycker.		Ihjäl- frusne.		Drunknade.		Krossade af fall och utvärtes skador.		Ihjälösade.		Ihjälslagne af åskan.		A vå ou	
				m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.	m.	q.		u
606	690	År 1816	4	3	23	3	87	22	20	1	64	16	643	156	186	29	23	13	3	4	
644	242	1817	7	5	17	4	96	27	13	—	46	9	670	167	188	29	12	13	2	2	
649	305	1818	4	3	20	8	102	27	18	1	36	9	652	147	185	28	21	11	4	6	
624	161	1819	8	2	25	16	95	16	8	—	22	17	819	144	171	34	13	16	17	15	
647	143	1820	8	3	22	4	117	21	16	—	52	13	714	136	196	26	13	7	8	7	
695	37	1821	8	9	29	8	114	35	42	3	52	8	802	144	307	83	22	15	3	1	
736	11	1822	5	5	30	13	113	40	25	2	19	9	1059	174	246	45	13	13	4	4	
694	39	1823	7	9	23	9	119	32	38	5	35	8	876	184	256	48	21	16	3	2	
534	618	1824	3	4	30	2	122	30	28	5	35	12	1000	205	292	61	13	18	4	2	
567	1243	1825	7	3	32	2	115	35	33	2	40	8	1006	179	290	40	26	9	3	3	
601	625	1826	4	6	25	4	138	33	31	2	25	7	1039	177	305	30	31	10	6	5	
569	600	1827	10	3	23	3	115	29	21	2	55	26	741	151	261	47	16	14	4	1	
673	257	1828	6	3	19	9	158	34	47	3	81	20	980	169	338	49	21	3	6	3	
718	53	1829	10	6	29	5	154	27	50	12	105	23	797	136	345	60	31	10	6	4	
623	104	1830	13	4	30	4	153	42	39	7	80	19	836	151	324	50	24	11	5	—	
554	612	1831	5	6	26	5	146	46	21	2	61	11	708	137	243	55	10	4	3	4	
512	622	1832	4	1	31	10	107	41	33	1	31	8	859	174	248	39	21	10	1	4	
595	1145	1833	5	6	38	5	139	30	68	1	48	10	887	186	304	52	21	4	6	1	
576	1049	1834	10	2	39	11	127	32	72	4	24	16	1095	198	308	46	23	6	21	15	
502	445	1835	5	4	30	5	123	30	33	—	72	19	854	151	306	34	13	6	3	2	
526	138	1836	4	3	28	12	152	40	56	—	86	14	805	170	275	41	20	4	2	2	
516	361	1837	4	6	35	4	159	35	73	8	54	9	830	148	309	34	28	9	3	2	
423	1805	1838	10	5	33	6	184	37	38	3	162	22	705	161	255	33	24	11	9	2	
464	1934	1839	2	7	26	7	201	43	41	5	72	11	856	129	272	44	13	14	17	5	
509	650	1840	10	4	44	10	171	48	52	9	59	10	791	147	269	35	22	7	1	1	
14,757	13,889	Summa	163	112	707	169	3307	832	916	68	1416	328	21,024	4021	6631	1072	495	254	144	97	8
			275		876.		4139.		984.		1744.		25,045.		7753.		749.		241.		
590,28	555,56	Medium	11,00		35,04		165,36		39,36		69,76		1001,80		310,12		29,96		9,64		

Dode.

Qvafde Barn						
Genom Mödrars eller Annors oförsigtighet.						
<i>Förhållandet i hvarje Län.</i>	Åren 1816 med 1820.	Åren 1821 med 1825.	Åren 1826 med 1830.	Åren 1831 med 1835.	Åren 1836 med 1840.	Summa.
I Stockholms	40	27	28	17	7	119
Uplands	42	46	39	27	14	168
Södermanlands	9	11	12	6	6	44
Östergötlands	146	159	155	116	78	654
Jönköpings	149	166	210	170	168	863
Kronobergs	142	194	239	156	166	897
Calmare	236	228	248	208	197	1117
Gottlands	1	1	1	1	1	5
Blekinge	40	86	52	49	61	288
Christianstads	87	98	98	85	71	439
Malmöhus	86	113	89	42	35	345
Hallands	53	62	85	48	50	298
Götheborgs	35	50	37	20	32	174
Elfsborgs	122	128	150	76	108	584
Skaraborgs	182	180	179	123	149	813
Wärmelands	220	245	243	195	178	1281
Nerikes	24	31	23	16	17	111
Wästmanlands	34	35	31	23	17	140
Kopparbergs	32	44	35	24	21	156
Gefleborgs	15	18	8	5	5	51
Wäster Norrlands	5	1	12	4	3	25
Jämtlands	14	11	5	2	—	32
Wästerbottens	2	3	2	2	1	10
Norrbottnens	1	3	3	—	1	8
i Stockholms Stad	3	1	2	2	1	9
S:a	1720	1941	1986	1417	1387	8631
					Medium	345,24

Lut. I.


Sammandrag, som viser Stats-Verkets årlige Utgifter i och för Kongl. Tabell-Commissionen under nedan uppräknade 43 år.

I enlighet med de i nåder fastställda årliga Staterne.	Aflöningen						Till Skriftmateri- alier.			Till Tabell- arbetets bedrif- vande.			Summa.		
	för Secretera- ren.			för Revisoren.			för Kammar- drängen.								
År 1802	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	400	—	—
1803	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	320	—	—
1804	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	480	—	—
1805	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	480	—	—
1806	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	480	—	—
1807	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	480	—	—
1808	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	480	—	—
1809	300	—	—	200	—	—	45	—	—	50	—	—	480	—	—
1810	300	—	—	200	—	—	45	—	—	—	—	—	480	—	—
1811	400	—	—	266	32	—	60	—	—	—	—	—	298	16	—
1812	400	—	—	266	32	—	60	—	—	—	—	—	298	16	—
1813	400	—	—	266	32	—	60	—	—	—	—	—	298	16	—
1814	400	—	—	266	32	—	60	—	—	—	—	—	298	16	—
1815	400	—	—	266	32	—	60	—	—	—	—	—	298	16	—
1816	616	44	—	435	28	—	99	20	—	—	—	—	480	—	—
1817	682	3	—	481	3	—	109	12	—	—	—	—	480	—	—
1818	693	5	—	488	37	—	110	44	—	—	—	—	480	—	—
1819	754	45	—	531	45	—	120	12	—	—	—	—	480	—	—
1820	730	31	—	514	47	—	116	28	—	—	—	—	480	—	—
1821	624	31	—	440	47	—	100	28	—	—	—	—	480	—	—
1822	559	24	—	395	24	—	90	36	—	—	—	—	480	—	—
1823	579	18	—	409	18	—	93	36	—	—	—	—	480	—	—
1824	559	24	—	395	24	—	90	36	—	—	—	—	480	—	—
1825	559	24	—	395	24	—	90	36	—	—	—	—	480	—	—
1826	559	24	—	395	24	—	90	36	—	—	—	—	480	—	—
1827	739	23	—	521	7	—	117	44	—	—	—	—	480	—	—
1828	579	18	—	409	18	—	93	36	—	—	—	—	480	—	—
1829	559	24	—	395	24	—	90	36	—	—	—	—	480	—	—
1830	590	20	—	417	4	—	95	20	—	—	—	—	480	—	—
1831	627	46	—	443	14	—	101	4	—	—	—	—	480	—	—

1830	590	20	—	417	4	—	95	20	—	480	—	1525	36	—
1831	627	46	—	443	14	—	101	4	—	480	—	1582	44	—
1832	722	44	—	509	28	—	115	20	—	480	—	1652	16	—
1833	588	10	—	415	26	—	95	4	—	480	—	1827	44	—
1834	559	24	—	395	24	—	90	36	—	480	—	1578	40	—
1835	599	12	—	423	12	—	96	36	—	480	—	1525	36	—
1836	588	10	—	415	26	—	95	4	—	480	—	1599	12	—
1837	602	27	—	425	27	—	97	12	—	480	—	1578	40	—
1838	656	32	—	463	16	—	105	20	—	480	—	1605	18	—
1839	697	25	—	491	41	—	111	28	—	480	—	1705	20	—
1840	629	3	—	444	3	—	101	12	—	480	—	1780	46	—
1841	612	24	—	432	24	—	98	36	—	480	—	1654	18	—
1842	612	24	—	432	24	—	98	36	—	480	—	1623	36	—
1843	612	24	—	432	24	—	98	36	—	480	—	1623	36	—
1844	612	24	—	432	24	—	98	36	—	480	—	1623	36	—
Tillkommer för åren 1841 med 1844 särskild uppförd tillökning för den under Lönerna inbegripne Spannemålen å 20 R:dr 20 sk. årligen														81 32 —
Summa	22,854	23	—	15,949	23	—	3627	44	—	400	—	19,491	32	—
Än i nåder beviljade Gratificationer för afslutningen af 1840 års Tabell-Verk, enligt Kongl. Brefvet den 30 Mars 1841	500	—	—	}	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1500 —
Dito den 10 Julii 1844	1000	—	—											
Samt för de sist framflutna 35 åren, af särskilda medel, till Skrifmaterialier utanordnade 50 R:dr årligen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1750	—	—	—	1750 —
Tillsammans	24,354	23	—	15,949	23	—	3627	44	—	2150	—	19,491	32	—
Beloppet														
Åren 1802 med 1815	4700	—	—	3133	16	—	705	—	—	700	—	5571	32	—
Åren 1816 med 1840	17,160	15	—	11,055	15	—	2521	12	—	1250	—	12,000	—	—
Åren 1841 med 1844	2494	8	—	1760	40	—	401	32	—	200	—	1920	—	—
Medium														
Åren 1802 med 1815	335	34	8	223	38	10	50	17	2	50	—	397	46	9
1816 med 1840	686	19	10	442	10	2	100	40	10	50	—	480	—	—
1841 med 1844	623	26	—	440	10	—	100	20	—	50	—	480	—	—



1



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
ASTOR LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS
NEW YORK



THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS

R

P 2

Methodisk öfversigt af Idislande
djuren, Linnés Pecora;

af

CARL J. SUNDEVALL.

Slut från V. A. Handl. 1844.

(Till Akademien inlemnad den 1 Febr. 1846).

(Fam. 5. Antilopina; continuatio).

26. ANTILOPE Pall. pars.

Ungulæ totæ compressæ. Pili tenues, depressi, sulcati. Rhinarium obsoletum. Cauda mediocris.

Genus veteri orbi proprium, quod, ut genera nimia, parum definita, evitemus, hoc sensu latiore conservamus. Si vero dividitur, 6 genera, neque pauciora, inde oriuntur; tum enim n:o 1—7 Gazellæ dicantur et n:o 8—12 totidem genera separata constituent necesse est. — Omnes sunt campestres, gregariæ, veloces, mites, pulchræ, staturâ ovillâ, sed tumor quidam nasi, in Ant. Saiga et Hodgsonii maxime, etsi diverso modo, evolutus, his vero minime peculiaris, vultum plerisque minus placidum reddit. Dorsum altitudine æqualis est.

1:mo Gazellæ Blainv., pars. (Typicæ).

Sinus sebacei ante oculos, curvati. Aures acutæ, longæ: dimidium caput excedunt. Cauda mediocris, flocco apicis parvo. Ungulæ altæ; ung. spuria parvæ, obtusæ. Cornua maris valde annulata, plerumque eximie lyrata;

feminæ, varie formata, sed in *A. subgutturosa* desunt. — Inhabitant Africam septemtrionalem et Asiam adjacentem, e Senegalia ad montes Belur et Altai camposque Indiæ: plagam campestrum et arenosam, sole ustam, desertis plenam. Hæ sunt veræ Gazellæ (*Algazel Arabum*), ob oculos formosos celebratæ. Facile mansuetæ fiunt, in domesticitate fere ut canes affabiles.

1. *A. dama*. — Afr. septentr. — Rufa, subtus cum uropygio pedibusque, capite maculaque juguli albis. Scopæ carpi adsunt. Aures longissimæ ($\frac{1}{3}$ capis). Sinus lacrymales parvi. Altit. dorsi plus quam 3-pedalis. Vortex dorsalis ante scapulas, a quo pili, in plaga, ad medium cervicem extensa, reversi sunt.
 - α) Var. occidentalis. (Sennaar, Egyptus). Læte rufa postice latissime alba. Facies juniorum paulum griseopicta; seniorum pure alba. *A. Dama* Licht. Rüpp. Ehrenb. *A. addra* Benn. Z. Pr. 1833 p. 2. (Mus. Stockh. et cet.).
 - β) Var. occidentalis. (Senegal, Marocco). Color corporis griseo-rufescens, usque in femoribus, tibiis et latere externo antipedum extensus. Faciei vitta antica et stria ocularis corpori fere concolores. *A. Dama* Pall. *A. Mhor* et *A. Nanguer* Bennett. Z. Pr. 1833. Inter priorem et sequentem media. Specimen vidi in Museo Francofurthano.
2. *A. Soemmerringii* Cretzschm. — Abyssinia inferior Rüpp.; Sennaar Hedenb. (Mus. Stockh. Francof. et cet.) — Dilute fulva, facie antica cum fronte, lineaque per oculos nigris (in femina griseo-mixtis). — Venter et regio circa caudam minus late alba, quam in prioris var. β. Pedes extus et latera capitis fulva; regio ocularis alba. — Aures, sinus lacr., scopæ, magnitudo, vortex colli, prioris. In omnibus, saltem 8, quas vidi, pili, per totum corpus, maculatim reversi, ut bene descripsit CRETZSCHMAR; quod vero tantummodo siccatione cutis factum esse docet RÜPPELL. Quam formationem in *A. dama* non nisi obsoletam vidi.
3. *A. lævipes* nob. Kevel Fr. Cuv. Mammif. Vol. 1 (sed minime *A. Kevel* Pall.) et Corine ibd. Vol. 2; — Scopis carpi nullis. Dilute fulva linea laterali nigra, difinita, lata (latit. sesquipollicari) — *A. dorcade* paullo major, ossibus pedum multo robustioribus. Aures longit. $\frac{1}{3}$ capis æquales. Sinus sebacei majores quam *A. dorcadis*. Vitta anteocularis indistincta, corpori con-

color. Cornua sub-compressa; *maris* valida (diam. baseos inter annulos 33 millim.), annulis remotioribus (in vetere 12) cincta; non multum curvata, apice lævi, antrorsum flexo; *feminæ* long. capis æqualia, lævia, teretia, apice paullum inflexa, diametro baseos 18 millimetrorum. — Hanc, nomine Dorcadis, egregie descripsit ÆLIANUS, Anim. lib. XIV, cap. 14. Animal senegalense, a Buffonio "*la Corine*" dictum (*Ant. corinna* Pall. Misc. et auct.), pæne videretur esse hujus femina, nisi in descr. Buffonii multo minor diceretur, quam A. dorcas et kevella. Sed icon Buffonii (ead. Schreb. V, tab. 271) ostendit lineam lateralem definitiorem et nigriorem, quam in affinibus, et metacarpos læves. Descriptio de utraque re silet, sed figg. dorcadis et Kevellæ præbent scopas et in plerisque sat correctæ sunt.

α) Naso immaculato. Sennaar, Mus. Stockh. ♂, ♀; Algier, m. Paris. ♂, ♀, jun.

β) Macula supra nasum nigricante. Senegal, Mus. Paris. Præterea ibidem, apud cl. FL. PREVOST, feminam vivam, senegalensem, a:o 1841 vidi.

4. *A. dorcas* (L.) scopis evidentibus; fulvescens, vittâ laterali fuscescente, lata, indefinita. Jugulum corpori concolor. — Aures longitudinem $\frac{3}{4}$ capitis æquant. Altitudo dorsi, in var. 1—3 fere bipedalis (circiter 0,6 m.). Cornua apice introrsum flexa. — Animal colore et cornibus sat variabile. Quot vidi varietates methodice propono, quæ vero ita inter se convenientes mihi visæ sunt, ut vix nisi unius speciei formas in iis invenirem nec dubito formas plures intermedias paullulumve distinctas existere, quas non vidi. Cui forsani varietatum seriei addendæ sunt *A. lævipes* et *A. subgutturosa*, etsi paullo magis differant. Omnium regio analis, obsolete fusco-cincta, et venter albi. Color dorsi in caudam descendit sed cauda majore parte nigra est. Linea definita, obscurior, adest in posteriore (inferiore) digitorum parte, ab ungulis ad ung. spurias. Tinctura laterum supra vittam lateralem pallidior apparet. Scopæ in carpis etiam in pullulis neonatis adsunt.

α (*A. Isidis*; "*Die Isis-antelope*" Licht.) pallide fulva vitta laterali fere obsoleta; scopæ carpi pallidæ; linea post-digitalis pallida vel grisescens. Vitta ocularis corpori concolor. Nasus immaculatus. Cornua teretia; *maris*, basi modice curvata; diameter baseos, in annulis, 30—31 mm.; apex lævis brevis, introrsum valde

curvatus. Cornua *feminæ* tenuiora (diam. circiter 15—20 mm.), vix breviora, quam maris; plerumque sublævia, subrecta, apice vario modo inflexa; interdum annulata et cornibus maris fere similia. — Sennaar (Mus. Stockh. ♂ ♀), Nubia, Egyptus, Arab. Petræa (M. Francof. Berol. Paris). — A. Dorcas Licht. Darstell. tab. 5. Sæpe, ut egregie observavit LICHTENSTEIN, in monumentis Egypti picta, colore læte fulvo agnoscenda. Hinc, si distincta species haberetur, nomen ab eo propositum accipiendum.

β (A. Kevella Pall. sec. Buff.) — fuscior, vitta laterali sub-nigricante, oculari fusca; digitorum stria postica nigra; scopæ fuscae. Cornua *maris* majora, sat compressa, fortius arcuata, in adulto 20 ad 23-annulata, apice brevi, valde inflexo; *feminæ* tenuiora, sublævia. (Aures breviores apparent, sed incertum videtur an siccatione factum sit).

*) Macula nasi nigricante. Cornua *maris* validiora; diameter baseos, inter annulos, usque ad 35 millim. — Marocco (Mus. Stockh.). — Hic est BUFFONII *Kevel*, e Senegalia.

**) Macula nasi nulla. Cornua paullo tenuiora; diameter baseos, cum annulis 32 millim. — Barbaria (Mus. Stockh. Paris). Feminam hujus varietatis non vidi, eam vero a "*Corine*" Buff. non multum differre verisimile est. Conf. supra: *Ant. lævipedis*.

γ (A. dorcas Pall. sec. Gazelle Buff. et Barbary Ant. Penn. Synops. p. 33. c. fig. in titulo) — fuscescens, lateribus glaucescens, vitta laterali sub-castanea, oculari fulva fuscaque. Digitorum linea postica nigra. Scopæ fuscae. Jugulum albidum. Cornua *maris* valida, subteretia, minus curvata, apice brevi, sub-antrorsum, nec multum, curvato; fere ut A. lævipedis formata, sed annulis aliquantum pluribus. *Feminæ* tenuiora, varie formata.

*) Dilutior, macula nasi nulla. (♂, ♀, jun. Mus. Paris). Patria? —

**) Fuscior, macula nasi nigricante. — Algier (Mus. Paris ♂ ♀). *Gazelle* Buff. *Kevel gris* Fr. Cuv. Mammif. Vol. 3 et 4. — *Ant. Cuvieri* Ogilby, Z. Proc. 1840 p. 35.

δ (A. arabica Ehr. Licht.). Colore priori simillima, sed jugulum colore corporis tinctum et scopæ pallescentes. Nasus superne fuscus. Præterea differt sta-

tura majore et cornibus minus curvatis, apice longo, lævi, leviter antrorsum flexo. — Arabia (Mus. Berol. Vivam, ♂ ♀, Amstelodami 1841 vidi).

3 (A. Bennetti Sykes, Z. Pr. 1831 p. 104) — fulva, vitta laterali obsoleta, digitis postice albidis; scopis nigricantibus. Cornua fere prioris: apice longo ($\frac{3}{4}$ totius cornus), leviter curvato; feminae sublævia, subrecta, ut in var. α (Isidis) cui simillima est colore et magnitudine. — Habitat in locis editis peninsulæ Indicæ. — Feminam, naso immaculato, e Chandernagor Indiæ allatam, Parisiis vidi. Marem, maculâ nasi nigrâ, descripsit SYKES l. c. Specimen e Museo Britannico in litteris benevole descripsit clar. J. E. GRAY. Linea ante oculos fulva, ut in var. α , neque nigra.

Obs. *Ant. cora* Ham. Smith, Griff. V, 333, ex Arabia orientali, huic peraffinis apparet, sed pictura faciei nigra paulum differre videtur. Multo minor et lætius fulva esse videtur quam *A. arabica* Ehr.

5. *A. leptoceros* Fr. Cuv. Mammif. IV, — cornibus ntriisque sexus longis, subrectis, parallelis. Forma, pictura, color et magnitudo *A. dorcadis*, inter cujus varietates melius forsitan enumeraretur. — Sennaar. (Non vidi).

6. *A. subgutturosa* Güld. Licht. Grisea, vitta laterali dorso concolore, supralaterali pallida; auriculis dimidiam capitis longitudinem vix excedentibus — Armenia, Persia septemtr., Tartaria. Dorcadi simillima, et pro ejus forma septemtrionali habenda. Differt, præter notas supra relatas, pilis longioribus, densioribus, quod præsertim in auriculis apparet; magnitudine paulo majore, picturâ alba latius extensa, jugulo quoque albo, feminâ denique ecorni. Scopæ fuscæ.

2:o Radii generis;

minus sibi invicem, quam *Gazellis* affines, vix ulla diagnosi communi describi possunt. Omnes igitur, præter *A. gutturosam*, si a prioribus generice separantur, in diversa subgenera abituri, quorum nomina propria infra addidimus. Naturæ vero maxime congruum videtur si omnes ut species hujus generis, formâ ut patriâ aberrantes, habeantur. Undique enim patriam *Gazellarum* ambiunt, easque in Europa, Asia orientali, montibus Indiæ et Africa meridionali repræsentant, nec multum ab earum formam differunt.

7. *A. gutturosa* Pall. griseo-fulvescens, regione anali et supra-caudali caudaque brevissima albis. Scopæ nullæ; aures acutæ, breves (vix excedunt $\frac{1}{2}$ capitis). — E Mongolia et Manschuria. Major: altitudo dorsi $2\frac{1}{2}$ pedum. (800 m.m.). Caput pro corpore paullo majus et crassius, quam in præcedentibus. Sinus sebacei minuti. Mas larynge gibbo et sacculo moschifero insignis. Cornua maris fusca vel cinerea, fere ut *A. dorcadis* formata, alte annulata, sed tenuiora, capite breviora, compressa, apice lævi, brevi, bi-pollicari, non multum curvato; feminæ nulla. Hæc, etsi auribus caudaque brevibus et larynge maris gibbo a prioribus differre videretur, ab iis tamen generice distingui nequit. Forma, inter *A. subgutturosam* et *A. tartaricam* intermedia, hanc cum sp. prioribus egregie connectit. Caput, pedes, pili et cet. omnino priorum. (Mus. Stockh. — Conf. Descriptionem bonam Pallasii: Spicil. XII, p. 45. Icon, ibd. tab. 2 [et eadem in opere Schreberi] bona, sed rostro nimis crasso).
8. *A. tatarica* (L.); *A. saïga* Pall. naso tumido, linea faciali convexa, naribus arcte approximatis. — Auriculæ breviores quam $\frac{1}{2}$ capitis, obtusæ. Color fulvescens, ventre et reg. anali (non supra caudam) albis. Scopæ corpori concolores. Sinus sebacei minuti. Ungulæ dorcadis. Cornua maris flavescentia, annulata, irregulariter sub-lyrata; feminæ nulla. Magn. fere Damæ. — "E Polonia ad Altai et Irting" (Pall.). "Usque in Moldaviam et Valachiam ac Hungariam dispersa (Forst. Descr. p. 391). "Ingentes greges, usque 10,000 simul pascuntur" (ibd). Hodie minus frequens videtur. Forma borealis, a Gazellis propriis per Caucasum separata. (Mus. Berol. Francof. ♂ ♀). — Genus *Colus* Wagn.
9. *A. cervicapra* Pall. ungulis acutis; ung. spuriiis majusculis, subcervinis. Sinus sebacei magni. Aures acutæ, long. dimidio capiti æquales. Scopæ fusæ. — Rufofuscescens subtus alba. Facies corpori concolor, orbita alba, vittis ante oculos nullis. Junior pallidior vittâ supra-laterali albida. Cornua maris longa, spirali-flexuosa, divergentia, valde annulata; feminæ nulla. — Indiâ (Mus. Francof. Paris. Lugdun.). — Typus generis *Antilopes* Pall.; l'Antilope Buff.
10. *A. Hodgsoni* Abel; Wagner, Suppl. p. 420. — "E schistolore fulvida, tumore molli utrimque supra nares."

"Sinus sebacei desunt." "Cornua *Maris* longissima, compressa, leviter lyrata, 15—20 annulata, apice lævia; *feminae* nulla" et cet. — In campis alpinis Tibetanis. — Genus *Pantholops* Hodgs. Wagn., Gazellis præsertim affinis videtur. (Non vidi. Conf. Hodgson Z. Pr. 1834 p. 80). Vellus, teste cl. J. E. GRAY, in litteris, densa, elastica, ut in *Ove fera*. Icon ABELII, quam benevole communicavit cl. HARTLAUB, præbet aures breves ($\frac{1}{3}$ capis); caudam æqualem $\frac{3}{4}$ capitis; staturam fere caprinam.

11. *A. euchore* Forst. Sparrm. Licht. — dorso posteriore albo, plicis cutaneis tecto. — Aures acutæ, $\frac{3}{4}$ capitis excedentes; sin. sebacei parvi; scopæ nullæ. Rufa, subtus alba, vitta laterali fusca; caput album; in juniore et femina frons et linea per oculos, ad nasum ducta, rufæ. Ungulæ acutiores, postice minus prominulæ, quam dorcadis. Cornua utriusque sexus fortius flexa, apice teniora. Altitudo dorsi $2\frac{1}{4}$ pedum. — In Africa meridionali vulgaris, per greges numerosissimos vagatur, Dorcadem ibi repræsentans; quare, si generice distincta haberetur, *Antidorcas* appellari posset. (*Αντι*, pro, in loco; et *Δορκας*).
12. *A. melampus* Licht. scopa infra medium metatarsum, externa, nigra; carpi nulla. Sinus sebacei unguulæque spuria desunt. — Fulva macula supra ang. ant. oculi, ventre, gula labiisque albis. Stria dorsi postremi caudæque, striaque utrimque ad anum nigræ. Latera corporis dilutius fulva, limite distincto. Auriculæ dimidio capite longiores, apice nigræ. Ungulæ acutæ, minores, postice corneo-cinctæ, minus prominulæ. Cornua maris longa, valida, bis valde curvata, annulis multis, irregularibus, valde prominulis; extus verolævia; femina nulla. — Animal elegantissimum, Cervo non multo minus; Altit. dorsi fere $3\frac{1}{2}$ pedum. Africa meridionalis incola, loca montosa et sylvatica amat, neque, ut præcedentes, in campis vagatur. Etiam forma a prioribus magis discedit. Potius igitur quam præcedentes generice distinguitur, et *Apyceros* appellari potest; (*Απυκρωος*, alta cornua gerens). — Mus. Stockh. Berol. Paris.

27. DICRANOCERAS Ham. Sm. Mazama Og.

Pili crassi, spongioso-cellulosi (Cervini).

Ungulæ acutæ, postice dilatatae. Cauda brevis.

Sinus lacrymales, Rhinarium et Ung. spuria desunt.

Solum est animal Americæ, quod Antelopinum dici possit; certe Gazellis affine structurâ pedum capitisque, habitu corporis indoleque campestri. Sed etiam Capras, latitudine frontis situque cornuum, refert. Pilos ut in Ovibus feris formatos habet. Hac autem re, et forma singulari, uniramosa, cornuum, Cervos quoque refert.

1. *D. furcifer* Ham. Sm., Wagn. Suppl. — Ex America boreali interiore et occid. circa 50° lat. — Magnitudo Damæ. Aures acutæ, long. $\frac{3}{4}$ capitis æquantur. Griseus, plagâ anali, supra caudam extensa, pectore jugulique macula media et fascia superiore albis. Juba cervicis brevis, fusca. Cornua maris in orbita sita, erecta, apice retro-hamata, antice ramulo brevi, lato, acuto armata; feminæ nulla. (Mus. Francof. ♂ ♀; Lugdun. Richards. fn. bor. Amer. I, 261). — *Dicr. palmata* Ham. Sm. est nomen pro cornu, ramulo late explanato instructo, formatum, quod vero cornu animalis veteris hujus speciei fuisse, agnovit Richardson.

Fam. 6. Caprina.

Ungulæ spuria magnæ, globoso-tumidæ. Ungulæ ordinariæ altæ, compressæ. Labrum sulcatum.

Animalia montana vel alpino-campestria, gregaria, balantia, mediæ magnitudinis. Mares pro mole admodum fortes et robusti, cornibus sæpe ponderosissimis, curvatis armati. Feminæ graciliores, antilopina, cornutæ, præter *Oreotragum*. Caput sat simile capiti præcedentium; differt vero fronte multo latiore. Ungulæ magnæ, digitis crassiores; postice sat altæ. nec, ut priorum, ibi depressæ. (Conf. fig. 15—18 in Vet. Ac. H. 1844 tab. 14). Ung. spuria explicatione soleæ, huic familiæ peculiari, insigniter tumidæ. Scopæ nullæ. Cauda plerisque brevissima. Mammae 2 vel 4.

28. OVIS Linn. < *Ægoceros* Pall. Wagn.

Rhinarium nullum. Frons declivis, plana.

Nasus elongatus, convexo-arcuatus.

Ungulæ acutæ, acute marginatæ; postice humiliores, latiores, corneo-cinctæ.

Habitus faciei nonnihil alius, quam in Capris; sc. rostrum longius, paullum deflexo-curvedum, indeque ossa nasi convexa et linea menti concavo-curveda. Rostrum apex in utroque genere depressus. Nares fere longitudinales, limbo anguste nudiusculo, non vero coriaceo. Sinus lacrym. parvi vel nulli. Glandulæ interdigitales adsunt. Cauda brevissima, præter sp. domesticam. Mammæ 2. Vellus, in feris, pilis crassis, undatis, cervinis constat; in domesticis hi perduntur, lana vero miro modo augetur. Mentum (semper?) imberbe. Cornua, plerumque in utroque sexu, trigona, diametro maximo transversim posita; mox a fronte in circumflectuntur, cujus diameter minor est, quam longitudo capitis. — *Ovium* species, incolae alpium totius orbis septemtrionalis, sed maxima parte imperfecte cognitæ, tantum nominibus enumero. (Conf. Wagner, Suppl. et Vet. Ac. Zool. Årsb. 1842 p. 130).

α) Sinus lacr. evidentes; Cornua retrorsum directa.

1. *O. aries* L. *Ægoc. ovis* Pall. Wagn. — Cauda elongata, (corpus lanatum). — In statu fero ignota. Cornuum apices vel extrorsum, vel introrsum flexi.

O. guineensis L. forsitan ex alia stirpe africana orta? sæpe enim pedibus altis, naso fortius curvato, cauda longa, corpore pilis tenuibus, rectis, duris, (nitide rufis) tecto, agnoscuntur Oves ex Africa allatæ; quarum vivas aliquot, maxime robustas, nomine "Mouflon de Senegal" appellatas, Parisiis vidi.

2. *O. argali* Pall. Cauda brevissima; cornuum apicibus extrorsum directis angulisque anticis subæque promi-

nulis. — Omnes Oves alpium septentrionalium, animalia magna et valida, dum melius cognoscantur, pro varietatibus unius speciei enumerandæ videntur:

O. Polii Blyth. — Asia centralis. Tantum cornibus elongatis cognita.

O. argali Pall. — Altai.

O. nivicola Esch. — Kamtschatka.

O. montana Geoffr. — Amer. sept. int. (Rocky mount.).

O. californiana Dougl. — California.

3. *O. musimon* Schreb. Cauda brevissima; cornuum apicibus introrsum directis, anguloque externo rotundato, minus prominulo. Aures æquant long. $\frac{1}{3}$ capitis. — Alpes meridionales Europæ et adjacentes Asiæ inhabitant hujus forma varietates, quæ vix ut species distinctæ considerandæ videntur.

O. musimon auct. — Sardinia, Corsica.

O. cyprius Blas. *O. ophion* Blyth. — Cyprus. (Conf. Capram ammonem in App. II:da, de Pecoribus Linnæi).

O. orientalis Gm. *O. Gmelini* Blyth. — Armenia.

O. Vignei Blyth. — Khorasan.

β) Sinus lacrymales? Cauda? Cornua ad latera directa, apice retro-spectante.

4. *O. nahoor* Hodgs. — Tibet; Himalaya.

5. *O. burrhel* Blyth. — Himalayæ regio nivalis.

(? *O. cylindricornis* Blyth, e Caucaso, conf. Capram caucasicam).

γ) Sin. lacrym. nulli. Cauda paullo longior. Cornua apice divergentia (*Ammotragus* Blyth).

7. *O. tragelaphus* Cuv. — Abyssiniæ, Nubiæ, Barbariæ rupes. Ossa nasi subrecta. Animal iuter Oves et Capras medium.

Obs. *Ovis ixalon* Blyth, Ixalon probatum Ogilby, e Chili, nec non *O. sculptorum* Blyth, ut animalia adhuc incognita, e synopsi excludenda.

29. CAPRA L. < *Ægoceros* Pall.

Rhinarii inter nares rudimentum. Frons declivis, convexa. Ossa nasi breviora recta. Ungulæ totæ compressæ, intus non, postice vix nisi paullo hu-

miliores, apice obtuso-tritæ, soleâ convexa, elastica (pulvillata).

In Capris propriis (subdiv. α — ϵ) pili planati, sulcati et duri sunt. Frons alta, ante oculos impressa. Nares, ut Ovis, sat approximatae, sed macula interstitii cum parte limbi nuda, plus minus distincte coriacea; quod vero in masculis et senioribus evidentius apparet. Sinus lacrymales et Glandulae interdigitales desunt. Pedes antici in carpis curvati, ad flexionem proni. Ungulae in latere interno non minus altae, quam in externo, quod Capris peculiare est. Odor hircinus nota est hujus generis vix minus propria. Cauda brevissima. Mammæ 2. — Cornua in utroque sexu adsunt, adscendentia, minus curvata (sc. partes sunt curvaturæ, cujus diameter est longitudine capitis major); sectio baseos subovalis, diametro majore longitudinali, retrorsum vero a pari divergente. In Capris veris prope latera frontis exeunt. Mares plerique cornua, pro mole corporis, in classe Mammalium, maxima gerunt. Distributio geographica eadem quæ Ovium; neque minus, quam Oves, inter se similes sunt Capræ.

$\alphaAures dense pilosæ. Cornua maris maxima, cochleato-curvata; antice planata, tuberibus transversis nodosa; basi crassissima; hinc conice attenuata; apice acuta et valde convergentia; feminae parva. (Pili occipitis in sp. 1:ma similes pilis corporis, sed paullum vorticosi). Inhabitant alpes humiliores ad latit. 42—44° bor.$

1. *C. pyrenaica* Bruch et Schintz, facie antice nigra, lateribus pallida; cornibus intus planatis, carina postica (in mare) valde prominula. Aures acutæ, $\frac{2}{3}$ capitis æquantes.

Magnitudo *C. ibicis*. Color subfulvens, fuscogriseus, clarior, pictura definitiore, quam in affinibus. Maris pectus, scapula, vitta lateralis et femoralis antica nigricantia. Pedes, ut in *C. ibice* et plerisque, nigri, vittâ postica alba. Caput lateribus totis palli-

dis, facie tota antica cum vertice et occipite nigra. Barba minor, dependens. Cornua magna, basi parallela, dein valde divergentia, tandem retrorsum inflexa et convergentia; intus planata, vel paullum concava, carinis 2, antica et postica, prominulis, non vero inflexis. Carina anterior obtusa, minus prominens; posterior, in mare, subacuta et valde prominula. Hinc sectio cornus, infra medium sumta, minime trigona, sed rotundato-subquadrata, angulo interiore-postico valde producto, acuto; apicem versus hæc carina evanescit. Superficies antica nodis fere 14 (10—22 sec. Schintz) armata, quorum 2 in singulis anni accrementis siti; ipse vero apex lævis, subteres et subacutus. Cornu præter flexuras ita tortum, ut superficies antica pone medium exterior fiat, et carina inferior sursum fere spectet; longitudine, secundum curvaturas, bipedale (600 mm.) vel longius; crassitie baseos non cedit cornu ibicis, sed pone medium angustius evadit.

Femina similis mari, sed minor, imberbis, caret picturâ nigra pectoris et scapulæ; pedes latius albi, macula etiam in digitis alba, ideoque fere ut in *C. beden* picti. Cornua capite breviora, haud nodosa, minus, sed iisdem fere curvaturis ac in mare, flexa; non torta; carinis 2 interioribus æqualiter prominulis. — Specimina Musei Stockholmiensis, (♂ et ♀) e Pyrenæis prope Bagnères orta, a cl. EDM. de SELYS LONGCHAMPS accepimus. Ea quoque, quæ curâ cl. BRUCHII Moguntiis adsunt, vidimus. — (Conf. App. 2, de *Capra ibice* Linnæi XII).

2. *C. caucasica* Güld. Wagn.; *Ægoceros ammon* Pall. — Pedes (etiam feminæ) fere toti nigri. Cornua postice rotundata, nec carinata.

Præcipuam hujus *Capræ* notionem GÜLDENSTÆDTIO debemus, qui descriptionem bonam et extensam reliquit cum figura feminæ et capitis maris. Quas figuras, e schedulis defuncti auctoris edidit PALLAS in Act. Petrop. 1779, II p. 273, tab. 17 *a* et *b*. — Icones Schreberi, vol. V tab. 281 B, eadem sunt, et omnia quæ dixerunt Schreber, Pallas aliisque, ex eodem fonte hausta videntur. [Inter icones ad Zoographiam Pallasii adest figura maris (in fasc. 1:mo, tab. ad pag. 229), ex ambabus GÜLDENSTÆDTIANIS adulterata; corpori enim feminæ appositum est caput maris].

Altera

Altera figura, in iisdem iconibus edita (fasc. 2 tab. ad p. 224—230, fig. 6), cornu maris exhibens, originaria videtur et bene cum descriptione congruit; cornua vero in icone Gldenstdtii a descriptione omnino differunt.

Prter hc Keyserling et Blasius (Wirbelth. Europas p. 28) cornua maris, ut videtur e natura describunt, — et Nordmann, in Itin. Demidoffi, Vol. 3 p. 58, confirmat, Capram caasicam haud raro inveniri.

Aegoceros Pallasii, Rouillier, Bull. de Moscou 1841 p. 110, — Wagn. Suppl. 497, sine dubio idem est animal, quod Ovi sat simile dicitur. — Etiam *Ovis cylindricornis* Blythii ab hac sp. non differre mihi videtur.

C. caucasica prsertim affinis videtur C. pyrenaic. Cornua maris fere eodem modo flexa: valde divergentia, retrorsum curvata, apice valde introrsum flexa, partem line cochleat formantia (in figura Pallasiana etiam torta apparent). Differunt autem sectione transversali subovata, carin postica nulla, anticis duabus, obsoletis, quarum interior acutior, ut in C. ibice. Tubera lateris anterioris leviora, 2 et 2 in singulis anni accrementis approximata, alterno minore (Keys. et Bl.). — Mas barbatus, facie fuscus; (prterea, secundum descr. cit. Rouillierii, colore rufescens).

Femina imberbis. Cornua ejus capite breviora (5-pollicaria), tereti-compressa, sub-trigona, latere interno latiore, planato, rugoso; apice lvia, obtusa. Color ut in C. pyrenaica, intensior, fulvescens ventre anoque albis, fusco-cinctis; differt vero pedibus, etiam feminae, nigris, ut in ibice, vitta postica tantum parva, albida. Linea spinalis dorsi fusca.

Aures (sec. mensuras et icones Gldenstdtianas), utriusque sexus, form et magnitudine similes auribus prioris vel C. hirci. Magnitudo ingens: "Femina in lumbis 33 poll. Paris. alta" (Gld.); quod tamen nimium videtur. — Habitat in summis Caucasi jugis, incolis bene cognita et nomine *Tur* appellata (Pall. Rouill.).

β) *Aures dense villos. Cornua maris maxima, fere in uno plano curvata; antice late planata*, — (plerumque nodosa); basi crassissima, apicem versus compressa, lata, Feminae parva. Pili occipitis densissimi, breves, tenues,

valde vorticosi (glandulas forsan obtegentes). — Inhabitantes alpes maximas, centrales, Europæ et Asiæ, ultra 45° lat.:s.

3. *C. ibex* L. auriculis acutis, parvis: quartam capitis partem æquantibus.

Color griseofuscescens, magis uniformis quam in asfinibus; pictura laterum vix ulla, nisi vitta infra lateralis, parva, fusca. Facies fusca (in ♀ grisea), ad os et pone oculos pallescens; linea spinalis non distincta. Cervix maris pilis longioribus, sub-crispis, hieme albidis vel pallidis vestita. Pili corporis æstate breves, læves; hieme longi, cincinnati. Pedes nigri, vittâ postica alba, quæ tamen, in mare seniore, sæpe deest. Pili menti in mare elongati, adpressi, nec barbam formantes. Cornua *maris adulti* bipedalìa, in uno plano, minus, fere ad $\frac{1}{4}$ circuli, curvata, minime torta. Sectio baseos fere quadrata angulis posticis rotundatis, carinâ interiore-antica introrsum paullulum prominula. Cornua antice tuberibus 14—22, maxime variabilibus (interdum obsoletis; Mus. Francof.) armata; apice compressa, in seniore trita, indeque obtusa, sed in juvene subacuta. Cornua feminae capite breviora, 6 pollicaria, subteretia, carinâ antica acuta, introrsum inflexa, rugis serrata. — Specimina multa ex alpinis Helvetiæ, in museis descripsi, sc. in Stockholmiensi 3 mares; Hafniæ, ♂; Francofurthi, ♂ ex alp. pedemontanis; Lugduni, ♂ e Tyrolia; Basileæ, ♂♀; Strasburgi, ♂♀; Moguntia, ♂.

β (var. *Sarda*) a descr. *C. ibicis* alpinae differt barbâ maris brevi, ad latera prolixa, densa, in formam rotundatam quasi detonsa, pilis basi retrorsum adpressis, dein perpendiculariter curvatis, composita. Præterea cornua paullo longiora et fortius (sed in eodem plano) curvata, latere postico, etiam baseos, evidenter compresso-rotundata, sed tamen haud trigona dicenda; apice, ut *ibicis*, compressa et lata. Regio scapularis et infra lateralis paullo nigrior. In ceteris descriptio nuper data *C. ibicis* cum hoc congruit; aures ut illius parvæ. Femina vix ab alpina differre videtur. — ♂ et ♀ "e Sardinia allati" in museo Hafniensi adsunt, alii-que, ♂ et ♀, in Stockholmiensi asservantur, simul cum *C. ibice* alpino, a. 1835, e regione Cisalpina allati; sed loca unde oriuntur ignota sunt. Non vidi plura hujus varietatis specimina. — Mas musei nostri brevipilosus, obscurius fuscus, cervice infima palle-

scente; altitudo dorsi 32 pollicum (800 millim.); longit. cornus, secundum curvaturam, 770 m.m.

4. *C. sibirica* Ehr. et rec.; *Ægoc. ibex* Pall. — pallidius grisea, auriculis oblongis, $\frac{3}{4}$ capitis æquantibus; barba (utriusq. sexus) dependente; macula utrimque maxillæ inferioris (vel tota maxilla maris) nigrofusca.

Mas vetus, priore major, linea spinali subjubata regioneque scapulari et infra-laterali nigrofuscis. Pedes nigri, postice semper, latius quam in *C. ibice*, albi. Cervix hieme pallida. Cornua adulti plus quam 3-pedalia, nodis, ut in præcedente, paullo plures quam 20 armata; fortius curvata quam ibicis: apice antrorsum directo; in ceteris ut in *C. ibice*, et præsertim ut in varietate, nuper proposita, formata; postice enim, basi quoque, paululum compressa sunt. — Femina pallidior, barba minore, juba et linea spinali obsoleta. Pedes albi, vittâ antica brevi, ad carpos interrupta, et maculâ circa ungulas spurias nigris. Cornua capite paullo longiora, in seniore pedalia, leviter compressa, sectione elliptica, antice, basim versus, obsolete carinata. — Mas junior colore similis feminae, sed linea dorsi nigra adest. — Habitat in montibus altaicis (Mus. Stockh. ♀ vetus, a Prof. Petropol. Brandt missa; Hafn. ♂ ♀; Berol. ♂ ♀; Francof. ♂ ♀; Lugdun. ♂ ♀).

- 4 b. *C. skyn* (Wagn.) Suppl. p. 491; ex Himalaya montibus; tantum cornibus maris cognita, quibus affinis videtur *C. sibirica*. Cornua tamen longiora, usque ad $4\frac{1}{2}$ pedes longa dicuntur. Conf. l. c. et: Himalaya Ibex, Blyth, Z. Proc. 1840 p. 80. — *C. himalayana* Schintz Synops. 2 p. 463 (sec. Blyth).

- 4 c. *Capra* species hoc loco memoranda est, cujus mares duo in Museo horti Regii Parisiensis exstant, originis, quantum ego comperire potui, ignotæ. Mas: maximus, *C. sibirica* non inferior; fuscogriseus, pedibus (vix albio-pictis), capite cum barba maxima, pendente, linea dorsali ventrequæ postico nigris. Regio nasi pallescens. Plaga analis parva, alba. Vitta lateralis nulla. Aures $\frac{3}{4}$ longis capitis æquantes, acutæ, parvæ apparent. Cornua longissima, valde curvata, tota lævia; sectio basios rotundato-trigona, vel subsimilis quadranti circuli, angulo interno-postico subrecto, (etsi rotundato). Superficies omnes convexæ; interna et postica subæquales, tertia (antico-externa) reliquis latior. Carinæ,

s. anguli, superficies distinguentes: 2 posteriores rotundatæ; tertia anterior, tenuis, levissime prominula et introrsum flexa. Hæc igitur Cornua subsimilia sunt ibicis, quibus tubera deessent et superficies anterior cum exterior, depressione anguli interjacentis, in unam conjungeretur. Pone medium sensim comprimuntur; apice sunt valde compressa, lata, sub-torta et paululum divergentia.

Capra hæc, formâ cornuum memorabili fere media inter *C. hircum* et *C. ibicem*, si a stirpe genuina orta, neque hybrido modo nata inveniretur, *C. lævicornis* appellari posset. Patria, at diximus, ignota.

Obs. Pauca, quæ de Capris hybridis (e *C. ibice* et *C. hirco*) cognita sunt, a Wagnero collecta vel citata invenies in opere Schreberi, V p. 1294, et sub *C. ægagro* p. 1315.

γ) *Aures brevissime pilosæ*;

Cornua maris maxima, in uno plano curvata; planato-compressa, antice oblique planata, altissime nodosa, sectione rhomboïdea; feminæ, ut priorum, parva. Pili occipitis ut in Sect. *C. ibicis*; aurium brevissimi, sed densissimi. (Pedes albi, digitis quoque albis, vittâ antica nigra, ad ungulas spurias biramosa, qs. cruce nigra pulchre picti). Species meridionales.

5. *C. valie* Rüpp. Wirb. — ♂ magnus, fuscus, fronte gibba, crispo-pilosa. Aures longitudine æquant duas quintas partes capitis. Cornua cornibus sequentis simillima, sed majora. — Abyssinia (Mus. Francof.). Femina ignota.

6. *C. beden* Forsk. Wagn. — minor, fulva, fronte lævi, alta. Aures dimidio capite fere longiores, apice subrotundatæ. — Mas: barbâ magnâ lateribusque corporis fuscis; regione ante scapulas non obscura. Linea spinalis jubata, fusca. Cornua in uno plano valde curvata, lineam plano-spiralem formantia, apice acuta. Femina imberbis, lateribus minus vel vix infuscata; linea spinalis interdum obsoleta; in ceteris colore similis mari. Cornua altius annulata, sectione transversali elliptica. — Hab. in Egypto et Arabia (Mus. Stockh. et cet.); in Creta (Blas. Wagn. Suppl.). Specimina duo e Senegal, in M. Parisiensi, vix differunt, nisi pictura pedum nigra minore. Pictura autem fusca

corporis et capitis, in multis, quas vidi, nonnihil variabilis inventa; hieme præterea fusciores, æstate lætius fulvæ sunt.

δ) *Aures adpresso pilosæ; Cornua tota compressa,*

Cornua postice rotundata, antice compressiora, carinâ alta, tenui, haud nodosa (sæpe vero incisa vel qs. lacera. Pili occipitis paullum vorticosi vel distichi, similes pilis corporis. (Subg. *Hircus* Wagn. Suppl.; sed a prioribus, me iudice, haud generice separandæ).

7. *C. hircus* L. *Ægoceros* capra Pall. Wagn. Schreb. 1318; — cornibus apice compressis, (obtusis) intus concavis; divergentibus. — ♂ ♀ barbati. Auriculæ minus acutæ, æquant $\frac{1}{3}$ capitis. Cornua apice leviter torta; margine antico minus inciso, vix dentato; Femina non parva, ut in mare formata. — Varietates et monstrositates numerosas domesticas præterimus. Hæ autem varietates feræ hujus esse speciei credimus:

α) *Europæa* (*C. ægagrus* Cuv. nec Pall.). Magna. Fusco-grisea, lineâ dorsi cervicisque, collare ante scapulas, artubus vittæque laterali fuscis. Metatarsi et metacarpi postice (in ♀ latius) albi. Maris barba maxima cum facie, jugulum pectusque nigrofusca. Cornua maris gigantea, ut in domesticis formata. Aures auribus domesticæ simillimæ. Ceteræ partes, quæ in omnibus Capris propriis similiter formatæ sunt, neque in hac differunt. Femina mari fere similis nec multo minor (Mus. Lugd. et Paris.). — Ex alpihus Europæ meridionalis oriri dicitur, sed loca, ubi sponte vivant nobis plane ignota. Forsan, ut suspicatus est FR. CUVIER. aliique, origine hybrida, ex Ibice cum stirpe domestica, natæ sunt. (Conf. supra, p. 279, n^o 4 c et observationem ibi additam).

β) *Africana*. Marem et Feminam vivos, e Sennaaria allatos, Parisiis a^o 1841 vidi, colore fulvo insignes. Magnitudine ægagro longe inferiores; æquales domesticis ordinariis atque Capræ beden; huic pilis brevibus et colore fulvo similes, sed picturâ nigra, eadem quæ nuper descriptæ (α): collari nigro et colore pedum a *C. beden* distinctæ. Cornua magna, valde curvata, ut in *C. beden*, sed ut in *C. hircus* formata; margine antico compresso, undato, nec nodoso; apice compressa, paullum torta et divergentia; femina sat magna. Aures ut in domestica.

?γ) Asiatica (C. Falconeri Hügel; Wagner, Suppl. p. 499), — rufescenti-fusca (vel hieme (?) albida), magna cornibus maximis, valde spiraliter curvatis, tortis, apiceque complanatis et intus concavis, sursum directis et divergentibus. — Kabul, Tibet. Omnia de hoc animali cognita in loco citato collecta et cum descriptione originaria Wagneri collata. Iconem deinde dedit Wagner in "Hügels Kaschnir," IV. Hanc esse Capram hircum feram credit Blyth, qui etiam cornuum formam maxime variabilem esse docet (Z. Proc. 1840 p. 80). Animal ipse non vidi.

7 b. *C. ægagrus* Pall. — "in montibus Persiæ" et "Caucaso;" — colore, picturâ, auriculis et magnitudine simillima *C. ægagro* Cuvierii, supra descriptæ; differe videtur cornibus apice attenuatis, subteretibus et subacutis, intusque planatis (nec concavis et tortis). Cornua præterea tota in uno eodemque plano curvata, minus (fere ad $\frac{1}{2}$ circuli) arcuata, longius extensa, vagina cornea tenuiore, ideoque processu osseo frontali majore, quam in *C. hirco*; margineque antico, acuto, pro anni accrementis in angulos 6—8 obtusos, quasi rudimenta nodorum *C. ibicis*, prominente. Feminam ecornem dicunt Kæmpfer et Gmelin. — De vi, quam habeant notæ allatæ in specie Capræ, a *C. hirco* distincta, definienda, judicent ii, quibus animalia examinasse licuerit. Ipsi ex iis, quæ alii tradiderunt, fere tantummodo hausimus; quorum vix nisi hæc originaria censemus:

1:mo Notitiæ Kæmpferi de animali *Pasèn*: Amoen. p. 398, c. fig. p. 407 (inscripta Pasen et n:o 2).

2:io Descriptio brevis S. G. Gmelini in Itinere (Reise durch Russland, III p. 493), quam fere totam transscripsit Pallas in Zoogr. I, 226. Ea verò quæ ibi exclusa sunt (de ♀ ecorni etc.) in Spicil. XI p. 45 traduntur.

3:io Pallasii descriptio et icon cranii cornuti, a Gmelinio allati, in Spicil. l. c. (XI p. 45; tab. V, fig. 2 et 3). Eisdem vero figuras iterum apud Schreberum, V tab. 282, invenies.

4:io Notitiæ paucae, e schedulis Gûldenstædtii desumptæ, et a Pallasio in Act. Petrop. 1779, II p. 274 editæ. — Pallas ibi dicit, icones in Spicil. l. c. datis, "ad persicum specimen delineatas" esse, additque novam iconem cornus, a latere int. visi: ibd. tab. 176, fig. 2.

5:o Inter Icones ad Zoogr. Pallasii, Fasc. 2, tab. ad pag. 224—230, inveniuntur figg. 3, 4 et 5, quæ in Zoogr. l. c. "Gmelinianæ" dicuntur. Harum autem n:o 3 et 5 evidenter sunt eadem, quas in Spicil. l. c. dederat (nuper sub n:o 3:o citatæ), magnitudine diminutæ; sed fig. 4 est nova addita, cranium cum processis, vaginâ corneâ destitutis, repræsentans.

Reliqua omnia de *Ægagro* scripta, vel ex his fontibus hausta sunt, vel incerta, vel ad specimina europæa, vel cornibus aliter formatis referenda videntur. Sic incertum est an specimen Vindobonense, a Wagnero (Suppl. p. 502) descriptum, huc referri possit. Apparet igitur omnem de *Ægagro* notitiâ e quattuor viris supra citatis oriri, qui tantummodo specimina e montibus Persiæ descripserunt. Omnia vero de Capra *ægagro* collecta vel citata invenies a Schrebero, V p. 1266 et a Wagnero, ibd. p. 1315 et Suppl. IV p. 502.

Specimen masculinum, quod e Caacaso ortum dicitur, in Mus. Leydensi, e Petropolitano acceptum, asservatur; quod, cum ipse neglexissem, descriptione a cl. J. v. d. HOEVEN officiose suppeditata, bene cum iconibus atque descriptionibus Pallasianis congruum invenio; cornua vero paullo magis divergunt. — Specimen femineum Berolini adest, quod vero, suadente amicissimo Prof. ERICHSON, ab *ægagro* alienum habeo. Differt enim cornibus feminæ magnis, apice compressis, ut in *C. hirco*, et fasciâ nigra ante scapulas nulla. Sed color generalis fusco-griseus, paullum fulvenscens, idem ac *ægagri*. Præterea e Kirgisia campestris orta dicitur, quare dubium videtur, an sit animal domesticum.

Obs. Hæc omnia, nimis forsitan proluxa, ut ad vera cognoscenda conferrent, adnotavi; eodem vero consilio nunc addendum est, varietatem Capræ domesticæ in Suecia, præsertim boreali, inveniri, cujus mares cornua apice attenuata, subteretia, acuta, ut in *C. ægagro*, plerumque habent. Acies vero, s. carina antica differt; est enim alta, æqualis, summo margine lævis et subincrassata. Feminarum cornua sunt multo minora, rugosa, apice compressa, sub-obtusa. — Color corporis plerumque albidus; sæpe cærulescenti-infuscat, vittis 2 per oculos fuscis. Juba spinalis marium, sæpe longa, colore a corpore non differt.

e) *Cornua utriusque sexus parva, sublevia, teretia, leviter compressa, aliquantum distantia, paullum curvata. Aures longius pilosæ. Pili occipitis?*

8. *C. montana* (Ord); Harl., — alba pilis mollibus, mento, tibiis humerisque prolixè jubatis. — Rhinarium ut in *C. hircò*. Aures acutæ, longitudine æquales $\frac{1}{2}$ capitis. Cornua nigra, basi sub-annulata. — Sola Capra Americæ cognita. Habitat in montibus Am. borealis interioris, circa 50° lat. — Appellata est Antilope et cet. *americana, lanigera, columbiana* et *mazama*. Genus *Aplocerus* Ham. Sm. Nobis vero a Capris propriis minime separandum videtur hoc animal, quod in Mus. Lugdunensi vidimus.

29 b. RUPICAPRA H. Sm. Capella Keys. & Bl.

Cornua ad mediam frontem approximata, parva, erecta, teretia, apice retrorsum uncinata, acuta. Ungulæ in latere interno humiliores.

Aperturæ duæ glandulosæ pone cornua. Pili occipitis tennes, elongati, minus densi, vorticosi. **Mammæ 4.** Rhinarium paullo evidentius et ad marginem narium longius extensum, quam in Capris plerisque, sed vix aliter formatum in *C. beden* invenitur; nares præterea non longius distant quam in Capris. Odor hircinus, habitus externus, linea facialis concava, habitatio rupestris egregie caprina, minime animal antelopinum denotant. — Nomen antiquum *ἄγρος* Æliani, hodie Gems et Chamois exprimitur (Belon Obs. p. 120, 121. Ogilby).

C. rupicapra L. Antil. rup. Pall. et rec. — capite imberbi, flavescente, lateribus (quasi vitta lata per oculos) nigro. — Pili corporis fere cervini. Aures acutæ, sat pilosæ, longitudinem fere dimidii capitis æquantes. Ungulæ spurix extus planatæ vel paullum concavæ. Cauda brevissima, subtus quoque nigra. Macula fulva supra oculos. Color pro anni tempore variabilis. Femina similes mari, non multo minor, sed cornua minora. Plures varietates inveniuntur:

α) *sylvatica* (Waldthier Helvet.) major, altitudo dorsi maris pedum 2 $\frac{1}{2}$ (fere 75 centim.); gula albida; pectus

et jugulum fere totum fusca; color fuscus e jugulo ad aures extensus, albedinem gulæ cingens, vix a colore corporis distinctus. Aures intus albopilosæ. Pedes nigro-fusci, tantum in digitis pallescentes (an semper ita in femina?). Color corporis hieme nigrofuscus; æstate fulvogriseus, linea spinali nigra (in mare longipilosa). — Habitat in regione inferiore, sylvatica, alpium Helvetiæ et Tyrolæ, montiumque adjacentium. Specimina carpathica (♂ æstivus Mus. Stockh.) non differre videntur.

β) *alpina* (Grat-thier venatorum Helv.) e regionibus altioribus alpium Helvetiæ. Minor dicitur; mihi vero ignota.

γ) *pyrenaica*: ♀ (æstiva et hiemalis in Mus. Stockh. e Pyreneis montibus) minor: altit. dorsi 65 centim.; gula pallide fulva, colore fere lateribus corporis similis. Area fulva, in medium usque jugulum angulo acuto continuata, vittis 2 distincte fuscis, ad aures ductis, cingitur. Aures intus, ex parte fulvo pilosæ. Vittæ oculares latiores et nigriores. Color corporis æstate fulvus, linea spinali non distincta; hieme tantum in lateribus paullo fuscior, lineâ spinali ad occiput ducta, nigra (ut in var. α æstivali). Pedes semper fusco-fulvescentes. Cornua minora, qv. in var α, sed situs eorum non differunt, nec ullam formæ discrepantiam eruere potui. (Conf. Schintz Synops. 2 p. 453). — Marem non vidi. Colore, eodem modo ac femina, variabilis dicitur.

Obs. Rupicapra quoque inveniuntur in montibus Italiæ (hodie in Abruzzis), Græciæque (Conf. Wagn. Suppl. IV, 463. Ea, quam Belon describit, Obs. p. 120, non e Creta, sed e Græcia orta videtur), sed specimina ex his terris non vidi, neque satis descripta inveni. — Rupicapra caucasica, a Pallasio descripta (Zoogr. I p. 250), similis videtur pyrenaicæ, sed major: "altit. postica 2'8";" hieme fusca et "ungulæ spuria bilobæ." Eandem in montibus Persiæ inveniri dicit Pallas; ea vero Rupicapra, e Persia, quam post Ham. Smith enumerant auctores, "cornibus a radice curvalis, vitta oculari obsoleta pilisque teneribus," aliud quoddam pecus, forsitan *Nemorhedum goral*, indicare videtur.

29 c. HEMITRAGUS Hodgs. Kemas Ogilb.

Nares paullo latius distantes, maculâ rhinarii interjecta (paullo majore puam in Capris). Linea facialis recta. Cornua (saltem maris) brevia, lata, antice approximata, carinâ antica compressa, alta, porrecta (nec ut in *C. ibice* inflexa). Mammæ 4. — Toto habitu et conformatione corporis Capris affines. Odorem quoque hircinum notabilem adesse, docuit cl. J. E. GRAY.

1. *H. iharal* Hodgs. cornibus (maris) totis valde compressis, brevibus, latis, apice inflexo convergentibus, carina antica nodulosa. — Sp. magna; altitudo dorsi 3-pedalis. Pili corporis longi; præsertim collum totum longipilosum. Barba nulla. Aures parvæ, quartæ capitis parti æquales. Cauda brevissima. Color corporis obscure fuscens. Pedes nigri, vittâ postica, ut in Capris, alba. (♂ Mus. Francof.). — Variat, forte secundum anni tempora? pallida vel albida: *C. jemlahica* H. Sm.; *C. tubercornis* Wagn. Suppl.
2. *H. hylocrius* (Og.) cornibus brevibus, crebre rugoso-annulatis, crassis, sectione transversa baseos subquadrata; extus convexis, carina antico-interna porrecta. — Cornua feminae cornibus maris similia, sed minora. Caput fuscum, leviter fulvescente mixtum. Corpus rufescenti-fuscum. Pedes antice nigricantes. — Habitat in montibus Nepaliæ et, ut videtur, totius Indiæ. *Kemas hylocrius* Ogilby, Zool. Proc. 1837 p. 81 est femina; Conf. Wagn. Suppl. p. 503, notam, sec. Blyth, ♂ ♀. *Capra varryato* Gray, Ann. Nat. Hist. X, 267, mas. Animal ipse non vidi, sed non minus de loco systematico, quam de forma atque synonymia, in literis certior me fecit cl. J. E. GRAY.

30. NEMORHEDUS Ham. Sm.

Rhinarium magnum; ungulæ postice convexo-prominulæ, soleâ lata.

A Capris vix differunt, nisi naribus latius remotis et rhinario altius inter eas extenso. Frons quoque paullo minus alta; convexa tamen et lata.

Mammæ 4. Pili, ungulæ spuria, cauda brevis et totus habitus Capræ; semper tamen inter Antilopas descripta sunt hæc animalia. Cornua in utroque sexu subteretia, leviter recurvata, basi annulata.

α) Majores; sinu lacrymali distincto, parvo.
(Capricornis Ogilbyi).

1. *N. sumatrensis* (Penn. Fischer Synops. p. 470 et 639); *Ant. Duvaucelii* Ham. Sm. — Niger cervice ad medium dorsi gulaque albidis. — Nulla juba aut barba. Pili longi, rudes, caprini. Aures apice attenuatæ, longitudinem dimidii capitis æquantes. Magnus. — Sumatra (Mus. Paris. et Lugdun. ♂ ♀).
2. *N. bubalina*; *A. bubalina* Hodgs. Z. Proc. 1832; H. Sm.; *A. thar.* Hodgs Z. Pr. 1833; — nigrofuscus, pilis elongatis, rudibus, metatarso et metacarpo albidis. — Simillimus priori. Aures paullo minores visi sunt, $\frac{3}{4}$ capitis æquantes. — Nepal (Mus. Francof.).

β) Minores, sinu lacrymali nullo.

3. *N. goral* (Hardw.); Wagn. Supp. p. 459; Bouquetin de Nepal Fr. Cuvier Mammif. vol. 3. — Fulvescens subtus pallidior, gula alba. Rupicapræ subsimilis et magnitudine æqualis. — Nepal. (Ipse non vidi).
4. *N. crispus* (Temmin., Wagn.), pilis tenuissimis, laneo-subcrispis, elongatis; fuscus pedibus auriculisque obscuris, jugulo pallido. — Mas fuscior; femina fusco-albida. Aures $\frac{1}{2}$ capitis æquales. Barba non definita, sed caput subtus longipilosum. In loco sinus lacrymalis adest macula parva, subnuda, pilis brevissimis, densis, erectis, fuscis quasi pulvillulo hirta. Rhinarium, facies, cauda, pedes, ut in *N. sumatrensi* formata. Cornua inter se paullo remotiora. — E Japonia (Mus. Lugdun. ♂ ♀). Temm. et Schlegel, Fauna Japonica, Mamm. tab. 18, 19.

31. OREOTRAGUS (Pars Traguli H. Sm.).

Rhinarium magnum. Ungulæ altæ, postice compressissimæ, solea vix ulla, (apice trita).

Animal singulare: solum Caprinum in patria Sylvicaprarum (Africa infra deserta), et inter hæc

genera intermedium. Præsertim Rupicapram ibi repræsentare videtur, ut Nemorhedus goral in India et Dicranoceras in America boreali. — Capras refert fronte lata, naribus approximatis, statura robustiore, pedibus brevibus et anticis curvatis, ungulis spuriis subglobosis, forma caudæ, habitatione; Sylvicapris vero simile est facie recta, cornibus subulatis, erectis, in femina nullis. Pili crassissimi, undati, fere cervini, sed duri, striâ impressi. Ungularum forma huic generi omnino peculiaris; conf. fig. 15 (Tab. 2, ad initium hujus tractatus in volumine prioris anni). Sinus lacrymales parvi, in macula ante oculos nuda siti.

1. *O. saltatrix* Bodd. Jardine Nat. Libr. Ant. *Oreotragus* Forst. Gm. — Fuscus puncto pilorum subapicali flavo-albido. Magnitudo Capræ domesticæ minoris. Aures longitudini dimidii capitis æquales. Habitat inter rupes saxi arenacei Africæ meridionalis — Abyssinæ (Rüpp.). — ♂ ♀ M. Stockh. et cet.

Pecorum

Cohors 2:da, Digitigrada
(Tylopoda Ill.).

Solea pedis calcatoria digitis ambobus communis, usque sub apicem phalangis primi extensa. — Labrum fissum, ante nares productum. Dentes incisivi superne duo, laterales (initio tamen 4, sec. Wagnerum); infra 6. D. canini supra subtusque adsunt. Nares longitudinales, clausiles, dissepimento sat tenui distinctæ. Rhinarium et Sinus lacrymales nulla. Cornua typice desunt. Collum longum. Truncus corporis postice sat angustus et subtus pilis brevibus vestitus. Hinc femora postica, fere tota, extra truncum libera apparent, fere

fere ut in Homine et Simiis; qua re hæc animalia a plerisque ungulatis et unguiculatis differunt. Ungulæ parvæ, superne compresso-carinatæ; spuria desunt. Mammæ 4. Genitale maris quiescens retrorsum directum, quare urinam retrorsum mittit, sed erectione inversum; fere ut Equi, nec ut reliq. pecorum formatum. Apparatus peculiaris cellulosus in lateribus Ventriculi primi (ruminis), pro secretion aquæ adest. Mirum sane quod Camelina americana cum Camelis propriis omni fere forma convenient, magnitudine vero longe differant.

Fam. 7. Camelina.

Sola hujus Cohortis.

32. CAMELUS L. III.

Digiti lati, soleâ fere orbiculari, antice paulum incisa, conjuncti. Dorsum tubere maximo, compresso, carnoso instructum. — Animalia maxima, desertis arenosis mediis veteris orbis propria, hodie tantummodo in statu domestico cognita. Completam eorum historiam dedit A. Wagner in continuatione operis Schreberi (V, 2). Auriculæ obtusæ, vix longitudinem sextæ capitis partis æquantes. Nares undique marginatæ, quod huic generi peculiare videtur. — Dubitaverunt quidam an specificè distincti habeantur *C. dromedarius* et *C. bactrianus*, quia memoriæ proditum sit, prolem fertilem, etsi hybridam, ex iis gigni, cujus rei ulteriore confirmatione opus est; sed tamen, utcumque res ceciderit, satis constantes satisque distinctæ sunt ambæ formæ, ut sese spontaneas, neque domesticitate ortas præbeant, et ut specificè, secundum hodiernam consuetudinem, distinctæ habeantur.

1. *C. arabicus* Aristotelis, Plinii; Desm.; *C. dromedarius* L., *C. dromas* Pall.; — tubere dorsi unico. — E desertis Arabiæ, ut apparet, originarius, nunc ut animal principale domesticum Arabum dispersus, gentibus nomadibus, desertorum e Senegalia ad Indiam incolis, servit.

Ignoscant Zoologii quod nomen Linnæanum hoc loco mutandum censui; non ut novitias inducerem, sed quia nomen acceptum notiones falsas secum trahere videretur. Hic enim (*Cam. arabicus*) est *Camelus*, ab antiquitate ut nostris temporibus, proprie sic dictus. *Dromedarium* vero Europæi in oriente, recentiore nomine, varietatem ejus, cursu velociorem dicunt. Quam differentiam negligentes, Zoologi post Gessnerum omnes *Camelos arabicos* *Dromedarios* appellaverunt; alteram vero hujus generis speciem, *C. bactrianum*, *Camelum* proprie dictum habuerunt; quod omnino est perversum. Nomen igitur optimum et antiquum revocandum credidi.

Cameli domestici plerique, onerarii, fortiores et tardiores, ab Arabibus *Gimel* seu *Jemal* (non *Schemal*) appellantur. quo in nomine ebraicum $\gamma\eta\chi$ agnoscimus, unde orta sunt nomina $\kappa\alpha\mu\eta\lambda\omicron\varsigma$, *Camelus* et recentiora. Alii vero Cameli, cursu veloces et ad equitationem usitati, olim a Græcis $\delta\rho\omicron\mu\alpha\delta\epsilon\varsigma$ (cursores) appellati sunt, unde in medio ævo, ortum est nomen eorum, Arabibus tamen ignotum, "*Dromedarius*." *Dromedarii* igitur a *Camelis*, ut equi cursorii (qs. nobiliores) ab onerariis, differunt. Varietas cursoria, hodie in Egypto et Arabia vulgaris, *Camelo* onerario minor et corpore gracilior est. Equum cursu facillime vincit. Currrens collum protendit pedesque ejusdem lateris simul movet. Hic ab Arabibus *Hadjün* *) dicitur, quæ vox nomina varia, ab auctoribus memorata, refert; e. gr.: Chaldaicum *Hogenain* (Gesn.); *Egin* Prosp. Alpini; *Huguin* Leon. Africani. Hic vero auctor, *Camelos dromades* in Ethiopia *Raguahil* dici memorat.

2. *C. bactrianus* L. tuberibus dorsi duobus. — In desertis Mongoliæ ortus habetur, frigoris melius patiens. Domesticus ex Europa orientali (in Chersoneso taurica et circa flumen Don, ultra 50° lat:) ad mare Japoni-

*) Ha-dji-in; plur. Ha-dja-niin. Vocalis *a* fere ut *æ*, sive ut invoc. Anglicis: and, has, legatur.

cum et fines Indiæ servit. In Persia et Tartaria simul cum priore invenitur Altitudo dorsi inter tubera $5\frac{1}{2}$, interdum 6 pedum; tubera supra dorsum pedalia. — Hunc Græci, in bello Alexandri magni, apud Bactrianos, gentem tartaricam, cognoverunt. Aristoteles igitur, deindeque Plinius, eum Camelum bactrianum vocant.

33. AUCHENIA III.

Digiti angustiores; solea antice, ad medium usque fissa. Dorsum læve.

Animalia mediæ magnitudinis, campis et montibus alpinis Americæ meridionalis (sc. Peruvianis et Chilensibus) propria; ibi quoque domestica; gregaria, iracunda contra hostem spuentia, nuptias magna difficultate et situ fere cubante celebrantia. — Stria callosa, lanceolata, lamellas fragillimas, corneas secernens, in utroque latere metatarsi adest. Dorsum postice paullulo altius. Cauda brevis. Aures longiores, acutæ *).

1. *A. lama* Brandt, Wagn. (Cam. glama L.), — major, robustior, pilis subrectis (vel cincinnatis, neque crispis) tecta. Aures dimidio capite breviores. — Plantæ et ungulæ præsertim majores, quam in *A. vicunna*.

α) *Fera* (*A. huanaco* Auct.), brevius pilosa, rufescens facie superne nigricante, lateribus cinereo, auriculis fuscis; ventre albo. Sequentē paullo major (Wagn. Tschudi et plur.). — In alpinis Peruviaois spontanea. Formâ a varietate β nulla re differre videtur.

β) *Domestica* (*A. lama* auct.) pilis longis, pendentibus, sed inguina et venter, ut in tota fam. Camelina, brevissime pilosa. Color varius vel fuscus, vel etiam rufus, colori *A. huanaci* perfecte similis (Mus. Stockh.). Striæ callosæ medium metatarsum attingunt; externa multo

*) Ante impressionem hujus tractatus Faunam Peruanam Tschudii acquisivimus, ubi, p. 219 et seqq., hæc animalia novo proponuntur modo; cujus vero expositionem, cum nonnulla, paullum dubia, complecti videtur, in nota hoc loco offerimus, vetera supra in-

major, supra infraque alteram excedit. Macula ejusdem naturæ sub medio sterno, inter pedes anticos invenitur, quæ tamen in animali juniore firmior et pube tecta est. Carpi antice nudi, trito-callosi vel etiam pilis densis, vorticellatis tecti (Mus. Stockh.). Aures subacutæ, dimidio capite paullo breviores. Solea pedis antici (in specimine juniore, 8 decim. alto) præter unguem, 75 m.m. longa; ungula ejusdem valde compressæ, 25 m.m. altæ et plus quam 40 m.m. longæ, sed paullum deformis. (Mus. Stockh. 2 specim. juniora. Plura viva vidimus).

?y) *Domestica* (*Cam. pacos* L. sed vix Tschudii. *A. alpaca* Desm.) minor pilis mollibus, tenuissimis, pendulis, rufescentibus tecta. Forma præterea ignota. Callus pectoralis nullus dicitur. Conf. mox infra, in App. 2:a, de Pecoribus Linnæi. Hanc non vidi. Vix nisi variatio domestica prioris esse videtur. — (Obs. De *A. pacos* Tschudii, v. in nota suffixa. — Animal, Alpaca dictum, quod in Europa domesticum inducere nostris temporibus studuerunt, nondum vidimus.

tacta relinquentes. Species quatuor, quæ distinctissimæ dicuntur, ita proposita sunt:

2. *A. huanaco*, major, colore pilisque ut supra descripta. Caput longum [$\frac{1}{4}$ trunci], linea faciali convexa. Aures longæ [$\frac{1}{4}$ capitis], acutæ. Cauda subtus nuda, nigra. Stria metatarsi nuda "ut in Lama." Præterea vero a Lama differre dicitur defectu calli pectoris carpique et soleis multo majoribus [sed mensuræ ad utramque neglectæ]. ♂ altit. dorsi 30 poll. gall. (1,050 m.); longit. trunci (pect.-anum) 47; cauda 9; caput ad aures $11\frac{1}{2}$; aures $6\frac{1}{2}$. — Hanc tantummodo feram gigni dicitur; interdum captivam, mansuetam fieri, sed in domesticitate non propagari, et coitum cum *A. lama* semper sterilem evenire.

1. *A. lama* callo pectorali et carpis nudis, callosis, ab omnibus reliquis distingui dicitur. "Caput, quam in reliquis, brevius et aures breviores, nonnihil obtusiores quam *A. huanaci*". [Mensuræ allatæ indicant caput inter $\frac{1}{4}$ et $\frac{1}{3}$ trunci medium et aures exacte eandem rationem capitis, ac in huanaco, habentes]. "Cauda subtus pilosa. Soleæ minores. Pili longiores." Color varius dicitur, sed color rufus *A.*

2. *A. vicunna* (Mol.) minor, præsertim gracilior, pilis densissimis, tenuissimis, crispis lanata. Auriculæ acutissimæ, dimidio capite paullo longiores. — Color rufescens ventre albo; facies colore corporis pallidior, orbita nigricante. Striæ callosæ totæ supra medium metatarsum positæ; externa paullo altius sita, quam interna, sed vix major. Callus pectoralis deest. Carpi pilosi. Altitudo dorsi pedum $2\frac{3}{4}$ (850 m.m.). Solea pedis ant., per totam ungulam continuata, 72 millim. (præter ung. 50); latit. 42. Ungulæ trigonæ, multo minus compressæ, quam *A. lamæ*, 16 m.m. altæ, 27 longæ a basi dorsali. Aures 125 m.m. (♀ adulta Mus. Stockh. a cl. Tschudi accepta; vid. nostram iconem). — Fera in alpebus Peruvix. De cet vid. infra. — *Cam. vicugna* Mol.; Gm. — *Lama vicugna* Tiedem.; Fischer Syn. — Auch. *vicunna* Desm., Meyen, Wagn. — *A. vicunia* Tschudi, Wieg. Arch. 1844 p. 245; Wagn. Suppl.

huanaci inter varietates ejus non enumeratur. "Altit. $35\frac{1}{2}$ poll. (960 m.m.); Long. trunci 42 + cauda 9; caput ad aures $9\frac{1}{2}$; aures $5\frac{1}{2}$." — Tantum in statu domestico cognita.

3. *A. paco* Tsch. [vix reliq. auct.] ab affinibus distincta fertur staturâ minore, capite vero vix immutato (ergo pro corpore magno, multo longiore quam $\frac{1}{2}$ trunci), auribus brevibus ($\frac{1}{2}$ capitis), obtusis, et pilis, præter faciem artusque, ubique æqualibus, longis, pendulis. Callus pectoris deesse dicitur. Carpi pilosi. Stria metatarsi non commemorata. Cauda subtus nuda. Soleæ "magnæ." Altit. dorsi 30 poll. (810 m.m.); longit. trunci 31; cauda $5\frac{1}{2}$; caput ad aures 9; aures $3\frac{3}{4}$. — Tantum domestica cognita videtur.

4. *A. vicunia* (Tab. 17), a reliquis differt statura graciliore, auribus longioribus et cet. ut supra proposuimus; stria metatarsi callosa tantummodo interna describitur. ♂ altit. 30 poll (810 m.m. ut *A. paco*); long. trunci 29; cauda 7; caput ad aur. $7\frac{1}{4}$; aures 5. Soleæ ant. 76 m.m. longæ, 47 latæ. — Fera, nec domestica.

Ex eo, quod duæ formæ (*A. lama* et *paco*) tantummodo in statu domestico, reliquæ vero non nisi feræ cognitæ sunt, proni ad suspicionem fieri possu-

Appendix I.

Pecora dubia et genere incerta, olim inter Antilopas enumerata.

1. *A. lervia* Pall. "cornibus recurvis, rugosis, corpore rufescente;" "fasciculo pilorum insigni nuchæ et scopis genuum anticorum 5-pollicaribus notabilis;" Spicil. Zool. XII p. 12, secundum Shaw Itin. Fishtall s. Lervæ (Solus fons). Ex Africa boreali. Magnitudo vituli; cornua plus quam pedem longa. — Cf. Fischer Synopsis p. 480. — Quid? an *Ovis tragelaphus*, minus correcte descripta?
2. *Ant. kob* Erxl. sec. Buffon Hist. Nat. XII p. 210 et 267, t. 32 fig. 1, cranium. (Solus fons). — E Senegalia. Magnitudo Damæ. Cornua 13 pollices (mens. Gall.) longa, curvata; apice convergentia, approximata, lævia; basi, paullo ultra medium, annulis 7 elevatis, postice

mus, duas domesticas ex feris ortas esse, et quidem ex *A. huanaco*, cui præsertim affines videntur. A qua stirpe, ut pleraque animalia domestica, magnitudine, colore et formâ paullum mutatae apparent, quod mihi saltem de *A. lama* indubium videtur. Adest enim in Museo nostro Zoologico specimen juvenile *A. lamæ* Tsch., in statu domestico natum: callo sternali præditum, carpis nudis, callosis, pilis longis, cauda subtus pilosa et cet. ungulisque deformibus; cujus vero color et pictura eximie cum descriptione *A. huanaci* in opere Tschudii convenit. Discrimen igitur coloris non invenitur, formæ exigua apparet, si revera ulla adesset. Alterum vero specimen nostrum *A. lamæ* domesticæ, colore album, carpos habet ut *A. huanaco*, pilosos et callum pectoralem minutum; sed magnitudine, pilis, auriculis et cet. ut *A. lama* agnoscitur. — *A. paco* Tschudii magis differre videtur; sed tamen differentiae multo minores sunt quam eæ, quas inter varietates animalium domesticarum nostratium (*Capræ*, *Ovis*, *Canis*) novimus. Impedimenta propagationis, ut bene observat Tschudi, in coitu horum animalium, jam inter æquales difficili, inter has varietates, propter magnitudinis differentiam impossibili, quærenda videtur.

obsoletis, rugosa. Cranii longitudo $7\frac{1}{2}$ pollices, sine impressione pro sinu lacrymali.

3. *Ant. quadrisca* Ham. Sm. Griff. An. Kingd. IV c. fig. — Senegal. — Griseus ventre albo, fasciculo tarsorum et carporum fusco. Magnitudo fere Capreoli. (Conf. Fischer Synops. 635; — Wagn. Suppl. 447; sec. Ham. Sm.). — Affinis videtur Sylvicaprae et Calotrago; cornua ut eorum describuntur.
4. *A. adenota* Ham. Sm. Griff. An. Kingd. V, 828 et IV, 223 c. fig. anim.; p. 211 fig. cranii. — Ex Africa occident. Fulvo-badia, subtus, orbita labiisque albis; Antipedum vitta antica, fascia obliqua supra digitos posticos et scopae obscurae. Cauda brevis, tota longius nigropilosa. — Altitudo dorsi 26 poll. Cornua nigra, striata, $9\frac{1}{2}$ pollices longa, semiannullis 10; apice laevia et procurva. Rhinarium parvum nigrum. Sinus lacrymales adsunt. Tuberculum lumbi glandulosum, a quo pili corporis undique radiant.
5. *A. forfex* Ham. Sm. l. c. V, 827 et IV, 221. — Ex Africa occidentali. Mas fulvo-fuscescens, subtus et orbita alba; cauda brevis, flocco apicis nigro. Vitta antica pedum anticorum et macula digitorum obscurae. Scopae parvae obscurae. Fasciculus aurium externus, bipollicaris vel longior, dependens, albidus. — Altitudo dorsi 25 pollicum; statura sat obesa. Cornua pedalia, nigra, basi approximata, 12-annulata; dein divergenter flexa et arcuata, apicibus sub-opposite, forficis instar, convergentibus. Ungulae parvae, acutae. Rhinarium parvum. Sinus lacrymales elongatae. Frons lata; rostrum attenuatum. Auriculae magnae, subacuminatae. *Femina* paullo minor, auribus laevibus, mammis 2.

Obs. A. cl. Gray accepimus, haec duo animalia (nro 4 et 5) verisimiliter non esse specificè distincta, et praeterea, animal, ab ipso *Ant. annulipes* appellatum (Ann. Nat. Hist. X, 1842 p. 267) juvenem esse ejusdem. Cum vero affinitates hujus animalis, quod non vidimus, minime nobis evidentes sunt, credidimus melius hoc loco aliorum tantummodo descriptiones transcribi. Descriptio a Gray in l. c. data haec continet: pallide flavescens fusca, fascia digitorum, ventre et cet. albis; vitta pedum antica nigra. Cornua maris crassa, sublyrata, antice tuberculata; feminae nulla.

6. *A. zebra* Gray, Ann. Nat. Hist. 1836 p. 27; (paullo amplius, sine nom. specifico, descripta a Benettio in Z. Proc. 1832 p. 122. — Idem animal esse dicitur cui Ogilby nomen dedit *A. doriæ* Z. Proc. 1836 p. 121, absque omni caractere, sed citata p. 1, Z. Pr. 1833, ubi nil nisi *A. dama* et *A. mhorr* describitur). Minor, læte rufo-fulva, striis trunci transversis fere 12, latis, nigris, ad ventrem pallidiorem evanescentibus. Cutis unica, bipedalis, capite, pedibus caudaque destituta, e Sierra Leone allata, in l. c. describitur.
7. Subg. *Rhaphicerus* Ham. Sm. Griff. An. Kingd. V; — cornibus subulatis, lævibus erectis. Pecora minora, tantum craniis duobus, ex India allatis, Londini asservatis, cognita. Conf. Fischer Syn. p. 624, VIII et 633; Wagn. Suppl. p. 439, nota.
1. *A. acuticornis* Blainv., cornibus 3 pollicaribus, leviter extrorsum et antrorsum flexis etc. Diameter eorum baseos $\frac{3}{4}$ poll.
2. *A. subulata* Ham. Sm. Cornua pollices $4\frac{1}{2}$ longa, diametro baseos $\frac{3}{4}$ pollis; medio extrorsum, apice leviter introrsum flexa, etc.
8. *A. torticornis* Herm. Obs. Zool. p. 87, cornibus spirabilibus, subcompressis, subrugosis, subcarinatis, curvaturam secus, $26\frac{1}{2}$ pollices longis (Fischer Synops. p. 473. An *Orygis addacis*?). Tantum cornu cognitum.
9. *A. grandicornis* Herm. Obs. Z. p. 87; linea dorsali cingulisque 3 albis; mento barbato. Cornua, sec. curvaturam, 3 pedalia, ambitu baseos 15 pollicum, 8 libras gravia; apice recurva, compressa, dorso rotundato, carinata, rugosa. (Fischer Syn. p. 466. — An Capra?). Patria ignota.
- Obs. In Museo Lugdunensi, nomine *Ant. hamatæ* Temm., cranium, obiter a me visum, asservatur, animalis cujusdam bovini (vel forsàn e genere *Buſali*?), ex "Ashantee" Africæ occidentalis, mihi præterea ignoti. Insigne est cornibus subsimilibus Bovis tauri, sed apicibus extrorsum hamato-arcuatis.

Pauca tandem de pecoris quibusdam, vix nisi fictis dicendum est:

A. mazama H. Sm. Linn. Tr. XIII, 33 et Griff. V p. 865 n:o 58 (*Aplocerus maz.*). — Animal plane incertum,

quod auctor noster semel in Mexico obiter vidisse dicit, nunc vero e memoria, et præsertim ex icone Sebæ (Thesaur. I tab. 42 fig. 3), quam idem animal repræsentare putat, describit. Icon vero citata, male delineata, pejor videtur esse effigies *Capræ montanæ* (Aploceri lanigeræ Hm. Sm. ibd.). Nomen igitur ut synonymon *C. montanæ* habendum.

- A. temmamazama* Hm. Sm. in locis citatis adhuc pejore ratione fingitur; tantummodo enim nititur in nomine Springback (pro Germ. Springbock), in regione New Jersey Americæ, Cervo cuidam dato, quod vero Smith credit olim pro animali quodam caprino in usu fuisse. Hoc animal conjecturale repræsentatum credit in icone Sebæ I, tab. 42 fig. 4, quam Seba ad animal quoddam, verisimiliter cervinum, olim in Mexico frequens, applicavit. Icon vero, quæ forsân a peregrinatore quodam, e Mexico reduce, Sebæ data est, ni falleret singularis similitudo, repræsentat *Bubalin caamam* ex Africa. Seba non dicit se typum hujus iconis vidisse.
- Capra jubata* Schreber (Goldf.), V tab. 287, c.; *Ant. truteri* Fischer Synops. p. 478; *Ant. barbata* Ham. Sm. no 6; *Capra æthiopica* Schinz, Thierr. — Omnia hæc secundum unicum fontem: Takhaitze, in Danielis Afric. Scen. 1820. — Ex Africa merid.; sine dubio est *Hippotragus leucophæus*, addita barba menti et juba solito longiore (Conf. Wagn. Suppl. p. 482, notam).

Appendix 2.

Pecora Linnæi.

Hoc loco disquirere voluimus, quasnam Pecorum species revera descripsit LINNÆUS, ut eluceret quid significant nomina ab eo data et ut rite cognosceremus quantum hæc animalia iis temporibus cognita essent. Cum vero descriptiones LINNÆI in hoc animalium ordine rarius sufficiant, fontes plerumque, ex quibus hausit, et interdum specimina typica, hunc in finem inquirenda nobis fuerunt. Ubi vero species Linneanæ omnibus cognitæ

et indubitatae sunt, ibi nomina tantum asserimus. Nomina data sunt in Syst. Nat. Ed. X, in Ed. XII et in Museo Ad. Friderici, quos igitur libros principales sequimur.

Camelus dromedarius: Syst. Nat. X p. 65. Linnæus h. l. commemorat auctores: Rajum, Gessnerum et Aldrovandum *). — In Edit. XII, pag. 90, addit auct. Brissonium, Jonstonum et Alpinum; ubi vero nihil est dubii, ibi nullum est nobis hoc loco negotium. Conf. supra, pag. 290, de nominibus Cameli.

C. bactrianus: X, 65; — XII, 90.

C. glama: X, 65, auctores asseruntur: Rajus, cui fons est Matthioli epist. lib 5, ubi *Auch. lama* var. *huanaco*, ad ins. Javam allata, egregie describitur: rufescens, pilis brevibus, altit. dorsi 4-pedali etc. (Eadem descr. in opere Marcgravii transcripta invenitur). — Hernandez Mexic. 660, "*Ovis Peruana*." Hæc est *Lama* (rufescens, linea spinali nigra), sed, ut videtur, non descripta, nisi ex aliorum relationibus; animal enim minime ut incola Mexici, sed ut peregrinum proponitur. Descriptio a Linnæo, addita tota e Matthiolo desumpta videtur.

XII, 91 accedit: Brisson, 56, qui tantum ex iisdem fontibus hausit. — Igitur *C. glama* L. est. *Auch. Lama* var. rufescens, colore similis fero, huanaco. — Descriptioni hoc loco addit Linnæus verba, quæ multum

*) Hoc loco, et plerumque, Linnæus affert "Syst. Nat.," sc. editionem priorem, quæ sexta inscribitur, et adhuc priores. Cum vero eosdem fontes, ex quibus ibi hausit, semper iterum in Ed. X et XII commemorat, et nomina specifica non, descriptiones vero, rem ulterius illustrantes, raro ibi inveniuntur, hujus editionis mentionem non facimus, nisi ubi revera inter fontes numerari possit. — Repetenda est res cognita, editiones Linneanas et originarias tantum has existere:

Ed. I Lugduni 1735, fol.

Ed. II "Stockholmia" 1740, 1 vol. 8:vo.

Ed. VI do 1748, 1 vol. 8:vo.

Ed. X "Holmia" 1758, 2 vol. 8:vo.

Ed. XII do 1766, 2 Tomi in 3 vol. 8:vo.

erroris induxerunt: "Topho solo pectoris, secernente liquorem;" quæ tamen evidenter orta sunt e descriptione Matthioli (a Rajo allata), ubi de callo pectorali cornes, sordido dicitur: "globus ut in Camelo, vomicæ similis, e quo nescio quid excrementi sensim emanare videtur."

C. pucos X, 66. Raji Quadr. 147, ubi descriptionem Auch. domesticæ rufæ, longissime lanatæ (lamæ var. γ supra p. 292) invenimus, ex opere F. Gregorii de Bolivar desumptam.

XII, 91 accedit: Hern. Mex. 663 ("minor, debilis, lana uberrima;" domestica; ut videtur). — Marcgr. Bras. 244. Hoc loco icon monstrosa, ab alio quodam facta, pedibus anticis tetradactylis instructa, ut animal Chilense, lanigerum et onerarium, exhibetur et describitur. — Jonst. Quadr. t. 23: est figura nuper citata Marcgravii. — Brisson Quadr. 57, nullam cognitionem novam affert, sed nomine "la Vigogne," sine allato auctore utitur. Nomen igitur Linnæanum ad animal, quod Bolivar et Hernandez descripserunt, referendum.

Moschus moschiferus X, 66: Raj. Quadr. 127, qui affert descriptionem celimi Grew, et mentionem facit Aristotelis et Schroeckii Hist. Moschi, Wien 1682. — Gesner. — Aldrovandus. Omnes vero hi auctores, quantum eruere potuimus, præcipuas notitias habuerunt de Moscho Tibetano, obscure colorato: *M. saturato* Hodgs. (v. infra in addendis).

XII, 91. Varii auctores adduntur, inter quos S. G. Gmelin in Act. Petrop., de Moscho sibirico.

(*M. Grimmia* XII, vid. Capram Grinniam).

(*M. pygmæus* XII, vid. Capram pygmæam).

Cervus camelopardalis X, 66: Belon itin. 119. — Hasselquist (pellem descripsit). — Præterea Rajus, qui Belonium sequitur. Hoc animal tum temporis non nisi ex "Æthiopia et Sennaar" cognitum erat. — Obs. Linnæus semper affert Belonii edit. latinam, fol. 1605. In ed. originaria (Observations etc., scripta Parisiis 1553, impressa in 4to ibd 1588) Camelopardalis exponitur p. 263 et 4. Belon primus hoc animal cum Cervo comparasse videtur, cum caput cervi simile et cornua pilosa dicit; animal vivum Cahiræ viderat a:o circiter 1550. Nomen "Zurnapa"

inter Arabes usitatum affert; sed tamen Gessner, coævus ejus, et plures recentiores hoc nomen "*Serapha*" scribunt. Prof. Hedenborg, qui nobis tres pelles e Sennaaria, a. 1837—1839, misit, idem, *Zerafa* expressum, tradidit. Hinc nomen gallicum *la Giraffe* ortum est, quod jam apud Belonium invenimus. Cum antiquo illo: "*Seraphim*" radicem forsam communem habere, verisimile nobis videtur.

Cervus alces X, 66: Fn. Sv. et Veteres. — XII, 92.

C. elaphus X, 67: d:o d:o — XII, 93.

C. tarandus ibd. d:o d:o — ibd.

— Hoc animal prius a LINNEO, in Mus. Ad. Fr. p. 11, 1754, *Cervus Rangifer*, nomine RAJI, Synops. p. 88, dicitur. Sic nomen *Rangifer* rectius pro specifico adhibetur; quod eo melius fit, cum nomen: "*Tarandus*," vere latinum, a PLINIO (VIII cap. 34) usitatum, potissimum ut genericum adhibeatur, ut voluit OGILBY. Animal igitur hodie *Tarandus rangifer* appellandum censemus. — Præterea de etymologia observandum est, utrumque nomen sine dubio a nomine hujus animalis scandinavico, *Ren* (Rehn) oriri, quod plerumque Norvegi *Rensdyr* et Germani *Rennthier* appellant. Hinc corrupta illa nomina, quæ apud auctores mediæ ævi memorantur: *Rain* — *Rainger* vel *Rangier* (conf. Gesnerum) vel *Ranglier* (Gaston Phœbus), quæ, latinam induens formam, *Rangifer* scripserunt ALBERTUS et OL. MAGNUS. GESNERUS hoc nomen minus recte, ut nos credimus, ramiferum significare credit. — Incertum est unde petita sit syllaba *Ta*, in nomine Pliniano, *Ta-ran-do*, præfixa; sed radix *Rehn*, certe est idem ac germanicum *Reh*, (quasi *Rehenthier*, s. "*Rehenschier*" Fabricii apud Gesnerum), quo nomine primi coloni Germano-Scandinavici animal cervinum, jam ante ipsorum adventum, apud Lappones cicur, appellaverunt; neque a lingua lapponica vel fennica oritur.

Cervus dama X, 67: Fn. Sv. et Vet. — XII, 93.

Tantum mansuetos novit, nec umquam nisi cicures apud nos inventi sunt.

Cervus bezoarticus X, 67, secundum Mazama, Hernand. 324 (qui *C. mexicanum* vel *virginianum* rec. exhibet); — Cuguacu-eté (lapsu calami "*Cuguacu &c.*") Marcgr. Bras. p. 235 (*C. campestris* ♀. Altera sp. ibi,

sp. ibi, nomine Cug. apara, descripta, est ejusdem ♂); — Piso Bras. 98, (ubi figura, "Cug. etc" signata, C. campestrum rec. repræsentat, cornibus et auribus agnoscendum). — Raji Quadr. 90, (descr. Marcgravio nixa, addita mentione "Capreoli marini" Jonst. 33, quæ tamen icon imitatio est figuræ "Capreoli maris" Gesneri, p. 296. — Diagnosis a Linnæo data, evidenter e Mgr. et Pisone desumpta, ad C. campestrum spectat.

In Edit. XIIma Linnæus hanc sp. suppressit, synonyma vero C. capreolo adnumerat. Nec male credimus hoc nomen omnino omittendum esse; supra (I p. 183) nomine recentiore *Cervi campestris* usi sumus.

Cervus capreolus X, 68: Fn. Sv. et Vet. — XII, 94. Synonyma quædam, quæ nuper recensuimus, falsa.

Cervus guineensis X, 68 — et XII, 94; tantummodo secundum Mus. Ad. Fr. (1754) I p. 12, ubi hæc legimus: "e Guinea;" "grisescens subtus nigricans." "Magnitudo Cati; stria inter aures et macula supra oculos atræ; jugulum utrinque longitudinaliter atrum; sternum in medio atrum; latera abdominis usque ad poplites nigra; ab ano ad genua usque postica linea nigricans; Genua anteriora etiam antice nigra et linea angusta nigra ad pedes ducta. Aures longiusculæ. Cauda subtus nigra." "Tibiæ duplo crassiores quam sequentis." (Capræ perpusillæ; v. Moschum pygmæum). "Cornua desunt." — Nulla hujus animalis mentio, ab alio quodam auctore facta, commemoratur. In S. N. X et XII Linnæus breviter tantum refert ad Mus. Ad. Fr.; nihil igitur novi addendum habet, nec iterum examinasse videtur. Hodie vero in Collectione Zoologica Regis ADOLPHI FRIDERICI, quam, ut videtur, integram habemus, ejusmodi animal non invenitur. Omnia vero perpendenti, mihi fere certum apparet, C. guineensem errore quodam ortum esse. Initio enim hoc nomine descriptum videtur specimen majus Nanotrugi in Museo Regis, infra, ad Capram pygmæam memorandum. Hinc forsitan verba "pedes duplo crassiores," si tum temporis Capram perpusillam diceret alterum specimen, juvenile. Deinde vero, sub redactione libri de Museo Regis, permutatione vel confusione facta, notæ aliæ huic additæ videntur, quas Linnæus alibi, forsitan a figura Sebæ (I tab. 45 fig. 1) desumeret,

(c. gr. "cauda subtus nigra" et cet.) additis fortasse iis, quæ in memoria retineret, viso Moscho javanico, jugulo obscure colorato? Nisi hoc fere modo explicanda sit res, *C. guineensis* ut animal, hodie ignotum, e Museo Regis amissum, haberetur.

Capra hircus X, 68; — XII, 94. Domestica. var. β "angolensis Hasselqv." in ed. X; — in ed. XII rectius "Angorensis" dicitur.

Capra ibex X, 68: (Syst. Nat. VI p. 14 n:o 6) sec. Raji Syn. 77 (lapsu "79") ubi Ibex Helvetiæ commemoratus, e Plinio et ex iis, quæ in Helvetia audiverat Rajus. Ipse cornua tantum viderat. Ibices tum in Vallesia et Salzbürgico inveniri dicuntur. Mares barbaram prolixam, nigricantem gerere dicit, incertum vero, utrum hoc in Helvetia audivisset, an secundum Belonium retulerit. (Conf. nostram descr. supra, p. 278 var. β). — Olearii Mus. (Gottorff. Kunstk. 1674) t. 10 fig. 1: ostendit caput male delineatum ibicis, "so sich in dem Schweitzer-Gebirge befindet." "Diese hörner seynd anderthalb ellen lang." Barbaram ostendit. — Wagneri H. N. Helvetiæ, 156, etiam ibicem Helvetiæ proponit. Hinc *C. ibex* Linnæi nulla alia nisi Helvetica esse potest, sed barbata, si duæ varietates ibi invenirentur.

In S. N. XII, 95 adduntur: Gessner Quadr. ("331 t. 1099"). Hic de Ibice omnia cognita colligit, etiam de Cretensi etc. Quinimo, iconem habet *C. pyrenaicæ* (Hist. Anim. Francos. 1603, pag. 304), cornibus apice inflexis (eadem Jonston Tab. 26, signata *C. hispanica*). Commonet, Strabonem verba Polybii afferre, quibus docet alpes belluam habere caprinam, barbaram maximam gerentem etc. *). — "Belon obs. 20": (in ed. Gallica, 4:o Cap. 23 p. 31, 32) tantum de ibice cretensi loquitur, cujus descriptio vix a Capra beden differt, sed cornua in icone multo sunt minus curvata. — Aldrovandi de bisulcis, p. 731—3 et — Johnston t. 28 vix novi quoddam ad opus Gesneri addunt.

*) GESNER memorat, feminam ibicis in Helvetia "*Ybschen* vel *Ybschgeiss*" vocari; quo in nomine *Ibex* latinum agnoscitur. Nomen Gallicum hodiernum: *Bouquetin*, a BELONIO Bouc-e-stain scribitur; quo facillime intelligitur, hoc a radice germanico *Steinbock* oriri.

Capra mambrica X, 70; XII, 95. Diagnosis et Auctores allati indicant varietatem Capræ domesticæ, monstrosam, in Oriente vulgarem, auriculis pendulis et maxilla superiore abbreviata agnoscendam.

Capra rupicapra X, 68 et XII, 95. Loca citata præsertim tractant var. ex alpibus Helvetiæ; Belon de rupicapra e Græcia, (non vero e Creta) loquitur.

Capra depressa X, 69, et XII, 95: descriptio brevis, originaria, varietatis Capræ domesticæ. Conf. ed. 2dam, ubi primum exponitur.

Capra reversa X, 69 et XII, 95: etiam var. domestica videtur. Hæc, ut prior, in S. N. Ed. 2 iisdem fere verbis describitur.

Capra pygmæa X, 69 et Moschus pygm. XII, 92. — Venio nunc ad animal, inter Pecora minimum, sed erroribus historiæ litterariæ omnia antecellens; quod fata jussisse videntur, ut nemo fere nisi peccando tangeret. Haud aliter sese habet historia s. d. Trochili minimi, quem nemo vidit, pluriumque minimorum, testantium propensionem hominum ad fabulosa, quæ ipsum Linnæum, ut sagacitatem solitam amiserit, induxit. Hodie quidem dubia sunt ex magna parte soluta, sed ut plane perspecta sint historiam hujus animalculi litterariam ex imo fonte incipio.

Seba in Thesauro, Vol. 1, icones quasdam dat, quæ hodie, magnitudine, colore, forma partium et præsertim defectu ungularum spuriarum ut imagines *Nanotragi* nostri (I, p. 191) sat bonæ agnoscuntur; sc. *Tab. 43 fig. 1*: magnitudine cati minoris; verisimiliter ♀ junior, ob defectum cornuum et scopam caudæ minus evidentem;

Ibd. fig. 2, juvenis minor, forte etiam ♀; et

Ibd. fig. 3 pullulus 6-pollicaris. His adduntur:

Ibd. fig. A et B, pedes ejusdem generis;

— *fig. C et D*, cornua diversi generis; quorum C, in descr. *fig. 3tiæ*, alienum dicitur, alterum vero, certe alienum, nullibi commemoratum invenio. Postremo:

Tab. 45 fig. 1, feminam adultam exhibere videtur.

Linnæus forsitan hæc animalia apud Sebam Amstelodami viderat, sed mentionem non facit nisi minimi, *tab. 43 fig. 3*; cui iconi nititur "Capra, pedibus digito humano angustioribus" in S. N. II p. 42 et VI p. 14 n:o 4. Reliquas plane ignorare videtur; sed:

In Mus. Ad. Fr. (1754) p. 12 duo nomina proponuntur: *Cervus guineensis*, de quo supra, pag. 301, egimus (ubi suspicionem proposuimus, tabulam Sebæ 45 fig. 1, inscio auctore, adhibitam esse), — et *Capra perpusilla* "ex India," ubi iterum iconem Sebanam, 43, 3, solam, cum diagnosi citata, ex Syst. Nat. II et VI, affert; additque hanc descriptionem: "Pedes vix calami scriptorii crassitie. Corpus griseum, magnitudine Felis, collo subcinereo. Subtus alba est cauda et gula, abdomen, sternum et femora interiora. Aures ovatae nudiusculæ. Frons macula longitudinali fusca."

Quid hoc sit ab ipsa descriptione minus certe prodit. Sed, inter animalia Musei Ad. Friderici, e collectione Drottningholmiensi, adhuc in Museo nostro adsunt specimina quædam, rem illustrantia *) sc.

1. *Nanotragus spiniger* (Tem.) nob., ♂ junior, magnitudine et forma ita similis figuræ Sebanæ 43, 1, ut typum ejusdem crederem, nisi cauda differret, scopâ albâ, e pilis elongatis, qs. pectinatâ, instructa, quæ in femina minus evidens apparet. Cornua minima, vix 5 millim. longa, a pilis omnino occulta adsunt, quæ Linnæus non vidit.

2. *Ejusdem speciei* pullus feminens, rudimento funiculi umbilicalis siccati adhuc adhærente. Hic vix major est, quam icon Sebæ 43, 2, eique simillimus.

3. *Traguli javanici* foetus vel pullulus neonatus, cum parte funiculi umbilicalis relicto; magnitudine et formâ similis iconi Sebanæ 43, fig. 3, sed colore juguli differens. Minus tamen certum est, hunc quoque e coll. Drottningholmiensi oriri.

*) Hæc animalcula, in spiritu vini asservata, recentiore tempore signata sunt "Moschus pygmæus, Java," et simul cum speciminibus veri *M. javanici* seposita sunt. Vetustate sat decoloria sunt et, ob angustias vitri, cemento bene clausi, non agnoscenda erant; quare ea, ante impressionem partis prioris hujus tractatus, minus observavi, credens minimum, quod verus est *M. javanicus*, solum esse typum Capræ perpusillæ et Moschi pygmæi Linnæi. Non dubitans, reliqua quoque esse specimina *M. javanici*, credidi alterum eorum, cui signum solitum coll. Drottningholmiensis adhæsit, esse typum Cervi guineensis Linnæi.

His inventis sole clarius est, *Capram perpusillam* (Linn. Mus. Ad. Fr.), esse alterum eorum. Initio forsā, ut supra diximus, specimen majus, ut typum Cervi guineensis cogitasse videtur Linnæus. *Capram perpusillam* tum forsā medium vocavit, vel minimum, si hoc revera ex iis temporibus derivatur. Deinde vero, confusione quadam facta, certissime descriptio speciminis maximi adhibita est sub *Capra perpusilla* Mus. Ad. Fr. p. 12; quod verba "magnitudine Felis" et "aures nudiusculæ," bene cum hoc, non vero cum reliquis convenientia, satis testantur. Sic demonstratum habemus *Capram perpusillam* esse animal, supra, a nobis, *Nanotragus spiniger* Temm. appellatum.

In S. N. X p. 69, 1758, quarto post Mus. Ad. Fr. anno, impressum, invenimus *Capram pygmæam*, ad quam eandem figuram Sebanam (43, 3) cum diagnosi e Syst. N. VI, pro synonymia affert; sed omnino de Mus. Ad. Fr. tacet. Affert vero, ut principalem, rem quandam, omnino novam: diagnosin, cornu describentem, quod hujus esse credidit. Nullibi unde venerit vel ubi asservatur vel descriptum sit, memoriæ prodidit. Icones cornuum in tabula Sebæ, nuper commemoratas, non affert, neque omnino cum his convenit cornu descriptum, quod evidenter fuit Antilopæ pygmææ Licht. Darstell. t. 16 (vid. in parte priore p. 190; Ant. cærulea H. Sm). Quod igitur animal, inde a Linnæo cognomen *pygmææ* ferre dici potest. Pallasii vero Antilopæ pygmææ minime huc spectat, de qua infra dicemus.

Postremo, in S. N. XII p. 92, *Moschus pygmæus* dicitur animal, prius, in Ed. VI, secundum Sebam, 43, 3, memoratum, cum eadem diagnosi allata. A Brissonio attentus factus, cornu, in Ed. X descriptum, non esse hujus, agnoverat. Mirandum sane, quod etiam hoc loco de Mus. Ad. Fr. omnino silet, quasi paullum de indole genuina Capræ perpusillæ dubitaret. Sed ut fontes affert icones Sebanas tab. 43, fig. 1, 2 et 3, quarum duas priores hucusque ignorare videbatur. Nullum igitur est dubium, quin *Moschus pygmæus* L. sit *Nanotragus spiniger* noster.

His expositis munere, in eo quod ad animal Linnæanum spectat, perfuncti sumus; sed paullo longius progredi liceat.

Brisson, in *Regne Animal*, 4^{to} Parisiis 1756, p. 95, genus *Traguli* condidit*), cujus characterem principalem e defectu cornuum petivit; in quo hæc animalia enumerat:

1. "*Tr. indicus*;" evidenter Javanicus (vel sp. affinis): dentes enim adesse dicit "caninos 2, utrinque unum;" colorem juguli neglexit, cum verisimiliter caput tantum habuit; colorem vero ex Seba "tab. 43 fig. 1, 2 et 3" (*Nanotrago*) transscripsit. Patriam edit: Indiam et Africam.
2. "*Tr. guineensis*" sec. Seba t. 45, f. 1. Vid. supra.
3. "*Tr. Surinamensis*," sec. Seba t. 44, f. 2; quæ est *Tr. meminna* rec., c. falsa edita patria.
4. "*Tr. Africanus*" sec. Rajum, *Capra Grimmii*, = *Sylvicapra mergens* rec.
5. "*Moschus*" = *M. moschiferus* L. S. N. X.

In his n^o 5 est animal alienum, jam a Linnæo nominatum; n^o 4 est alienum ob cornua, tum temporis ignota; n^o 2 paullum dubium existit, sed verisimiliter est *Nanotragus*, alienus ut cornutus. Igitur restant n^o 1 et 3: genuini *Traguli*. Horum vero prior specie incertus et cum descr. *Nanotrangi* adulteratus. Ergo n^o 3, *Meminna* est typus generis *Traguli*.

Buffon in *Hist. Nat.* (4^{to} Paris 1764) vol. XII, p. 310, hæc animalia nominibus Brissonianis (*Chevrotain* et *Tragulus*), describit, sed *Moschum* ab hoc genere segregat. Brissonium, hoc loco, ut plerumque, negligit, etsi multa ex opere ejus acceperit. Species tres proponit:

1. *Sp.* Brissonianas 1 et 2 in unam conjungit, quam vero, æque ac Brisson, a capite *Traguli*, dentibus longis caninis armato (tab. 43 fig. 1) cum iconibus Sebæ (*Nanotrangi*) componit; ecornem dicit, Indiamque et Africam inhabitare refert. Serius (p. 375) dicit specimina duo integra ex India ("des Indes") adesse, quorum alterum ex insula Mergui [juxta Malaccam]. Hoc igitur erat sp. *Traguli napu* vel alius, javanico affi-

*) Nomen *Traguli* prius a Kleinio adhibitum est; is vero auctor non magis quam Rajus, vel Gessnerus ideam generum, neque nominum genericorum acceperat, quare, in quæstione de nominibus Systematicis, negligendus est.

nis; Sed in tab. 42 iconem dat puiluli hujus "Chevrotain des Indes" (primi in p. 375 descripti), in qua pullum masculinum *Nanotragi* ex Guinea agnoscimus. Structura caudæ propria, color et defectus ung. spuriarum, bona sunt indicia. Confusio perfectior esse nequit.

2. *Meminam*, sec. Knoxii Rel. de Ceylan, ut incolam hujus insulæ, nec Americæ, agnoscit.

3. *am sp.*, cornutam, ex Africa addit. Pedes enim quosdam (tab. 43 fig. 3—6) simul cum cornu parvulo (ibid. fig. 2) in una pyxide simul positos (p. 377), sed patriæ ignotæ, in Museo Parisiensi invenerat. Has partes credit esse illius animalis, nani inter pecora, quod Bosman, Desmarchais et Adanson, e Guinea et Senegallia, nomine Guevei et Guevei-Kajor, commemorant. Incertum est quænam sit hoc Guévei, inter plures parvas Pecorum, ibi habitantium, species; cornu vero et pedes, inter nobis cognitæ, non possunt esse nisi *Nanotragi*. Minime sunt *Sylvicapræ* vel *Neotragi* speciei cognitæ. Sic tertius *Tragulus* Buffonianus, verisimiliter est idem ac pars primi: *Nanotragus* noster.

4. *tam* *Traguli* speciem in Supplemento addit, e Java, quam distinctam credit, quæ vero non multum ab altera parte primæ (Tr. javanico) differre videtur.

Hæc omnia, tum temporis commissa, haud admiranda sunt, sed grati, meritorum Buffonii memores, facta, qualia sint, exponimus. — Postremo addemus, 4tam speciem Brissonianam *Traguli*, a Buffonio ab hoc genere alienam jure haberi. Cranium affert, p. 329, tab. 41, f. 2, 3, nomine "la Grimme," quod vero est alius speciei, quam Brissonianæ, sc. *Sylvicapræ grimmie* Pall. Miscell. et Spicil. I, e Senegal (*Sylvic. grimmia* nob. Vet. Ac. H. 1834 p. 190).

Pallas non multa de *Tragulis* dicit, sed variis locis, secundum Buffonium, nomen illis conservat, sc. Spicil. XII, 18 in nota, ubi "*Tragulum* e Java" describit; XIII p. 28 pluries, ubi nomine Tr. javensis utitur. Generi autem *Traguli* necessarius existimat defectus cornuum. Buffonii igitur Sp. 3tiam, "Guevei Kajor," utens exemplo Pennantii, a *Tragulis* distinguit et inter s. d. *Antilopas*, nomine *Ant. pygmæ*, inserit (Spicil. XII, p. 18 nro 20). Hoc loco auctores Bosman, dubie, et Adanson ex opere Buffonii affert; animal vero determinat, vel offerendo iconem

cornus parvuli in tabula Buffonii 43 fig. 2, vel iconem Sebæ t. 43 f. 3. Utramque vero iconem exhibere *Nanotragum*, supra diximus. Hujus igitur synonymon est *Antilope pygmæa* Pall., quæ longe a *Capra pygmæa* Linnæi et *Ant. pygmæa* recentiorum differt. (Ipsi, in parte priore, pag. 190, erravimus in scribendo: "*Sylvicapra pygmæa* Pall."; ibi igitur, pro nomine *Pallasii*, legas *Linnæi*).

Pennant prius, jam in Synopsi Mamm. 1761, p. 28, idem animal, sec. eosdem fontes definitum, nomine "*Royal Antelope*" proposuerat; ex quo *Erxleben* nomen *Ant. regia*, Syst. p. 278, fabricavit, historiam vero et synonyma ejus cum *Moscho pygmæo*, p. 322, ut antecessores commiscuit, non sine causa querens de difficultate hæc nomina extricandi. Eandem confusionem apud auctores reliquos recentiores invenimus. Sic *Schreber* (V, 956) *Tragulos* veros nob. nomine *Moschi pygmæi* L. distinguit, sed ungulas spurias nullas dicit, et *Tr. javanicum* separatim, sec. *Gmelinum*, p. 962, sed nomine *M. indici*, describit, e. s. p. — *Cuvier* 1817 *Tragulos* bene exponit in genere *Moschi*, sed tantum nomina specierum sec. *Buffonium* exhibet.

Temminck tandem dubia de animalculo nostro levavit, in opere egregio: *Monographies de Mammalogie* I, (1827) pag. xxx, in synopsi generum *Mammalium*, hæc verba inserendo: "*Il faut rayer du genre Moschus l'animal inscrit dans les systemes, M. pygmæus; toutes les indications reposent sur des jeunes d'une espèce de très petite Antilope, mon A. spinigera, des côtes de Guinée et de Loango. Cette esp. est moins grande d'un tiers que l'Ant. pygmæa.*" (In opere citato non plura de hoc animali inveniuntur). Hanc indicationem excipiens, *Fischer* in *Syn. Mamm.* 1829 p. 469, synonymiam meliorem exposuit, ut etiam *A. Wagner* in *Suppl. ad Schr.* IV, 457. Sed uterque *Ant. pygmæam* (Linn.) *Licht.* nomine "*Ant. pygmæa Pallasii*" vocant.

Hæc omnia dicta, breviter, ita exponi possunt:

1:o *Nanotragus spiniger* (Tem.) (vel, si mavis, *perpusillus* L.).

Seba *Thes.* I, tab. 43 fig. 1—3 et A, B.

— — — tab. 45 fig. 1 (hinc *Tragulus* n:o 2 *Briss.*).

Linn. S. N. II—VI: *Capra* pedibus digito humano angustioribus (sec. fig. Sebæ).

- Cervus guineensis* L. Mus. Ad. Fr. p. 12, et S. N. X et XII (forsan sec. Sebæ tab. 45, 1?).
- Capra perpusilla* L. Mus. Ad. Fr. (Sec. specimina adhuc asservata).
- Moschus pygmæus* L. S. N. XII, 92.
- Antilope regia* Erxl. (Royal Ant. Penn. Synops.) et *Antilope pygmæa* Pall. Spicil XII p. 18: Ambo hæc nomina secundum: Buffonii Chevro. d'Afrique, Guevei, p. 310 et seqq.; tab. 43 f. 2, cornu; f. 3—6 pedes.
- Ant. spinigera* Temm. Monogr. I p. xxx. — Fischer Syn. p. 469. — A. Wagner Suppl. 457.
- Obs.* *Moschus pygmæus* Erxl. Gmel. et rec. e *Nanotrago* et *Tragulibus* confusis, ex his fontibus derivatur: *Tragulus* n:o 1, indicus, Brisson R. A. 95 (Caput *Traguli*, corpus et historia mixta).
- Chevrotaïn des Indes*, Buffon, H. N. XII p. 310. Tab. 42 (Schreb. 244, fig. inf.) *Nanotragus* juv. = pag. 375 descr. prima. — Sed tab. 43 fig. 1 (Schreb. 244, sup.), caput *Traguli*, javanico affinis, = p. 375, descr. 2da et 3tia.
- 2:o *Tragulus javanicus*. Gmelin S. N. (sec. Chevr. de Java Buff. Suppl. — Pall. Spic. XII). — *Tr. indicus* Gm. Schreb. (nec Brissonii).
- Observas nuper exposita de historia hujus et sp. affinium cum *Nanotrago* commixtarum.
- 3:o *Sylvicapra pygmæa* (pars prior, p. 190).
- Capra pygmæa* Linn. S. N. X, cornu, nec *Synonyma*. *Ant. monticola* Thunb. Vet. Ac. H. 1811.
- Ant. pygmæa* Lichtenst. Darstell. t. 16 (non vero Pall).
- Ant. cærulea* et *A. perpusilla* Ham. Sm. Griffiths An. Kingd. (et Fischer Syn. p. 637).
- 4:o *Sylvicapra Grimmia* (pars prior ibd).
- La Grimme* Buff. XII p. 329, tab. 41, f. 2, 3, cranium (Schreb. tab. 258 B, 2, 3).
- Antilope* *Grimmia* Pallas Misc. et Spic. 1; (non vero *Capra grimmia* Linnæi, quæ est *S. mergens* rec.).

Capra gazella S. N. X, p. 69, n:o 7, "cornibus rectissimis," secundum solum Rajum: Quadr. 79, "Gazella indica;" ubi, falso cum patriæ indicio, *Oryx capensis* (Ant. *Oryx* Pall.) describitur. Rajus vero pro synonymo affert *Ephemerides Germ. A:o VIII (1677)*

p. 1, ubi Dr Joannis Danielis major, nomine Capri bezoardici, describit et delineat cornu curvatum Orygis leucorygis Licht.

S. N. XII, 69, accedunt: Brisson, R. A. 67, qui eundem O. capensem, eodem modo, quasi ex India ortum describit, ut tum plerumque in Capensibus describendis factum est, quia cum navibus, ex India reducibus, afferrentur. Brisson vero addit: Elan, Kolbe Capens. Tom. 3, p. 32, 34 ubi Damalis oreas, — et Prosp. Alpini Ægypt. 232 t. 14, fig. 1, ubi cornu leucorygis (Licht.) describitur. — Igitur *Capra gazella* L. est Oryx Africae meridionalis, cum immixtis paucis de sp. septentrionali etc. Nomen tamen specificum *gazella*, A. dorcadii proprium et ab Oryge alienum, non accipiendum censuimus. Idem Animal est *Ant. oryx* Pall. et *Ant. recticornis* Erxl.

Capra cervicapra S. N. X, 69. n:o 8. Fons principalis est: "Gazella africana" Raj. Syn. 79, n:o 4, ubi Antilope dorcas male describi videtur, cornibus lyratis et cet. (Hic locus affertur in S. N. VI, 14 n:o 7 et edit. prioribus). Huic animali Rajus addit nomen Plinianum Strepsiceros, "quem Addacem Africa appellat;" idemque, nomine Anglico, "*the Antilope*" appellat. — Linnæus præterea, hoc loco ut in Ed. VI:ta, affert nomen: *Capricervæ*, Kæmpferi, Amoen. p. 398, tab. in p. 407, fig. 1. Observes tamen, errorem commississe Kæmpferum, numeros 1 et 2, in iconibus paginæ 407, transponendo. Describit enim p. 398 animal *Pasèn*, in montibus Persiæ vivens, genetricem Bezoaris optimi orientalis, et citat iconem in pag. "407 n:o 1;" sed falso, nam n:o 2 inscripta est *Pasèn* et cum descriptione convenit. Hæc est *Capra* quædam, sine dubio *ægagrus* Pall. (Conf. supra p. 282, et in sp. seqv). Dein vero, p. 403, in fine, memorat Animal *Ahù*, bezoar minoris pretii fovens. Indicat figuram l. c. 2, pro 1, quæ, *Ahu* inscripta, *Antilopem subgutturosam* præbet; quam iconem Linnæus h. l. spectat.

Hi fontes, nec plures, a Linnæo afferuntur; sed tamen patria allata, "India", et diagnosis: "cornibus teretibus, dimidiato-annulatis, contortis" (cui in ed. XII accedit verbum "flexuosus") aliud quoddam animal indicant, sc. illud, quod Buffon dein l'Antilope dicit. Hac etiam diagnosi ductus Pallas eidem "Antilope" nomen dedit *Ant. cervicaprae*. (Cf. Spic. I, p.

18 et 21). Nulla res præbet hoc animal, (nisi forsarn cornu?) Linnæo ipsi cognitum fuisse; adest igitur sine dubio alius quidam fons cognitionis ejusdem. Hic vero certe esse videtur icon optima "Capræ vel Hirci bezoartici" Aldrovandi, Bisule. 756 (descr. p. 755 cum nomine *Cervicapræ* in margine), quæ, h. l. omissa, deinde in S. N. XII, forsarn ob nomen, ad Capram bezoarticam a Linnæo affertur, ubi vero omnino aliena apparet. — Non igitur dubito Linnæum, in S. N. X p. 69, nro 8, ex opere Aldrovandi, *Ant. cervicapram* Pall. descripsisse. Sed pro Synonymis, S. N. VI attulit, ubi, sec. Rajum et Kæmpferum, Antilope dorcas vel. sp. quædam affinis describitur.

In S. N. XII p. 96 nro 8, synonymia præbet mixturam, duce Brissonio compositam: Houttuyn 3. 197; t. 24, f. 1: icon ad *Ant. pygargam* Pall. referenda; descriptio aliena. — Brisson 68, nro 8; "Gazzella;" affert omnia synonyma Linnæi, præter Houttuynii, et præterea ambas *Strepsicerotes* Gessneri. — "Dodart Act. 3, p. 1, p. 95, t. 11." [h. e. Mem. de l'Ac. des Sciences 1666—9, Tom. 3, partie 1, pag. 93. pl. 11; Perrault auctor dicitur]. Ibi icon bene agnoscenda *Ant. cervicapræ* Pallasii exhibetur, "c. pilis longis circum cornua." — *Strepsicerotus*, "Gessner Quadr. 323:" citatio sec. Brisson facta; Gessner enim describit *Strepsicerotes* duos: alterum, Bellonii, e Creta, varietatem *Ovis domesticæ*, (Edit. latina Francof. 1603) pag. 294, lapsu typogr. signata "308" (a Linnæo allatus sub *Ove strepsicerote*); alterum, ibid p. 295 (lapsu "309") cum figura capitis, a Jo: Cajo accepta, quæ caput cornutum *Ant. addacis* Licht. non male ostendit. Hæc icon a Linnæo h. l. indicatur. — Aldrovandi Bisule. p. 740, ubi idem caput *addacis*, minus bene imitatum, apposito collo exhibetur. — Jonston t. 24 (idem caput addito toto corpore ficto?). — Hoc igitur loco omnia conferuntur. Sed cornua Antilopes *cervicapræ* Pall. revera sunt turrato-spiralia et annulis uno latere interruptis cincta, neque aliud animal tum cognitum erat, quod ejusmodi haberet cornua; quamobrem minus est admirandum cornua *addacis*, secundum icones minus bonas, fere similiter formata, hoc loco allata esse.

Capra bezoartica XII, 96 nro 9. Hoc nomen, a Linnæo non prius memoratum, addito brevi descriptione, plures complectitur difficultates. Hos auctores

affert: Brisson Quadr. 69 n:o 10; qui locus evidenti errore hoc loco allatus; Brisson enim ibi, nomine Gazellæ Africanæ, Ant. dorcadem Linnæi, ed. X, describit et eosdem fontes affert, addito Hern. Mex. 893, quem etiam Linnæus in ed. XII dorcadi jure adscribit. — Aldr. Bisulc. 756. Nuper ostendimus, figuram h. l. propositam verisimiliter esse ipsum typum *Capræ cervicapræ* Linnæi S. N. X. — "Raji Quadr. 80:" hæc citatio non spectare potest nisi verba quædam Bontii de Capra bezoartica, ibi, sub Gazella indica, allata: "Capræ istæ non valde dissimiles sunt europæis.." etc. Reliqua enim, in hac pagina conscripta, alibi a Linnæo afferuntur. — Postremo Linnæus affert *Capri-Cervam*, Kæmpf. Amoen. 398 t. 407, f. 2 (Pasèn inscripta, de qua sub Capra cervicapra locuti sumus). Hæc, *Capram ægagrum* Pall. exhibens, typus videtur *Capræ bezoarticæ* Linnæi; quod certius apparet, quum, evidenter secundum Kæmpferum, dicit: "Habitat in Persia. Profert sæpe in ventriculo abomaso Bezoar orientale." Sed descr. cornuum, in diagnosi, evidenter verbum "teretibus" a Gazella Brissonii accepit. — Concludimus ex his, C. bezoarticam Linnæi proprie respicere *C. ægagrum* Pall., ex opere Kæmpferi LINNÆO cognitam, sed ita cum alienis confusam, ut nomen hodie omnino rejiciendum sit.

Capra dorcæ. X, 69 n:o 9: affert Syst. Nat. VI p. 14 n:o 9, ubi, sec. "Gazellam Africanam" Raji. Quadr. p. 80 n:o 6, etiam h. l. allatam, *Antilope dorcæ* rec. describitur. Incertum vero quænam sit varietas ex iis, quas supra, p. 267—8, exposuimus.

XII, 96 adduntur: "Algazel ex Africa." Hern. Mex. 893, quod omni jure fit; nam in Lyncei Annotationibus ad Hernandesium, p. 893, adest icon "Algazel ex Aphrica" inscripta, quæ bene dorcadem repræsentat; Linnæus vero nullo jure addit patriam "Mexico;" Lynceus enim, etsi in libro de Mexico, animal "ex Aphrica" ortum dicit. — Affertur quoque e male compilato opere Houttuynii, vol. 3 p. 213, t. 24, f. 3, quæ est repetitio iconis Sebæ, I t. 42 f. 4, Temmamazamæ, e Mexico dictæ, sed nimis similis Bulalidi caamæ.

Capra tatarica — XII, 97 sec. Act. Petrop. (Nov. Comm.) 5, 345 et 7 p. 39, t. 19, ubi a S. G. Gmelinio

linio *Antilope Saïga* Pallasii primum describitur, minus apte "ibex imberbis" vocata. Nihil hoc loco dubii existit, quare nomen, secundum Linnæum, *Antilope tatarica* accipiendum censuimus. (V. supra p. 270). Sed fatendum est, descriptionem Gmelinianam priorem (Vol. 5) male rem illustrare. E. gr. dentes maxillæ superiori primores tribuit.

Capra grimmia X, 70, tantummodo sec. Raji Quadr. 80 n:o 7, ubi "Capra sylvestris Africana Grimmii" ex Ephemer. Germanicis Anni 14, Obs. 57, describitur. Hoc vero animal est *Sylvicapra mergens* ♀, varietas Caffra (Ant. Burchellii H. Sm.) colore grisescens, ex Afr. meridionali a Doctore Grimm allata. — In S. N. XII, 92, præeunte Brissonio, Linnæus eandem vocat *Moschum Grimmiam*, cum "cornua nulla nota" essent; sed nihil novi addit. — Nomen Grimmii, ut supra (p. 309) apparet, deinde a Buffonio et Pallasio alii *Sylvicaprae*, huic affini, e Senegalia, datum est.

Capra ammon X, 70, cum citatione Tragelaphi et Musimonis Gesneri. Quorum prior est *Ovis feræ* species, in Græcia (incerto loco, non vero in Creta) a Belonio visa et delineata (Conf. Belon Observations, 4:o 1588, p. 121, 122). Hæc, secundum Belonii figuram et descriptionem, est *O. musimon*, sed varietas colore grisescente, paullo pallidior quam vulgaris, e Corsica; cornua forsân majore curvatura arcuata; pili, præsertim dorsi et pectoris, longiores; pedes albi. Incertum an sit illius varietatis, quam hodie *O. orientalem*, an illius quam *O. cypriam* et *ophionem* appellant, cujusque specimen, e Cypro, Berolini asservatur. — Musmon Gesneri: est *Ovis musimon* rec. "ex Hispania et Corsica." — Diagnôsis Linnæana h. l. e descr. Belonii desumpta est. Præterea Linnæus addit: "Habitat in Sibiria. Gmelin"; quæ verba 3:am *Ovis* speciem, vere distinctam, h. l. involvunt, de qua mox infra.

In S. N. XII p. 97 insuper citat auctores: Gmel. it. 368 et Act. Petrop. 1758, v. 4, p. 388, t. 8, f. 2, 3, ubi S. G. Gmelin Ovem describit, deinde a Pallasio (Spicil. XI p. 1). *Argali* dictam (v. supra p. 274). — Postremo addit descriptionem brevem, maxima parte e Brissonio p. 71, et ibi, sub "Capra orientali", e Belonio, p. 121, nuper cit., excerpta; sed vocabula: "albida sunt cornua" e Gmelinio orta videntur. Nomen

Ammon, apud Linnæum plures Oves feras complectens, pessime deinde a Pallasio pro *Capra caucasica* adhibitum est. Potissimum igitur hodie rejicitur.

Ovis aries X, 70; — XII, 97; tantum domestica.

Ovis guineensis X, 71 et — XII, 98: tantummodo secundum Marcgr. Brasil. VI, cap. 10, et Rajum, Quadr. 75, qui Maregravii verba affert. — Var. domestica ex Africa; conf. supra pag. 273.

Ovis strepsiceros X, 71: sec. Belon Itin. 20 [Observations, Cap. XIV p. 36], ubi *Ovis* memorabilis domestica, "in monte Ida ins. Cretæ vulgaris," cornibus rectis, spiraliter valde tortis, describitur. B. credit hanc esse *Ovis* vulgaris varietatem, eandemque fabulam de Unicornu suggestisse. — Aldrov. Bisulc. 407, et Raji Qv. 75, non nisi verba Belonii referunt.

In S. N. XII p. 98 accedunt: Gesner Ic. 37 [Hist. p. 297], — Jonston tab. 45 et Brisson p. 45, omnia tantummodo e Belonio l.c. — Addit tandem: Houttuyn 3, p. 267 t. 267 [pro 26], ubi *Antil. strepsiceros* Pall., animal totum, "ex oris Africæ occidentalis," repræsentatur, cum figura bona cranii cornuti, "ad Regem Sueciæ missi."

Bos taurus; X, 71 et — XII, 98, vix differunt. β) domesticus (in ed XII lit. α et β inversæ).

α) *Urus*, Cæsar Bell. Gall VI cap. 5, a Linnæo habetur *Bos ferus*. Incertum quodnam animal Cæsar descripserit, sed verba "Specie et colore et figura tauri," et "Cornua pro poculis utuntur" potius de *tauro* fero quam de bisonte dicta videntur; neque de juba loquitur. Nulla alia auctoritas affertur. Credimus igitur *Urum* Linnæi et Cæsaris aliud animal fuisse, quam Bisontem, eosque male egisse, qui Bisontem *Urum* appellaverunt. Magnitudinem, quam Cæsar describit, "paullo infra Elephantos," æque in utroque horum quadrare, probant crania ingentia et sceleta utriusque, in terra inventa, quæ in Academia nostra Lundensi asservantur. — Memorandum est Linnæum non *Urum* Raji, p. 70, afferre, ubi notitia Mentzelii de Bisonte, nomine Uri, et Cæsaris de Uro simul inveniuntur.

Bos bonasus X, 71, tantum nixus in Raji Quadr. 71 et Jonstoni tab. 18, f. 1. Rajus vero Aristotelem transcribit: de Bonaso e Pæonia "cervice armorum tenuis jubata, equi in modum," quod Bisontem

significare videtur. — Figura vero Jonstoni, nescio unde sumta, videretur esse corpus bovis, additum capiti factitio, secundum crania fossilia bovina, a Gesnero p. 137 delineata, composito.

In Edit. XII, p. 99 adduntur: Gessn. Quadr. 145, ubi figura et descriptio bonæ Bovis tauri feri, secundum vivum factæ, exponuntur, de quibus supra (L. p. 200) locuti sumus. [Locum origin. Herbersteinii, de Uro et Bisonte, rem bene illustrantem, invenies in Okenii Allg. Naturg. Zool. p. 1427]. — Porro: Aldrovandi Bisulc. 361, ubi crania tauri feri fossilia, a Gesnero p. 137, et caput, forsitan fictum, ab eodem Gessnero, p. 131, desumta, nomine Bonasi representantur. — *Bonasus* igitur Linnæi compositio est a Bove et Bisonte.

Bos bison X, 72. Fontes sunt: Raji Quadr. 71, ubi *Bison* Germaniæ et Americæ simul memorantur. — Gessner "296" [In Hist. An. I, Francof. 1603, pag. 128, sed signata 140]; quo in loco figura et descriptio Bisontis e Mazovia exponitur, quæ, ad vivum factæ, a Lib. Bar. ab Herberstein, simul cum figura tauri feri, nuper, sub bonaso, memorata, editæ sunt. — Jonston t. 17 f. 2 præbet iconem Gessneri, nuper citatam. — Catesby 3, p. 20, — et Hernandez Mexic. 587 Bisontem ex America exhibent. — Tandem Gessn. 301 [Hist. Nat. 130], ubi "*Bison albus scotius*," s. *Bos taurus* in Scotia ferus, depingitur. — Hic igitur solus ultimus locus alienum quoddam exhibet; reliqui vero omnes de *Bisonte*, europæo vel americano agunt.

In Ed. XII, p. 99 nullus fons accedit, ibi vero "*Bison americanus*" ut var. β , ab europæo, genuino, distinguitur. Male igitur egerunt, qui nomen bisontis ad var. americanam transtulerunt, forsitan quia hæc sola in Ed. VI:ta commemoratur; ibi vero nulla est quæstio de nominibus.

Bos grunniens XII, 99, sec. "Brun. it 120 t. 120" et S. G. Gmelin, Nov. Comm. Petrop. Vol. V p. 339 t. 7; pecus apud Calmuccas domesticum describens. Est *Bos grunniens* rec.

Bos "bubalis" X, 72 et — XII, 99, verbatim eadem. Fontes sunt Gessner, Aldrovandus et Rajus. [Obs. Belon circiter 1550 Bovem hubalum frequentissimum invenit in Italia, Græcia et Asia. Observ. p. 265].

Bos indicus X, 72 sec. Edw. tab. 200 (Zebu rec).
De hoc bove conf. supra, I p. 201.

In ed. XII, p. 99 additur: *Var. β* ex Africa, "Bubalus africanus Belon it. 119," [Observations, Cap. L, p. 264—266]. Belon unicum specimen Cabiræ vidit, "apporté du pays d'Asamie, combien que l'on en trouve aussi en Afrique." Certe est e genere Bovis, nec Bubalidis. Caret tubere dorsali (ideo non Zebu); magnitudo circiter Cervi damæ, robustus, teres, rufescens, cornibus valde flexis etc. — Videtur esse varietas quædam parva *Bovis tauri*.

Addenda et Corrigenda

in parte hujus tractatus priore:

Vet. Ac. Handl. 1844 p. 121—210.

Pag. 175. Ad Familiam Cervinam:

Pictura corporis Cervorum propria quædam memorabilia præbent. Cum reliquis Pecoribus communia sunt: color plerumque rufescens vel griseus; vitta infra-lateralis fusca vel nigricans, quæ tamen in Cervis rarius apparet, vel tantum colore laterum inter series 2 albomaculatas denotatur; area analis alba vel pallida, sæpe fusco-cincta, rarius supra caudam extensa (in Cervo elapho et aff., Antilope dama, gutturosa etc.). Sic etiam aurium lineæ tres interiores, pilosæ, in toto Ordine eædem.

Cervis omnino desunt lineæ s. vittæ obscuræ per oculos, nares versus ductæ, superne vittâ alba vel pallida limitatæ, quæ in reliquis Pecoribus frequenter observantur; neque adest nigredo vel albedo faciei anterioris, a naribus cornua versus extensa. Adest vero, in plerisque, macula nigra s. fusca infra angulum oris, sæpe in labio supe-

riore, nares versus, continuata. Quæ macula, inter reliqua Pecora, vix nisi obsoletior in Capris quibusdam, in Sylvicapra mergente et in Cervicapra capreolo observatur. Præcipue vero Cervinis propria est pictura pullulorum albomaculata, quæ tamen paucis deest, aliis par totam vitam remanet. Maculæ certos tantum cutis locos tingunt; sunt enim:

- 1:o Series spinales, 1 utrinque; plerumque pollicem inter se distantes.
- 2:o Series infra lateralis, ad latera ventris, juxta limites coloris albi ventralis, rarius adest.
- 3:o Maculæ laterales trunci; vel sparsæ, vel in series 2 laterales digestæ; quarum inferior, interdum sola evidens, ad medium latus ducta.
- 4:o Mac. femorales, sparsæ; sed extremæ (inferiores) seriem curvatam mox infra genu (apicem ossis femoris) descendentem, formant.
- 5:o Series scapularis, ante scapulam, a serie spinali, olecranium versus, ducta.

Latera colli, totum gastræum, caput et artus his maculis carent *).

Pulluli, ut supra diximus, agnoscuntur formis partium, quas pro notis descripsimus. Picturam seniorum, quum maculæ remanent, picturæ juniorum exacte similem esse observavimus. Hos pullulos descripsimus:

Alces juvenis, non maculatus, similis adulto.

Tarandus — non maculatus, vitta infra laterali fusca, evidente, et cet. ut adultus.

Cervus elaphus læte fulvus area supra-caudali pallidiore, ut in adulto. Linea spinalis nigra, seriebus spinalibus

*) Hæc pictura Cervorum albomaculata in affinibus Sylvicaprinis (*Tragelaphis*, *Strepsicerote*) quoque apparent, sed maculæ plerumque in strias spinales, laterales etc. confluent.

albomaculatis, pollicem distantibus, vix in cervice continuatis. Maculae laterales numerosae; series scapulares et infralaterales minus definitae adsunt. (Macularum vestigia saepe in senioribus apparent).

- C. philippinus* (? e Manilla, Mus. Paris). Pullulus fulvescens, non maculatus; pictura ut in adulto.
Hippelaphi typici omnes prima aetate immaculati videntur.
- C. axis*, rufo-fulvus area anali parva, alba, fusco-cincta, etc. vid. supra. — Series spinales contiguae, in linea nigra sitae, ad occiput extensae. Series infralateralis lineam albam, fere continuam format. Maculae trunci rotundatae, crebre sparsae.
- C. pseudaxis* adultus, cf. supra.
- C. porcinus*, fulvo-grisescens, area anali vix distincta. Maculae trunci crebrae, alidae, parvae (diam. 3—5 millim.). Series spinales pollicem distantes, in stria fuscescente sitae, tantum in basin cervicis continuatae. Series infralaterales desunt.
- C. dama*, area analis latius alba, nigro-cincta. Series spinales pollicem distantes, absque stria nigra, in cervice distantiores et obsoletiores, caput versus evanescentes. Series infralateralis deest; scapularis, lateralis et femoralis striam fere continuam formant. (Seniores, in habitu aestivali, maculas plerumque conservant, etsi minus evidentes).
- C. virginianus*, laete rufo-fulvus, (crebre?) albomaculatus. Series spinales, absque linea nigra, a capite ad caudam ductae, pollicem distantes. (Scopae pedum ut in adulto).
- C. nemoralis* pullus, simillimus priori; differt scopae metatarsi vix ulla. (Mus. Paris. et Lugdun.).
- C. campestris*, laete fulvus seriebus spinalibus latius distantibus. Maculae laterales utrinque in series 2 irregulares digestae; infralateralis nulla. Orbita, ut in adulto, infra, cum macula superiore, alba; cauda superne nigricans. (Directionem pilorum et formam, v. supra).
- C. nemorivagus*, grisescens maculis ut in priore dispositis, sed paullo pluribus in scapulis femoribusque.
- C. rufus*, rufus capite colloque griscentibus, gula alba. Maculae ut in 2 prioribus dispositae, sed series laterales (utrinque 2) irregulariter multiplices; spinales sesqui-pollicem distant et, per totam cervicem, ut lineae interruptae, continuantur (Mus. Lugdun.); vel tantum in basi colli breviter extensae (Mus. Paris.). Ratio hujus differentiae mihi ignota.

Prox muntjac; color adulti, additis maculis albis. Series spinales 2 pollices distantes, non in collum extensæ; laterales, utrimque 2, irregulares; infralateralis nulla. E Sumatra, Mus. Paris. In Museo Lugdunensi pullulos e Java vidi, maculis vel albis, vel obsoletis ornatos.

Pr. albipes? Wagn. e Ceylon. Pullus non major, quam nuper descripti, sed maculis omnino carens. Mus. Paris.

Capreolus europæus, fulvo-griseus (subtus non albus) dorso fusco-castaneo. Maculæ laterum multæ, flavescences, minus distinctæ. Series spinales a capite ad caudam extensæ, pollicem distantes.

Moschus moschiferus et *M. sibiricus*, adulti sæpe vestigia præbent macularum spinalium, lateralium et femoralium.

Tragulus meminna semper iisdem maculis variegatus.

Tr. javanicus, pullulus non maculatus, similis adultis.

Fœtus 6-pollicaris, funiculo umbilicali adhuc relicto, in Museo nostro asservatur, picturâ adulatorum ornatus.

Pag. 176: Rangifer, Tarandus; Conf. supra, in App. 2:da pag. 300: nomen rectius *Tarandus rangifer* scribendum.—Ulteriore examine digna sunt ea, quæ de Tarando dixerunt veteres, unde colligi fere liceret, hoc animal, quoque recentiore tempore, in Europa media, vel etiam meridionali, vixisse. Plinius enim dicit "Schytarum tarandus;" Jul. Cæsar (Comm. VI, 26) hoc animal bene describit ut "Bos cervi figura" in silva hercynica; et Gaston Phœbus de venatione ejus ita loquitur, ut crederes, animal illi bene cognitum in Pyrenæis vel montosis Galliæ inveniri; patriam vero non memorat. De qua re conf. Gesnerum et Buffonium. Reliqui auctores veteres, quos præsertim Aldrovandus memorat, nullam cognitionem Tarandi, nisi a Plinio acceptam, habuisse videntur.

Pag. 177: Cervus.

C. n:o 3 *Wallichii*, ulterius a BLYTHIO describitur in: Journal of the As. Soc., quod amicissime nobis monuit cl. HARTLAUB. — Sp. magna: mas 3-ennis in dorso antico 4½ pedes altus. Cervicis linea media fuscescens, longius pilosa. Plaga supracaudalis pure alba. Partes inferiores albidæ.

C. *affinis* Hodgs. n. sp. Div's primæ (C. elaphi), e Nepal, cornibus longissimis agnoscendus (J. E. Gray in litteris).

C. n:o 4, C. *sika* dictus est a SCHLEGELIO in Fn. Japon. Mamm. tab. 17.

- C. nio 17, nudipalpebra*, teste J. E. GRAY, est mera varietas obscura *C. axis*, cornibus longis, ut in *C. axi* formatis.
- C. dimorphe* Hodgson, Journ. As. Soc. Nova sp. quæ in Div. *C. hippelaphi* inserenda videtur: cauda brevi, auriculis latissimis, staturâ alta. *C. axi* tamen similis colore juvenis fulvo, albomaculato. Natura pilorum et magnitudo mihi ignotæ. Mas senior (3-ennis) obscure rufescens, collo ventrequè nigricantibus; cornibus pallidis, brevibus, valde curvatis. Cornua pone basim ad latera diriguntur, apex deinde fere perpendiculariter surgit; propugnaculum breve, antrorsum flexum. (Nil vidi, nisi iconem et descr. Hodgsoni, a cl. HARTLAUB benevole communicatas. Cf. Ann. Nat. H. XIV. 74).
- C. frontalis* n. sp. ex India vel Butan a Mc CLELLAND allata. Typus habetur proprii subgeneris, *Panolizæ*, a J. E. GRAY propositi. Cornua, subsimilia Tarandi, in Zool. Proc. 1837 p. 45 breviter describuntur.
- C. niger* (p. 183, nota) teste GRAY, est *C. porcinus*, e figura descriptus.

Pag. 184. Genus Prox. Ex iis, quæ benevole communicavit Gray, verisimile apparet, tres tantummodo species hujus generis cognitæ esse: insularem (*P. muntjac*), chinensem et indicum, quas vero ipsum amplius expositurum speramus.

Pag. 185. Moschus. Varietates quatuor, ibi expositas, specificè distinctas habet cl. Gray, qui species ita proposuit in Catalogo Musei Britannici (Mamm. 1843), p. 172:

1. *M. moschiferus* L.; *M. saturatus* Hdgs.
2. *M. sibiricus* Pall. ex Altai.
3. *M. leucogaster* cf. supra l. c.
4. *M. chrysogaster* (Obs. supra l. c. pro verbis "alii tantem" legas alii tandem).

Pag. 186. Tragulus: legas *Tragulus Brissonii*, et conf. *Capram pygmæam*, supra, in expositione Pecorum Linnæi, p. 303. — Ibi sub nominibus: Brisson, Buffon et seqq. apparet origo hujus nominis.

Tr. pygmæus, nio 4, p. 187: nomen deleatur ejusque loco inseratur nomen: *Tr. javanicus* rec. (*Moschus jav. Gmel. Syst. Nat. I, 174, sec. Buffon et Pall.*). De hoc nomine videas supra, loco nuper citato.

Præter species hujus generis paullo aliter proponendas, hæc præsertim nobis scripsit cl. Gray:

Tr. ecaudatus (supra p. 186 n:o 2) est idem ac *Tr. Stanleyanus* Gr., ibd. inter minus cognitos enumeratus. Cauda re vera adest in speciminibus integris.

Tr. aquaticus (Ogilby) Z. Proc. 1840, e Sierra Leone, lapsu calami gravissimo, a me, p. 187, "*M. Stanleyanus* Og." dictus, quod corrigendum est. — Hic typus habetur proprii subgeneris, *Hymoschi* Gray (Ann. Nat. Hist. 1845), cui præcipue insignia sunt forma cranii et ossis intermaxillaris. Hoc enim ita est exiguum, ut in apice tantum maxillæ contineatur, longe ab ossibus nasi remotum. Ossa quoque metatarsi separata dicuntur.

Pag. 190, *Sylvicapra*: 13 sp. a cl. J. E. GRAY describuntur in Ann. Nat. Hist., Sept. 1846, ubi genus *Cephalopus* dicitur.

1. *S. mergens*; adde: var. β colore, etiam æstate, grisescent; e Caffraria (Mus. Stockh. a J. Wahlberg allata). — A *S. mergente* tantum colore, minime formâ, differt.

Obs. Pili in var. occidentali (capensi) nigricantes, ante apicem late rufescentes, vel hieme fulvescentes; in Orientali (e Caffraria) ibi semper magis flavescentes vel grisescentes. — Pictura paullum variabilis. In femina et juniore venter et jugulum alba; in mare vetere (capensi) rufescentia, mento solo albido. — *C. campbellie* Gr. videtur esse var. parte apicali pilorum distinctius nigra et nigredine nasi in verticem usque continuata. *A. platous* H. Sm., teste GRAY, est var. nigredine nasi vix ulla. *A. Burchellii* H. Sm. est animal hiemale vel fortasse var. caffra. Sed *A. grimmia* Pallasii ab his omnibus longe differt.

4. *S. Frederici*, auctore GRAY l. c. eadem est ac *S. philantomba* (n:o 7). Deleatur igitur, sed descriptio sub n:o 7 inseratur. — Synonymon *Guévei* Buff. omnino deleatur.
5. *S. pygmæa*, legas: (Linn. Licht. Wagn. nec Pallasii). Præterea conf. supra, pag. 307—9, de Capra pygmæa Linnæi, sed nomen ambiguum rejiciendum et animal potius *S. monticola* (Thunb. Act. Stockh. 1811) dicendum. — Color in iis, quas e Caffraria nobis attulit J. WAHLBERG paullum variat; obscurior vel leviter fulvescente tinctus; sed pili, in qualibet corporis parte, omnes similes, nec obscuri cum pallidis mixti. — Varietatem hujus sp. in insula juxta Zanzibar (6° Lat. Merid.) invenit noster

M. v. DÜBEN. Specimen masculinum, d. 25 majo occisum, domum allatum, a capensibus nulla re differt, nisi pedibus griseis, omnibus antice, ut in *S. mergente*, fuscis; qui color, in meridionalibus, non longe supra digitos extendi solet. Pili vero trunci, ob tempus anni, apice triti, late pallidi, sordide fulvo-griscentes; qua re color a pallido et obscuro mixtus apparet.

10. *S. coronata* (Gr) loco nuper citato a cl. GRAY eadem habetur ac *S. madoqua* (nob. nro 2); deinde vero in litteris nobis communicavit, se hæc animalia omnino distincta invenisse.

9. *S. Ogilbyi*: auriculæ breves, rotundatæ. Gr. l. c.

Species addendæ sec. GRAY l. c.; omnes auriculis brevibus, obtusis instructæ.

C. dorsalis Gray, obscure rufescens linea dorsali cum cer vice verticeque nigris. Sierra Leone. (Magnitudo?)

C. niger Gr. fusco-niger antice fuscior, subtus griscens. Major qv. *S. monticola* (nro 5). Guinea.

C. melanorheus Gr. griseus pilis immixtis nigris, uropygio caudaque superne nigris; mento ventrequæ albis etc. Sp. parva.

C. punctulatus Gr. fuscens pilis annulo ante apicem flavescens; gastræo albo. Parva species e Sierra Leone.

Pag. 191. *Nanotragus*. Nota 2:da (signo **) notata ut erronea deleatur. Conf. ea, quæ supra, pag. 303—9 (et in Vet. Ac. Öfversigt 1846, Mars, p. 83), de *Capra pygmaea* Linnæi diximus. Nomen primum est *N. perpusillus* (L.).

Pag. 192. Post *Nanotragum* inseratur:

NESOTRAGUS nov. gen. M. v. DÜBEN, Vet. Ac. Öfversigt 1846 p. 221. Omni re cum *Neotrago* convenit, sed differt sinibus lacrymalibus, profundis, arcuatis. Hanc tamen ob causam non repugnarem conjunctionem horum animalium genericam.

N. moschatus v. Düben l. c. griseo-rufescens, ventre albo, pedibus dilute rufis. Pili dorsi fusci, pone medium late rufescentes, puncto obsoleto, pallido, ante apicem nigricantem. Aures fere dimidium caput æquantes. Magnitudo *Nanotragi*, a quo vix jure genericè separatur, cum unice sinibus lacrymalibus differt. Rhinarium, vertex lævis, pedes, cauda totusque habitus *Nanotragi* sed canda maris non pectiniformis. Cornua maris subrecta, elongata, valida, multiannulata, apice longo lævi; ex orbita posteriore oriuntur; retrorsum incumbentia, inter se parallela, in lineam, a linea faciali continua-

tam, directa; capitis longit. æquant. ♀ ecornis. — Habitat in insula prope Zanzibar Africæ orientalis.

Pag. 195. *Cervicapra defassa*. Ant. unctuosam, ibi memoratam, nulla re differre testatur GRAY, in litteris.

Pag. 197. *Hippotragus leucophæus*. Inspectis specimenibus *H. equini*, varii sexus et ætatis, ab amico J. WAHLBERG allatis, persuasum mihi habeo, differentiam quandam inter hæc duo animalia revera fuisse. Mas enim *H. leucoplæi*, in Museo Academiæ nostræ asservatus, junior sed cornutus, ungulas habet multo minores, quam specimina juvenilia, ♂ et ♀, *H. equini*. Reliquæ etiam notæ, a nobis supra propositæ, constantes apparent. Saltem igitur varietatem majorem et minorem distinguere fas est. Qua de re in alio loco amplius referre occasio erit.

Pag. 198. Portax "*tragelaphus*," legas: *P. tragocamelus* (Pall.).

Pag. 199. Genus *Bos*. Observandum est, ungulas in Bovibus, ut in plerisque Pecoribus, multo latiores esse in mare adulto, quam in juniore et in femina.

Pag. 200. *Bos taurus* β. Cognitum est, hos Boves albos esse, quia custodes vitulos aliter coloratos extinguunt; sed tamen Gessnerus, aō circiter 1550, eos feros et albos dicit. — Obs. hoc loco legas Wagnero pro "Waglero" — *Bos grunniens* (p. 202, quem non vidi, a Cl. GRAY rhinario piloso instructus dicitur (Ann. Nat. Hist. 1846 p. 230). — Idem in litteris benevole nos docuit, Bovem *brachycerum* (p. 202) adultum quoque cornibus brevibus, basi lævibus, neque dilatatis, a *B. caffro* distingui, et marem adultum pedes anticos, basi jubatos, ut in Ove *tragelapho*, habere. — Boves indici, pag. 200 et 201 memorati, nobis adhuc non satis innotuerunt. — Expositionem emendatam hujus generis, quam exoptamus, aliis commendare liceat.

Pag. 205. *Catoblepas* sp. 2 est *C. gorgon* H. Sm. — Nomen *C. taurinæ* Burch., monente cl. GRAY, delendum est, ut synonymon sp. primæ, *C. gnu*, cui juba et cauda interdum totæ nigræ apparent, quod speciem distinctam denotare crediderunt. Hæ enim partes, ad latera, pilis albis vel sordidis, griseis fuscisve, plerumque cinguntur. Corpus semper unicolor, niger. *C. gorgon* semper griseus, transversim irregulariter nigrostriatus observatur, quod descriptioni ejus addendum est.

Pag. 207. *Oryx capensis*. Aures latiores, sed vix apice rotundatæ dicendæ. Cornua (maris) breviora, quam leucorygis, in parte annulata levissime curvata. Fasciculum gulæ non invenio in specimine eximio, a WAHLBERGIO nobis allato.

Pag. 210. *Bubalis albifrons* a *B. pygarga*, maxime affini, distinguitur colore dorsi postici in caudam usque extenso et annulis prominulis cornuum albis. (Mus. Stockh. a J. Wahlb.). — Obs. Nomen generis, in pag. 172 et 173, lapsu typographico "*Bubalus*" expressum, correctione eget: *Bubalis* dicitur.

Addenda et Corrigenda

in parte 2:da, supra pag. 265 et. seqq.

Pag. 266. *Antilope lævipēs* est *Gazella rufifrons* Gray, Ann. N. Hist. Sept. 1846 p. 214, sub mora diuturna hujus operis imprimendi descripta.

Pag. 267. *A. isidis* eodem loco, a GRAY, nomine *Gaz. isabellæ* describitur.

Pag. 271. *A. melampus* potissimum ut genus proprium, *Æpyceros*, a reliquis distinguatur. Nomen et characteres in l. c. proponuntur. Nomen "*Antilope*" minime huic tribuendum, sed, ut supra diximus, *A. cervicaprae* præ ceteris proprium est.

INDEX

Nominum atque Synonymorum

Antiloparum.

Nobis, genus Pallasianum "*Antilope*," omnibus cognitum et adsuetum, dividitibus et membra ejus undique disjicientibus, fas est ut indicemus, ubi singula nomina inveniantur, quod eo potius officium est, quo negligentius synonymiam supra tractavimus. Ordine igitur Alphabetico omnia nomina specifica, in genere *Antiloparum* adhibita

hibita nobisque cognita enumeramus. Ea, quæ conservanda (systematica) habemus, literis s. d. *cur-sivis* scribimus, addita citatione generis et paginae in opere nostro, cujus pars I:ma in Act. Stockh. prioris anni (1844), II:da in hoc volumine exstat. Synonyma literis ordinariis scribimus, addimusque nomen ejusdem animalis systematicum, a nobis acceptum, quod in hoc eodem indice quæras. Cum recentioribus quibusdam auctoribus nomina specifica, a litera ordinaria, minore incepta, scribimus præter ea, quæ nomen proprium hominis exprimunt e. gr. Ant. Friderici, A. Harrisii.

ANTILOPE	invenitur:	
	Genus.	Pars. Pag.
<i>acuticornis</i> Blv.	Sp. inc. n:o 7	II, 296.
<i>addax</i> Licht.	Oryx,	I, 206.
<i>addra</i> Benn. = dama.		
<i>adenota</i> H. Sm.	Sp. inc.	II, 295.
<i>albifrons</i> Harr. (vid. Add. p. 324) . .	Bubalis	I, 210.
<i>albipes</i> Erxl. = tragocamelus.		
<i>algazella</i> Rüpp. v. leucoryx.		
<i>americana</i> Desm. = Capra montana.		
<i>americana</i> (Antiloc.) Ord. = furcifer.		
<i>annulipes</i> Gr.	v. Sp. inc. 5	II, 295.
<i>arabica</i> v. dorcas, var. ♂.		
<i>arundinacea</i> Sh. = eleotragus.		
<i>aurita</i> Burch. = equina.		
<i>barbata</i> H. Sm. = jubata.		
<i>beisa</i> Rüpp.	Oryx,	I, 207.
<i>Bennettii</i> Sykes, v. Dorcas, var. g.		
<i>bezoartica</i> (Capra) L. v. Pecora Linnæi, p. 310.		
do Erxl. = leucoryx.		
do Pall. conf. do		
<i>bohor</i> Rüpp.	Cervicapra,	I, 195.
<i>bubalina</i>	Nemorhedus.	II, 287.
<i>bubalis</i> Pall. (= Bubalis n:o 1 et 2), v. mauretanica.		
do Licht. = casma.		
<i>Burchelli</i> Sm. = mergens, var. (cf. add. II, p. 321).		

	Genus.	Pars. Pag.
<i>caama</i> Cuv. Menag	Bubalis,	I, 208.
<i>cærulea</i> H. Sm. = <i>pygmæa</i> Licht.		
<i>campestris</i> Thbg. Act. Petr. = <i>tragulus</i> .		
<i>canna</i> H. Sm. = <i>oreas</i> ♀.		
<i>capensis</i> (Oryx) Harr. Add. 324. . .	Oryx, 3.	I, 207.
<i>capensis</i> (Damalis) Sm. Ill. = <i>strepsiceros</i> .		
<i>capensis</i> Afz. = <i>tragulus</i> .		
<i>capreolus</i> Licht.	Cervicapra,	I, 193.
<i>cervicapra</i> L. Pall. (Append. II, 310).	Antilope,	II, 270.
<i>chicara</i> Hardw. = <i>quadricornis</i> .		
<i>chiru</i> Less. = <i>Hodgsonii</i> .		
<i>chora</i> Rüpp. = <i>strepsiceros</i> .		
<i>cinerea</i> Afz. = <i>eleotragus</i> .		
<i>colus</i> H. Sm. = <i>saiga</i> .		
<i>compressicornis</i> Leach. = <i>depressicornis</i> .		
<i>connochætes</i> (Bos) = <i>gnu</i> .		
<i>cora</i> H. Sm. v. <i>dorcas</i> , var. ♂.		
<i>corinna</i> Pall. conf. Ant. lævipedem et A. dorcadem var. Kevellam.		
<i>coronata</i> (Cephalophora) Gray . . .	Sylvicapra,	I, 191.
<i>crispa</i> Tem.	Nemorhedus,	II, 287.
Cuvieri = <i>dorcas</i> γ.		
<i>dama</i> Pall., Licht.	Antilope,	II, 266.
<i>dammah</i> Rüpp. = <i>beisa</i> (sec. Rüpp. Neue Wirb.).		
<i>defassa</i> Rüpp.	Cervicapra,	I, 195.
<i>decula</i> Rüpp.	Tragelaphus,	I, 189.
<i>depressicornis</i> H. Sm.	Anoa,	I, 199.
<i>dorcas</i> L. Pall. (Append. II, 312) .	Antilope,	II, {267. 268.
<i>dorcas</i> Pall. Misc. = <i>pygarga</i> .		
<i>dorcas</i> Thbg. Act. Petr. = <i>caama</i> .		
<i>doria</i> Ogilb. v. <i>Zebra</i> .		
<i>dorsata</i> Lac. = <i>euchore</i> .		
<i>Duvauceli</i> H. Sm. = <i>sumatrensis</i> .		
<i>ellipsiprymnos</i> Og.	Cervicapra,	I, 195.
<i>eleotragus</i> Schr.	d:o	I, 194.
<i>ensicornis</i> Ehr. cf. <i>leucoryx</i> .		
<i>equina</i> Geoffr.	Hippotragus,	I, 197.
<i>euchore</i> Forst.	Antilope,	II, 270.
<i>ouryceros</i> Og. Z. Pr. 1836, an = <i>addax</i> ?		
<i>excelsus</i> nob.	Strepsiceros,	I, 196.
<i>forfex</i> H. Sm.	Sp. inc. 5	II, 295.
<i>Friderici</i> Wagn. (cf. Add. II, p. 321)	Sylvicapra,	I, 190.

- fulvorubescens* Dsml. = *tragalus*.
fulvorufula Afz. = *eleotragus*.
furcifer H. Sm. Dicranoceros, II, 272.
gazella Pall. cf. *leucoryx*.
gazella L. (*Capra*) Append. II, 309.
gibbosa Savi Isis 1832 = *addax*.
glauca Forst. = *leucophæa*.
gnu Zimm. Catoblepas, I, 205.
gorgon H. Sm. (= *Catobl. taurina* I, 205) conf. Add. 323.
goral Hardw. Nemorhedus, II, 287.
grandicornis Sp. inc. II, 296.
grimmia L. (*Capra* et *Moschus*, cf. App. p. 313).
grimmia Pall. (Append. II, 309) . . Sylvicapra, I, 190.
grisea Cuv. H. Sm. = *Melanotis*.
gutturosa Pall. Antilope, II, 270.
hamata Tem. cf. Sp. inc. Obs. II, 297.
hippelaphus (*Tragocamelus*) Og. = *tragocamelus*.
Hodgsoni Ab. Antilope, II, 270.
Harrisii = *niger*.
Hemprichiana Ehr. Neotragus, I, 191.
ibex Afz. = *tragulus*.
interscapularis = *sumatrensis*.
isidis = *dorcas* var. α .
isabella Gr. = *isidis*.
isabellina Afz. Cervicapra, I, 194.
ixalus Og. conf. Obs. post genus *Ovis*, II, 274.
jubata (*Capra*) Golds. v. post sp. ign. II, p. 297.
kemas H. Sm. = *Hodgsonii*.
kevella Pall. v. *Dorcas*, var. β .
kob Erxl. Sp. inc. n:o 2, II, 294.
koba Erxl. nob. Bubalis, 3, I, 209.
koba Ogilb. = *defassa*.
korrigum Ogilb. Z. Pr. 1836, p. 103
(auct. Gray) = *A koba* Erxl.
lævipēs Antilope, II, 266.
Lalandii Dsml. = *eleotragus*.
lanata Dsml. = *capreolus*.
Landiana Dsmr. = *eleotragus*.
leptoceros Fr. Cuv. Antilope, II, 269.
lanigera H. Sm. = *montana*.
lervia Pall. Sp. inc. n:o 1, II, 294.
leucophæa Pall. v. Add. p. 323 . . Hippotragus, I, 197.
leucophæa Forst. = *sylvatica*.

	Genus.	Pars.	Pag.
leucopus Forst. = tragocamelus.			
leucoryx Pall., Licht.	Oryx.	I,	206.
lunata Burch. H. Sm.	Bubalis,	I,	209.
maculata Thbg = scripta.			
madoqua Rüpp.	Sylvicapra,	I,	190.
marsupialis Zimm. = euchore.			
mauretanica Og.	Bubalis,	I,	208.
Maxvelli H. Sm. = philantomba.			
mazama H. Sm. cf. post Sp. inc. p. 296.			
melampus Licht.	Antilope,	II,	270.
melanura Bechst. = scoparia.			
melanotis Licht., Forst.	Calotragus,	I,	192.
mhorr = dama, var.			
mergens Blv. (cf. Add. II, p. 321)	Sylvicapra,	I,	190.
minuta Forst. = pygmæa Pall.			
montana Crzm.	Calotragus,	I,	193.
monticola Thbg 1811 = pygmæa Licht.			
moschatus v. Düb.	Nesotragus.	Add. II.	322.
mytilopes H. Sm. = addax.			
nanguer = dama var.			
nasomaculata Blv. = addax.			
natalensis A. Sm.	Sylvicapra,	I,	190.
nictitans Thbg = Mergens.			
niger (Aegoceros)	Hippotragus,	I,	197.
nigra = niger.			
oreas Pall.	Damalis,	I,	199.
oreotragus Forst. v. saltatrix.			
orientalis Erxl. = gutturosa.			
oryx Pall. Misc. = oreas.			
oryx Pall. Spic. XII = capensis.			
oureby Sh. = scoparia.			
„ Fr. Cuv.; Conf. reduncam.			
Ogilbyi Wat. (Add. II, 322)	Sylvicapra,	I,	191.
pallida H. Sm. = pediotragus.			
palmata H. Sm. = furcifer.			
pediotragus Afz. = tragulus var. pallidior.			
perpusilla L. (Capra) = spinigera Tem.			
perpusilla H. Sm. = pygmæa. Licht.			
personata = pygarga juv. (Wagn.).			
phalerata H. Sm.	Tragelaphus,	I,	189.
philantomba H. Sm. vid. "Friderici"	Sylvicapra,	I,	190.
picta Pall. = tragocamelus.			

- platous* H. Sm. = *mergens* var. (cf. add. II, p. 321).
ptox H. Sm. = *mergens*.
pygarga Pall. (= *pygargus* Pall.) . . . Bubalis, I, 209.
~~*pygarga* Thbg. Forst. Bibch. = *euchore*.~~
pygmæa (L.) Licht. (App. II: 308, 9; et Add. 321) *Sylvicapra*, I, 190.
pygmæa Fr. Cuv. = *Friderici*.
pygmæa Pall. = *spinigera*.
quadricornis Blv. Tetraceras, I, 189.
quadriscopa H. Sm. Sp. inc. n:o 3, II, 295.
risia H. Sm. = *tragocamelus*.
reticornis Erxl. = (*Oryx*) *capensis*.
redunca Pall. Cervicapra, I, 195.
regia Erxl. = *spinigera*.
reversa Pall. misc. = *redunca*.
rubro-albescens Dsml. = *melanotis*.
rufa Afz. = *redunca*.
rufescens Burch. H. Sm. = *tragulus*.
ruficollis H. Sm. = *dama*.
rufifrons Gr. = *lævipes*. Cf. Add
rupestris H. Sm. Forst. = *tragulus*.
rupicapra Pall. = Capra rupic. II, 284.
saiga Pall. = *tatarica*.
saliens Lac. = *euchore*.
saltatrix Bodd. Oreotragus, II, 288.
Saltiana Blv. = *madoqua*.
Seltiana Ehr. Rüpp. Atl. = *Hemprichiana*.
scoparia Schr. Calotragus, I, 192.
scripta Pall. Tragelaphus, I, 189.
scythica Pall. = *saiga*.
senegalensis Cuv. = *koba*.
singsing Benn. = *defassa*.
Soemmerringi Crzm. Antilope. II, 266.
spinigera Tem. (Conf. App. II, p. 308) *Nanotragus*, I, 191.
strepsiceros Pall. v. *excelsus*.
subgutturosa Pall. Antilope, II, 269.
subulata H. Sm. Sp. inc. n:o 7, II, 296.
sumatrensis Sh. Nemorhedus, II, 287.
suturosa Otto = *addax*.
sylvatica Sparrm. Tragelaphus, I, 189.
sylvicultrix Afz. Sylvicapra, I, 190.
tao H. Sm. = *leucoryx* Licht. jun.
tatarica (Capra) L. (App. II, 312). . Antilope. II, 270.

- taurina Burch. = gnu; conf. add. p. 323 (Catoblepas).
 temmamazama H. Sm. v. post Sp.
 inc. II, p. 297.
 tendal Rüpp. = strepsiceros Pall.
 tetracornis Hodgs. = Quadricornis.
 thar Hodgs. = bubalina.
 torticornis Herm. Sp. ign. n:o 8, II, 296.
 tragocamelus Pall. (lapsu calami "tra-
 gelaphus") Portax, I, 198.
 tragulus Forst. Calotragus I, 192.
 d:o var. β , pallidus Licht. = var. pris.
 truteri Fisch. = jubata.
 unctuosus Laur. = defassa.
 villosus Burch. H. Sm. = capreolus.
 zebra Gray Sp. inc. 6. II, 296.
 zebrata Rob. = zebra.

Åsikter rörande den organiska sammansättningen;

af

JAC. BERZELIUS.

Till Akademien inlemnad den 11 Febr. 1846.

Ingen del af kemien har varit föremål för så varierade åsikter, som den organiska sammansättningen. De flesta, som dermed sysselsätta sig, finna vid sina försök ofta oväntade föreningsförhållanden, göra sig deröfver för tillfället en egen tankebild, utan afseende på dennes sammanhang med vetenskapens öfriga lärobyggnad, och fortgå sedan i den riktning att finna nya bevis för denna åsigt. Derigenom hafva nästan otaliga olika föreställningssätt uppkommit. Jag har här inga nya åsikter att lägga till dessa. Min afsigt med denna framställning har endast till föremål, att fästa uppmärksamheten på den skada och splitt-ring, som orsakas vetenskapen genom de rent af diktade förklaringssätten, att hämma dessa och, om möjligt, hejda inbillningskraftens alltför fria flygt, i frågan om teoretiska betraktelser, samt binda den vid hvad som kan af erfarenheten någorlunda besannas. Jag är fullt beredd derpå att häruti icke vinna mängdens bifall.

Empirisk och rationell sammansättning. Hvert och ett organiskt ämne kan genom analys till sin sammansättning bestämmas. På större delen kan äfven atomvigten med någorlunda säkerhet

finnas, hvarigenom antalet af enkla atomer, äfvensom det relativa antalet af hvarje grundämnes atomer i föreningen, blir med säkerhet känt. Detta är nu den empiriska sammansättningen. Så t. ex. uttryckes oxaminsyrans sammansättning med den empiriska formeln $C^1H^1N^2O^1$.

Men då uppkommer den frågan: Huru äro dessa grundämnen sammanparade? Kan och bör denna syra betraktas såsom sammansatt å ena sidan af 5 atomer syre och å den andra af en sammansatt radikal, $C^1H^1N^2$? Detta grundämnes sammanparande till en sådan radikal vore ganska enkelt och ej osannolikt; men vi veta att sådan är icke denna syras sammansättning, utan att den består af oxalsyra, förenad med oxamid såsom koppling. Detta utgör dess rationella sammansättning och $\ddot{C} + NH^2 \ddot{C}$ dess rationella formel.

Den rationella sammansättningen är den organiska kemiens högsta problem; men det har hittills endast för ett ganska inskränkt antal organiska ämnen kunnat med tillförlitlighet lösas, oaktadt det utgör föremål för allas bemödande, som sysselsätta sig med organisk kemi. Vid försöken att komma till kunskap om kroppars rationella sammansättning, kan man aldrig använda nog varsamhet i slutsatser, nog grundlighet i om-dömet, nog mångfald i bevisen. Vetenskapen lider, och skall länge lida, af lifliga inbildningsgåfvors diktade rationella formler, för hvilka intet annat bevis finnes, än att de icke motsägas af de empiriska resultaten af analyserna. Men då hvar och en af de sistnämnda kan svara till många rationella åsigter, så bevisar detta alldeles intet. Hvad jag i det följande kommer att anföra skall nogsam och ådagalägga huru vetenskapen invecklas och blir missledande genom grundlösa

och förhastade slutsatser om den rationella sammansättningen.

Ehuru den organiska sammansättningen, vid första påseendet, tyckes vara alldeles olik den oorganiska, så är det dock från hvad vi af den sednare känna, som den enda tillförlitliga ledning, för vårt bedömande af den förra, kan erhållas. Det är nemligen den enda riktiga gången i våra forskningar, att stödja oss på det bekanta, för att leta oss till det obekanta. Det måste sålunda, äfven här, vara den rätta vägen, att taga hvad som är bekant af grundämnenas föreningslagar i den oorganiska naturen till rättesnöre vid bedömandet af deras föreningsart i den organiska. Allt annat sätt att framgå, blir att lemna fritt spel åt inbildningskraften, hvilken, i dess individuella mångfald, alltid är färdig att bilda nya slott i luften. Derigenom sker ock att otaliga olika åsigter framställas och varieras på mångfaldiga sätt, ingen följer samma rättesnöre och meningarna korssa hvarandra i alla riktningar, och detta skall aldrig upphöra förr än man allmänt är ense om rättesnöret för våra omdömen i denna väg.

Jag upprepar derföre: att användandet af hvad som är, eller kan ytterligare blifva, bekant af grundämnenas föreningsätt i den oorganiska naturen, till bedömande af deras föreningar i den organiska, är det ledband, genom hvilket vi kunna hoppas att komma till rigtiga och med hvarandra öfverensstämmande föreställningssätt om sammansättningsarter hos de kroppar, som i den lefvande naturen frambringas, eller genom dessas förändringar på kemisk väg uppkomma.

Denna grundsats har visserligen aldrig blifvit bestämdt förnekad, men den har också icke varit såsom allmän grund för omdömet antagen.

Historisk framställning om åsigterna af den organiska sammansättningen. De första någorlunda tillfredsställande försök, öfver organiska ämnens sammansättning, bekantgjordes 1811 af THÉNARD och GAY-LUSSAC. De kemiska proportionerna voro då ännu under sin utveckling och hade icke hunnit fästa desse kemisters uppmärksamhet, som nöjde sig med att bestämma grundämnena efter hundrade delar af det analyserade ämnets vikt. De åsikter hvartill dessa försök ledde, nemligen att de organiska ämnen, hvori vätet är till syret, såsom i vatten, äro neutrala, t. ex. stärkelse, socker, träd; de åter, hvori syret befinner sig i öfverskott, hafva egenskaper af syror, och de hvori vätet är öfverskjutande höra till klassen af hartser, oljor, spirituösa vätskor, instämde väl med resultaten af de då gjorda analyserna; men hafva sedan visat sig icke vara riktiga.

Några år derefter, sedan jag försökt de kemiska proportionernas utredande i den oorganiska naturen, företog jag deras eftersökande äfven i den organiska sammansättningen. Det visade sig då att syrehaltiga organiska ämnen, äfven sådana, som icke höra till syror, låta förena sig med oorganiska oxider, i bestämda och ofta multipla förhållanden, hvarigenom här, likasom i den oorganiska naturen, begreppet om atomvikt kunde erhållas, som då blef en kontroll på riktigheten af analysernas resultat. Dervid visade sig att syret i det organiska ämnet var en multipel af syret i den dermed förenade oorganiska oxiden, och att halften af de öfriga beståndsdelarne inträffade med vissa antal hela atomer, som kunde, likasom för den oorganiska sammansättningen, i formler uttryckas. Denna likhet i förhållande, emellan syrehaltiga organiska ämnen och de oorganiska oxi-

derna, ledde rakt till de organiskas betraktande såsom också varande oxider, men hvilkas radikal är sammansatt, då den deremot i de oorganiska utgöres af en enkel kropp. Denna åsigt uttryckte jag i den 2:dra svenska upplagan af min Lärbok i kemien, (Del. I., s. 544. Stockholm, 1817) med följande ordagrant derifrån hämtade sats: "Vi finna att skillnaden emellan organiska och oorganiska kroppar består deri, att i den oorganiska naturen alla oxiderade kroppar hafva *en enkel radikal*, då deremot alla organiska substanser utgöras af *oxider med sammansatt radikal*. Hos växtämnen utgöres radikalen i allmänhet af kol och väte och hos djurämnen af kol, väte och kväfve. Syror med sammansatt radikal vill således säga detsamma, som syror af organiskt ursprung. Lika-som ammoniaken är ett alkali med sammansatt radikal, d. ä. af organiskt ursprung, härstammande förnämligast från djurriket, men det oakadt ägande den största analogi med de alkalier, som hafva enkel radikal och härstamma från den oorganiska naturen, skola vi finna samma analogi emellan syror af organiskt och syror af oorganiskt ursprung, och att såsom kali och natron förhålla sig till ammoniak, så förhålla sig svafvelsyran, salpetersyran, fosforsyran till ättiksyra, oxalsyra, citronsyra m. fl."

Antalet af då analyserade organiska ämnen inskränkte sig till dem, som varit föremål för THÉNARDS och GAY-LUSSAC's samt för mina analytiska försök. Åsigten betraktades troligen af de flesta såsom förtidigt framlagd och blef i tvenne decennier lemnad utan uppmärksamhet.

De föreställningar, som under tiden begynte göra sig gällande, voro af en helt annan art. Man betraktade de organiska ämnen såsom samman-

satta af binära föreningar emellan grundämnena, eller af en binär förening och ett grundämne. PROUT sökte visa att en stor del växtämnen, särdeles de som utgöra näringsmedel för djuren, kunna betraktas såsom föreningar af vatten med kol, i olika relativa atomförhållanden emellan båda. Denna åsigt hade äfven framställt sig för THÉNARD och GAY-LUSSAC, som likväl ansågo den icke kunna antagas. Andra kemister begynte beräkna huru de organiska ämnena kunde anses sammansatta af binära föreningar, två eller flera efter omständigheterna, kolsyra, vatten och i olika förhållanden kolbundet väte. Vid dessa beräkningar gafs ingen annan grund, än godtycket och öfverensstämmelsen med analysens procentiska resultat, också blefvo alla åsikter varierande och höra numera icke till vetenskapen, utan till dess historia.

Föreställningssättet om sammansättningen af binära föreningar hade emedlertid fått ett kraftigt stöd i GAY-LUSSACS undersökningar af alkoholns och eterns sammansättningsart, hvilken han 1816 visade så förhålla sig, som om 2 volumer oljbildande gas i etern vore förenade med 1 volum vattengas och i alkoholen med 2 volumer deraf. Öfverensstämmelsen af denna åsigt med dessa kroppars egentliga vikt i gasform och med den då rådande föreställningen om eterns bildning af alkohol genom borttagande af vatten derur, var så fullständig, att den svårligen kunde annat än väcka bestämd öfvertygelse hos dem, som ännu icke fattat någon åsigt öfver det organiska föreningsättet. Nya stödjepunkter därför erbjödos dessutom ytterligare, t. ex. genom MITSCHERLICHs sätt att betrakta den vattenhaltiga benzoë-syran såsom sammansatt af 2 at. kolsyra och 1 at. af ett af honom

nom ur denna syra afskildt kolbundet väte, som han kallade benzin, = $2\text{C} + \text{C}^{\text{H}}\text{H}^2$.

Förhandlingarne om eterarternas sammansättning, särdeles de förträffliga undersökningar derom, som dels utfördes, dels leddes, af DUMAS, hvilken vidhöll GAY-LUSSACS åsigt, gåfvo ett tillfälle, att jemföra de båda sätten att betrakta organiska syrehaltiga ämnen, nemligen antingen såsom oxider af en sammansatt radikal, eller såsom föreningar emellan binära kroppar, hvilket jag begagnade i den af mig till K. Vet. Akademien den 31 Mars 1833 afgifna Årsberättelsen om kemiens framsteg (s. 189—201), och visade deri, att alla föreningar af eter med syror och saltbildare fullt lika väl, tilläfsventyrs ännu bättre, öfverensstämma med den åsikten att eteren är oxiden af en sammansatt radikal, och att denna oxid, likasom de oorganiska, är förenbar med vattenfria syror, så väl af organiskt, som oorganiskt ursprung, och att, genom vätesyrors inverkan derpå, syrans väte reducerar radikalen, som förenas med saltbildaren, under afskiljande af vatten, till en eterart, hvilken förhåller sig till de med syre-syror bildade, såsom ett haloidsalt till ett syresalt. Jag anmärkte att de ännu okända föreningarna af denna radikal med svafvel och selen otvifvelaktigt borde finnas, och desse blefvo några år sednare upptäckte.

Denna framställning tillvann sig någon uppmärksamhet. Den omfattades af LIEBIG, som åt radikalen gaf det namn af *Etyl*, som den sedan fått behålla. Men den bestreds i början af DUMAS. Den deröfver emellan honom och LIEBIG förda utväxlingen af olika meningar, föranledde likväl snart DUMAS att förena sig med LIEBIG om den mening, att syrehaltiga organiska ämnen äro oxi-

der af sammansatta radikaler. Deras gemensamma åsigt deraf framlades för Vetenskaps-Akademien i Paris, d. 23 Oct. 1837 i en Note: *Sur l'état actuel de la Chemie organique*, författad af DUMAS i bådas gemensamma namn.

DUMAS framlägger deri den frågan: Huru kan man, från lagarna i den oorganiska kemien, uppställa de sig emellan så olikt beskaffade ämnen, som man ur organiserade kroppar erhåller, och som nästan alla bestå af kol, väte och syre, hvar till någon gång kommer också qväfve?

För att ingenting förlora af det lefvande i framställningssättet, skall jag här meddela hans svar derpå i ordagrann öfversättning:

"Deri ligger en stor och skön fråga för filosofien öfver naturen, en fråga hvars lösning väl kan ägga kemisterna till den högsta grad af täflan; ty en gång löst, vore den för vetenskapen ett löfte om de skönaste triumfer. Mysterierna, så af vegetationen, som af djurlifvet, skulle afslöja sig för våra ögon, nyckeln skulle gifvas till alla dessa skyndsamma, ofta ögonblickliga, förundransvärda modifikationer, som föregå hos djur och vexter, och, ännu mer, vi skulle finna utvägar att eftergöra dem i våra laboratorier."

"Nå väl! vi frukta ej att uttala, och det är från vår sida icke ett lättsinnigt uttalande, att denna stora sköna fråga är i dag löst. Det återstår endast att utveckla alla foljderna af dess lösning."

"För att, med tre eller fyra grundämnen, frambringa lika så skiljaktiga, eller kanske ännu mer varierade föreningar, än i den oorganiska kemien, tagen i sin helhet, har naturen valt en lika så enkel, som oförväntad utväg, ty den frambringar af de enkla grundämnena föreningar, som

äga alla egenskaper af grundämnena. Det är vår öfvertygelse, att deri ligger hela den organiska naturens hemlighet."

"Den organiska kemien äger således sina egna elementer, som spela än en likartad role med syret eller chloren, än i motsatt riktning rolen af metaller. Cyan, amid, benzoyl, radikalerna till ammoniak, till de feta syrorna, till alkohol och dermed likartade kroppar, utgöra de elementer på hvilka den organiska kemien opererar, men den opererar icke på de enkla grundämnena, kol, väte, kväfve och syre, hvilka icke förete sig såsom sådana, förr än alla spår af organiskt ursprung försvunnit."

"För oss omfattar den oorganiska kemien alla kroppar, som härleda sig från de enkla grundämnenas föreningar sig emellan, och den organiska kemien bör innefatta alla sådana ämnen, som bildas af sammansatta kroppar, hvilka spela grundämnens role."

"I mineralkemien äro radikalerna enkla, i den organiska äro de sammansatta, detta utgör hela skilnaden. De lagar hvaraf föreningarne bero, äro i båda desamma."

"Så som vi uppfatta den organiska kemien, företer den radikaler, som spela lika role med metaller och ännu andra, som spela rolen af syre, svafvel, chlor m. fl. Dessa radikaler förenas sig emellan, eller med grundämnena, efter de enklaste lagar för den oorganiska kemien, och gifva därigenom upphof åt alla organiska föreningar."

DUMAS tillägger i fortsättningen den uppenbara historiska oriktigheten, att han och LIEBIG i 10 års tid, hvarje dag varit sysselsatt med bemödanden att upptäcka och studera dessa radikaler.

DUMAS har, så vidt mig är bekant, sedermera af dessa åsikter aldrig gjort någon tillämpning; LIEBIG har likväl vidhållit dem och hans organiska kemi begynner med dessa ord: *Den organiska kemien är de sammansatta radikalernas kemi.*

Båda desse kemister företogo, hvar på sitt sätt och samtidigt med framställandet af den nu anförda åsikten, ett försök att theoretiskt förklara de förluster af vatten, som vattenfria dubbelsalter af vinsyrad antimonoxid med andra baser lida vid upphettning till $+ 200^{\circ}$, hvarvid deras förklaringar likväl gjordes på ett sätt, som synes visa, att ingendera tänkt på de i det anförda så varmt förordade lärosatserna.

Någon tid, innan förklaringen om organiska radikaler afgafs, hade DUMAS begynt en närmare undersökning af ett af GAY-LUSSAC upptäckt faktum, att vax, lemnadt i vattenfri chlorgas, förbyter denne efter hand till saltsyregas, utan att gasens volum ändras, hvaraf följde att vaxet mistat väte och upptagit chlor, i ett sådant förhållande att båda i gasform intaga lika volumer.

DUMAS insåg hela vigten af detta fenomen för läran om den organiska sammansättningen, och begynte studera lagarna derför. Han ådagalade dervid, att i det större antalet af organiska ämnen, som behandlas med chlor eller brom, sker ett utbyte af väte mot saltbildaren, i de vanligaste fallen, till lika equivalenter af de mot hvarandra utbytta grundämnena. Detta gaf anledning till en theoretisk framställning af detta fenomen, hvilken han kallade *substitutionstheori*, och der det vanligare fallet, att de mot hvarandra utbytta grundämnenas equivalenter äro lika, fick namn af *Metalepsi*. Han visade dervid, att

organiska ämnen, hvori en eller flera eqvalenter väte blifvit utbytte mot ett lika antal eqvalenter chlor eller brom, hafva bibehållit sin mättningskapacitet och flera kemiska egenskaper, till och med i många fall lät det ådagalägga sig att kristallformen var oförändrad bibehållen. Deraf ledde han sig då till den slutsats, att *saltbildaren i den nya föreningen spelar samma role som vätet i den primitiva*, och sedan han upptäckt och analyserat chlorättiksyran (chloroxalsyran) ansåg han derigenom denna åsigt så betryggad, att en alldeles ny theori för den organiska sammansättningen kunde derpå byggas. Då i den electrokemiska theorien chloren är ett af de starkast electronegativa grundämnena, men vätet deremot electropositift, och då, efter hans nu fattade åsigt, det ena af dessa grundämnen kunde i en kemisk förening spela samma role, som det andra, så slöt DUMAS deraf att de electrokemiska åsigtarna sakna tillräcklig grund, för att användas i vetenskapens theori, och fastställde, med anledning deraf, att den role ett grundämne spelar i den organiska sammansättningen, icke beror på grundämnets ursprungliga egenskaper, utan af det ställe der det blifvit placeradt i föreningen, hvarigenom således chlor, eller hvilket annat grundämne som helst, placeradt i vätets ställe, måste spela samma role som vätet.

Detta föranledde nu att öfvergifva åsigten om de organiska radikalerna, hvilka han likväl, efter det varma försvaret af deras tillvaro, undvek att öppet bestrida, men han jemförde dem icke nu mera med enkla grundämnena, utan med koloxid, svafvelsyrlighet, kväfoxid och med den så kallade undersalpetersyran, \ddot{N} . Han föreställde sig nu den organiska sammansättningen på ett

helt annat sätt. Grundämnena i den organiska naturen förenas, tre eller flera, till egna *typer*, och i dessa typer äro atomerna, för hvar och en särskildt typ, ordnade på ett bestämdt sätt, lika i alla kroppar som höra till samma typ, hvarvid föreningens karakterer på det sätt bero af ordningen i den sammansatta atomen, att det kan vara likgiltigt hvilket det grundämne är, som intager den bestämda platsen. Derigenom blef då substitutionens möjlighet utsträckt vida längre än till vätet och saltbildarne "Substitutionslagen," säger han, "tillåter förutseendet af alla elementers uttagande och ersättande af andra, hvarvid grundämnena kunna substitueras af sammansatta kroppar, så att icke allenast syre, utan också cyan, koloxid, svafvelsyrlighet, qväfoxid, undersalpetersyra, amid eller andra sammansatta kroppar, kunna mellankomma såsom grundämnena, hvilka intaga vätets plats och gifva upphof åt nya kroppar."

Grundbegreppen om dessa typer har DUMAS ej lyckats att rätt klart framställa. Han har dem af två slag, *kemiska typer* och *mekaniska* eller *moleculartyper*.

Jag skall anförä hans egna ord:

"1. Erfarenheten visar att en kropp kan förlora ett af sina grundämnena och i dess ställe upptaga ett annat, equivalent för equivalent, detta är substitutions-theoriens allmänna factum."

"2. När detta sker kan man antaga, att dess molecul alltid förblifver oförändrad, bildande en grupp, i hvilken det ena grundämnet helt enkelt intager det rum, som förut intogs af det andra. Den konstituerar då i mina ögon en *naturlig familj*."

"3. Bland de kroppar, som bildas genom substitution, behåller en stor del påtagligt samma

kemiska karakterer, såsom syra eller basis, till lika grad som före förändringen genom substitution. Det är dessa jag betraktar såsom utgörande samma *kemiska typ*, eller för att tala naturhistoriens språk, de höra till samma genus."

Den kemiska typen företer således, efter DUMAS's åsigt, ett slags naturhistoriskt genus af föreningar, som alla öfverensstämma deri, att de innehålla ett lika antal equivalenter, förenade på samma sätt och äga samma grundegenskaper.

Här äro således tre generiska karakterer. Den *första*, eller antalet af equivalenter, är ganska lätt att från atomvigten säkert bestämma. Den *andra* deremot, eller föreningen på samma sätt, saknar alla grunder för ett bedömande huruvida det inträffar eller ej, så vida det ej låter igenkänna sig af föreningarnes isomorfi. Det är således ett öppet fält, lemnadt åt det individuella godtycket att antaga eller icke antaga de enkla atomernas förening på samma sätt. Hvad den *tredje* beträffar, så syntes DUMAS ursprungligen hafva betraktat de kemiska egenskaperna hos en genom substitution uppkommen kropp såsom så föga förändrade, hvarpå han också citerade ättiksyran och chlorättiksyran såsom bevis, att han dermed i början torde hafva menat en allmän öfverensstämmelse i kemiska karakterer, men då invändningar emot riktigheten af denna öfverensstämmelse gjordes, förklarade han att med *grundegenskaper* förstods den omständigheten, att då de underkastades en lika sönderdelningsmetod, så skulle sönderdelningsprodukterna blifva, sig emellan, af samma kemiska typ, hvilket han upplyste med följande exempel: då ättiksyradt kali blandas med kalihydrat och *underkastas torr destillation*, så utvecklas kolbundet väte i minimum, $C H_4$, och då

chloroxalsyradt kali kokas med en stark lut af caustiskt kali, så bildas formylsuperchlorid, $C^2H^2Cl^3$. Här är väl sönderdelningsmetoden ganska olika, ty chloroxalsyradt kali ger, i torr destillation med kalihydrat, chlorkalium, kol, kolsyradt alkali och kolbundet väte, då det ättiksyrade delas i kolsyra och kolbundet väte, och dessutom sönderdelas icke detta i kokning med kalilut; men sådant var det exempel af meningen med grundegenskaper, som af DUMAS gafs. För att nu få det i minimum kolbundna vätet, CH^4 , att vara af lika kemisk typ med formylsuperchloriden, antog han att det förras atom utgöres af C^2H^6 , och att i den sednare, $C^2H^2Cl^6$, chloren spelar samma role som vätet, eller att i den förra 6 at. väte äro placerade såsom de 6 at. chlor i den sednare. Att detta icke är annat än ett fantasispel, torde knappt behöfva tilläggas.

För att gifva ett begrepp om den sammansättningsåsiqt, som af denna theori följer, skall jag anföra ett af DUMAS anfördt exempel på den kemiska typ, hvartill bittermandeloljan hörer, framställt i de till denna theori hörande kemiska formler, i hvilka de grundämnen, som spela samma role, ställas under hvarandra i linie uppifrån ned.

Bittermandelolja $C^6H^6O^2$.

Benzoe-biaci-chlorid $C^6\overset{H^6}{Cl}O^2$.

Benzoesyra $C^6\overset{H^6}{O}O^2$.

Benzoe-biaci-sulfid $C^6\overset{H^6}{S}O^2$.

Benzoesyrans amid $C^6\overset{H^6}{NH}O^2$.

I dessa hvarandra så olikartade föreningar, hvilkas rationella sammansättning det här använda namnet uttrycker, antages icke allenast chlor, utan ock svafvel och syre att spela samma role,

som vätet, och äro foljaktligen antagna att vara placerade så, som en equivalent väte sitter i bittermandeloljan, såsom förebild. Det femte exemplet har den särdeles stora märkvärdigheten, att samma rum, som i bittermandeloljan anses hafva varit fylldt af 1 equivalent väte, är der tillräckligt, icke endast åt 2 equivalenter väte, utan, ännu derutöfver, åt en equivalent kväfve. Den mekaniska omöjligheten är i denna teori intet hinder, och metalepsiens anhängare göra derföre ingen svårighet i att låta en equivalent väte substitueras af 4 atomer eller equivalenter syre och en equivalent kväfve, eller af två atomer syre och en atom svafvel.

Det är således den lättast användbara af alla teorier och det bör derföre icke väcka förvåning, att den, i detta ögonblick, är för organiska föreningar den allmännast begagnade, hvartill dess upphofsmans välsförtjenta ryktbarhet i annan väg väl också hufvudsakligt bidragit. Hans afhandlingar hafva som oftast, sedan denna teori publicerades, burit titeln af *Mémoires sur les types chimiques*.

Mycket mera skulle visserligen vara att här ännu anföra ur denna teori, men det anförda är tillräckligt att gifva ett begrepp om den metaleptiska typteoriens sätt att betrakta den rationella sammansättningen i den organiska kemien.

Samtidigt med DUMAS har LAURENT bearbetat och varierat detta föreställningssätt i oändlighet. Den ovanliga mängd af nya föreningar han, under sina verkliga förträffliga forskningar, lyckats frambringa, har beredt honom ymniga ämnen att derpå, före någon annan, försöka sina åsigter, och då de endast i denna drägt blifvit framställda och hans nomenklatur helt och hållet derefter

blifvit uppgjörd, har hans sätt, att se sammansättningens art, nästan blifvit trugadt på kemisterna och med den framgång att, ehuru han tidsats funnit sig nödsakad att ombyta föreställningssätt, han dock försökt att, efter sina åsikter af den organiska sammansättningen, ombilda åsikten af den oorganiska. Grundbegreppet i hans tankebilder är dock i full likartighet med DUMAS's, nemligen typer och metalepsi.

Samma kemiska thema har äfven GERHARDT varierat i ett arbete öfver den organiska kemien, hvori han icke efterger någon föregångare i användandet af fantasibilder såsom rationella sammansättningsåsikter.

PERSOZ har utgått från den grundsats, att sådana kroppar, som bestå af kol och väte med syre, egentligen äro att betrakta såsom kolbundet väte, hvori väteequivalenter blifvit metaleptiskt ersatta af ett lika antal atomer koloxid, och att en sådan förening sedan kan förbindas med kolsyra. Det är, såsom man ser, läran om sammansättning af binära föreningar, till hvilken substitutionstheorien är lämpad. Så t. ex. om alkoholn empiriskt består af $C^1H^6O^2$, så blir dess rationella formel, efter PERSOZ, $= C^2\frac{H^4}{CO^2}$, d. ä. två equivalenter väte, i formeln C^1H^6 , äro utbytta emot 2 at. koloxid. Ättiksyran deremot, hvars empiriska formel är $C^1H^2O^2$, härstammar från C^2H^4 , hvori en equivalent väte är utbytt mot en atom koloxid, $C^2\frac{H^3}{CO}$, och denna kropp är sedan förenad med 1 at. kolsyra $= C^2\frac{H^3}{CO} + CO^2$.

LÖWIG föreställer sig, i den organiska sammansättningen, vissa grundföreningar af kol och väte, eller af dessa båda med syre, hvilka sedan kunna förenas med koloxid, med kolsyra, eller

med båda på en gång. Så till ex. är, efter honom, formylsyrans rationella formel $\text{CHO} + \dot{\text{C}}$, tartrylsyrans $2\text{CHO} + \dot{\text{C}} + \ddot{\text{C}}$. Citronsyrans är $\text{C}^{\text{H}}\text{O} + \dot{\text{C}} + \ddot{\text{C}}$ och den dermed isomera äpplesyrans $\text{C}^{\text{H}} + 2\ddot{\text{C}}$.

GRAHAM antager att de enkla atomerna af hvart och ett grundämne sig emellan förenas efter vissa typer, af ett bestämdt antal atomer i en oföränderlig och bestämd ordning. När grundämnena förenas, så utvexlas atomer ur typerna, genom ett slags dubbel dekomposition, och organiska föreningar uppkomma, då ur kolets typ kolatomer utvexlas emot atomer af väte, qväfve och syre ur dessas typer, som i stället antaga kolatomer.

Det är uppenbart att på detta sätt hvar och en som företager sig ett försök öfver den rationella sammansättningen i den organiska kemien, och som icke finner sig belåten med någon föregångares, skapar eller diktar en ny åsigt, och det gifves intet skäl hvarföre detta skulle finna en gräns, så länge man ej bryr sig om något rättesnöre för sättet att härvid gå till väga.

Jag har anført att vi, i lagarna för grundämnenas foreningar i den oorganiska naturen, hafva ett sådant rättesnöre. Men dervid händer oftast att vi, äfven med det riktiga ledbandets tillhjälp, icke kunna komma till klara begrepp. Då måste vi nöja oss med den empiriska sammansättningen och uppskjuta utvecklingen af den rationella, till dess våra kunskaper mognat tillräckligt för att ådagalägga den. När detta inträffat, inses den genast af alla och igenkännes för den rätta. Att intill dess fylla vetenskapen med fantasispel, är att gå vilse, i stället för att gå längre fram.

Hvilka åsikter af den rationella organiska sammansättningen kunna anses öfverensstämma med förningslagarna i den oorganiska naturen? är en fråga som jag nu skall försöka att besvara.

Idéen om sammansatta radikaler och om deras föreningar med syre, svafvel, saltbildare m. fl. instämmer, såsom jag redan i det föregående visat, bäst med den ledning för omdömet vi kunna hemta från den oorganiska naturen. Det är här icke min mening att utveckla denna idé. Detta har långt för detta skett och jag hänvisar derföre, i afseende derå, till 5:te Tyska uppl. af min Lärbok i kemien, Del. I, s. 672 och följande.

Men denna idé, äfven förutsatt att den är riktig, såsom ock försöken deröfver synas ådaga-lägga, är så långt ifrån att för oss afslöja den lefvande naturens hemligheter, såsom DUMAS derom förmodat, att den, rörande dem, upptäcker alldeles intet. Också är antalet af de samman-satta radikaler, som vi hittills lyckats någorlunda säkert lära känna, ytterst ringa.

Om vi, i hvar och en förening af kol och väte, eller af kol, qväfve och väte, med syre, ville betrakta för en gifven radikal, hvad som icke är syre, så skulle vi deraf ledas till fullt så irriga begrepp, som om vi i formyloxid-svafvel-syra (MELSEN'S Acide sulfacétique) ville betrakta för syrans radikal allt hvad som icke är syre. Svafvelsyra är nemligen deri på ett alldeles eget sätt förenad, eller hvad vi kalla kopplad, med formyloxid, som följer syran i alla dess föreningar med baser. Jag har redan i den nyss citerade upplagan af min Lärbok, D. I, s. 459, dit jag hänvisar, anført de theoretiska åsikterna om detta slag af föreningar. Det inträffar allmänt,
och

och vi hafva alltid anledning att förmoda det, så ofta antalet af syrets atomer i en sammansatt atom öfverstiger 7, utan att dock deraf följer att icke koppling äfven kan äga rum när antalet af syrets atomer är lägre än detta tal. Så länge den ene af de genom koppling förenade kropparna är en oorganisk oxid, är det ingen svårighet att igenkänna en kopplad förening för hvad den är, och att lära känna kopplingens sammansättning. Men då både den kemiskt verksamma oxiden och kopplingen äro af organisk sammansättning och innehålla samma grundämnen, så leder analysen icke till det ringaste begreppderom, och förhållandet måste på andra vägar utrönas. Men sådana utvägar äro ytterst sällsamma att påträffa, så att vi hafva ganska få exempel, der något sådant lyckats, men de vi hafva äro alltid tillräckliga för att visa att föreningsarten finnes.

När vi lemna uppmärksamhet åt det redan bekanta stora antalet af kopplade svafvelsyror och erfara att antalet af organiska ämnen, som icke med svafvelsyra frambringa sådana, är ganska inskränkt; när vi finna att salpetersyra, fosforsyra och till och med syror af chloren, ingå kopplade föreningar, så visar det sig, att detta föreningssätt, om det ock ganska sent blifvit riktigt uppfattadt, icke dess mindre är allmänt förefallande och det synes i den organiska naturens verkstäder mycket allmänna bildas, än i den oorganiska kemien, så att det större antalet organiska ämnen kan utgöras af kopplade föreningar, hvilket det sällan lyckas oss att genom de så förenade kropparnes åtskiljande upptäcka. Vi få endast bekantskap med den kopplade föreningen,

och måste nöja oss med att betrakta den såsom en egen, bestämd kropp.

Vi hafva i den oorganiska kemien erfarit att föreningskraften emellan den kemiskt verksamma oxiden och dess koppling är ganska olika, stundom åtskiljas de af ringa inflytelser, stundom åter är föreningen så stark, att den endast genom endera kroppens förstöring kan upphävas. Den verksamma oxidens syre kan utbytas mot svafvel, mot chlor m. fl. och kopplingen följer radikalen ur den ena föreningen i den andra. Den kopplade föreningen af platinachlorur med elayl, kan sönderdelas med kalihydrat, hvarvid kopplingen följer platinan i platinaoxidulen; den kan sönderdelas med zink och platinan afskiljes ännu kopplad med elayl. Inträffa nu lika intima föreningar emellan en koppling och en sammansatt radikal, så inser man lätt huru omöjligt det blir, att utreda ett sådant förhållande.

Den stora svårigheten att, för bedömande af organiska ämnens rationella sammansättning, använda begreppet om sammansatta radikaler, ligger således i att bedöma när man har med en enda organisk oxid att göra, eller när den är kopplad. I förra fallet är det ganska lätt att få ett begrepp om radikalen, i det sednare är det icke möjligt, ty den verksamma oxiden har sin radikal och kopplingen har sin, och när kopplingen är en förening af två, så har hvar och en af dessa sin radikal. Man inser deraf klart, att begreppet om sammansatta radikaler kan vara ganska riktigt, och dock under sådana förhållanden icke användbart, förr än kunskap erhållits, så väl om den verksamma oxidens som kopplingens sammansättning. Der denna kunskap är oåtkomlig, och detta inträffar i de talrikaste fal-

len, måste vi, såsom jag redan erinrat, empiriskt betrakta det organiska ämnet, såsom ett enda helt.

Antalet af sammansatta radikaler torde tilläfventyrs icke vara så serdeles stort. Det är möjligt, att den oändliga mångfalden betingas af variationer i kopplade föreningar. Vi hafva närmare etthundrade svafvelsyror, som åtskiljas endast genom olika kopplingar.

Jag har nämnt, att när syrets atomer i en organisk atom öfverstiger 7, vi anse oss hafva skäl till den misstanken, att föreningen hör till de kopplade, i hvilka, genom de sammanhopade oxidernas hoplagda syrehalt, atomtalet hos syret stundom kan gå temligen högt. Det händer med dessa föreningar någon gång att syrehalten deri kan minskas eller ökas. Men då detta sker blott med en af de förbundna oxiderna, så blir denna förändring endast ett ringa bråk af syrehalten i dem alla sammantagna, och svarar ej till de multipla förhållanden, som vi i den oorganiska naturen äro vana att finna; dock är det klart, att den skulle svara deremot, om den kunde beräknas efter den oxid, som den tillhör. Så till ex. innehåller protein 10 atomer syre, men syrehalten kan deri ökas med 2 och med 3 atomer syre till 12 och 13 atomer, i bi- och trioxyprotein. Det är klart att dessa ovanligt små tillskott af syre för oss utpeka en kopplad föreningsart, hvartillökningen i syrehalt gäller endast *en* och tilläfventyrs den kemiskt verksamma oxiden.

Vi hafva af oxaminsyran sett att till antalet af de kroppar, som kunna blifva kopplingar, höra äfven amider. Af FEHLINGS försök öfver bernstenssyran har visat sig, att denna syra ger en lika beskaffad med succinamid kopplad bernstenssyra, och LAURENTS försök ådagalägga att dylika med

amid kopplade syror bildas af vinsyra, mjölksyra, kamfersyra, phtalinsyra. Dessa exempel hafva på en gång, från ett enda, förökats sig till många. Det är deraf klart, att detta förenings-sätt måtte vara allmännare än vi hittills haft skäl att förmoda. Men deraf invecklas läran om ternära radikaler, hvori äfven qväfve ingår, på ett sätt, som kan blifva omöjligt att utreda. Så länge amiden utgöres af en lägre oxidationsgrad af en syra, förenad med NH^2 , så är förhållandet lätt att upptäcka, derigenom att syror och alkalier förvandla amiden till ammoniak eller ammoniumoxid, genom den dermed förenade oxidens syrsättning på vattnets bekostnad till syra; men om äfven amider af annan art, der en sådan högre syrsättning af oxiden ej äger rum och der amiden således ej kan förvandlas till ammoniak, blifva kopplingar åt organiska oxider, qväfhaltiga eller icke qväfhaltiga, så låter detta icke på den anförda utvägen upptäcka sig.

Af allt det nu anförda är det således klart, att, om än åsigten rörande sammansatta radikaler är alldeles riktig, så fordras dock att mycket hittills obekant skall upptäckas, innan vi kunna göra någon tillförlitlig tillämpning af denna åsigt och bestämdt göra skilnad emellan föreningen af syre med en sammansatt radikal och en kopplad oxid. Vår rationella insigt inskränker sig till att hafva lyckats ådagalägga, att sammansatta radikaler gifvas, samt att dessas föreningar med syre, svaflvel, saltbildare m. fl. hafva en stor och allmän benägenhet att ingå kopplade föreningar, hvori det ena af de så förenade ämnena behåller sin kemiska verksamhet, under det att det andra, i de flesta fall, har alldeles förlorat den.

I hvilket förhållande stå substitutions-fenomenen till dessa åsigt? är en fråga, som ovillkorligt framställer sig, i följd af hvad jag nu anført.

Det är klart, att om en kopplad förening träffas af chlor eller brom, och en utväxling äger rum, denna icke kan ske liktidigt i kopplingen och i den kemiskt verksamma oxiden. Men derigenom uppkommer då en helt annan åsigt af saken, än den metaleptiska teorien föranleder. Det torde icke böra anses såsom blott en lös gissning, om man förmodar, att det dervid är kopplingen som först af saltbildaren förändras, då jag med klara exempel skall styrka, att en koppling kan på detta sätt förändras af en saltbildare, utan att derföre upphöra att vara koppling åt den kemiskt verksamma oxiden, som, i fall denne är en syra, behåller sina egenskaper af syra, och bildar salter, med de mer eller mindre anmärkningsvärda förändringar i egenskaper, som af kopplingens förändrade sammansättning uppkomma, hvaraf sagan om kemiska typer uppkommit. Detta hindrar emedlertid icke att äfven slutligen den kemiskt verksamma oxiden kan af chloren förändras, men då uppkommer en förening af helt annan art, i hvilken den kemiskt verksamma oxidens egenskaper icke mera återfinnas.

Dessa substitutioner hafva aldrig blifvit theoretiskt behandlade af andra än metalepsiens anhängare, och man kan säga, att nästan hvar och en som företagit ett försök i denna väg, genast blifvit denna theoretiska åsigt tillgifven. Det kan här vara stället att betrakta detta fenomen från andra synpunkter, i hvilket afseende jag skall anföra några exempel.

1. Då bittermandelolja eller pikramyl-bioxid, $C^6H^8 + 2O$, behandlas med chlor, utbytes en eqvi-

valent väte mot en equivalent chlor. Dervid bildas den kropp, som, vid dess första upptäckt, fick namn af chlorbenzoyl. I den metaleptiska teorien betraktas den, enligt hvad i det föregående blifvit anfördt, såsom en oförändrad typ $= C^{H^{10}}_{Cl^2}O^2$, och chloren spelar deri samma role och sitter på samma ställe som den förlorade väteequivalenten; men då den i alkohol behandlas med kalihydrat, så uppkommer chlorkalium och benzoesyra kali. Detta utvisar en helt annan sammansättningsart, den innehåller nemligen samma förening af kol med väte, som finnes i benzoësyran, förenad med 2 atomer syre och med en equivalent chlor. Motstycken dertill företes talrikt af oorganiska radikaler, t. ex. svafvet, chromen, wolframen, molybden. Men dessa föreningar bestå af två atomer vattenfri syra och en atom superchlorid, det samma måste och här vara händelsen, och chlorbenzoyl således vara Benzoyl-biaci-chlorid $= 2C^{H^{10}}O^2 + C^{H^{10}}Cl^2$. Här har således ingen substitution ägt rum, utan af 3 atomer pikramylbioxid hafva uppkommit 2 at. benzoësyra och 1 at. benzoylsuperchlorid, som ingått förening. Chloren har förstört den radikal som fanns och frambringat en annan, som håller lika många atomer kol, men en equivalent väte mindre. Förhållandet är uppenbart och öfversägligt.

2. Verkar chlor på en kopplad organisk syra, hvori kopplingen är ett kolbundet väte, som innehåller många atomer af hvardera elementet, så måste substitution utöfvas på vätet i kopplingen. Hvad som dervid uppkommer genom förändringen kan icke faktiskt ådagaläggas, men man kan inse de fall, som kunna inträffa, utan att derföre behöfva påstå eller yttra någon förmodan om hvilketdera som inträffat. a. Kopplingen kan

utgöras af flera atomer af det kolbundna vätet, och vid substitution kan en af dessa isender ut-
 vxla sitt väte mot chlor, hvarvid chlorkolet
 jemte det öfriga chlorbundna vätet qvarstannar i
 föreningen såsom koppling, till ex., låt kopplin-
 gen utgöras af 3 at. CH^3 . Om då en atom isen-
 der af CH^3 af chloren förvandlas till CCl^3 , d.
 ä. till oxalchlorid, så får man genom substitu-
 tion 3 syror, i hvilka sjelfva den sura kroppen
 är oförändradt densamma, men med 3 olika kopp-
 lingar, nemligen $\text{CCl}^3 + 2\text{CH}^3$, $2\text{CCl}^3 + \text{CH}^3$ och slut-
 ligen 3CCl^3 . b. Detta successiva utbyte af väte
 mot chlor kan dock ske äfven på annat sätt och
 med bildning af annorlunda beskaffad koppling,
 för hvilken förändringsart jag dessutom skall an-
 föra positiva bevis. Jag har, i den förut åbero-
 pade Lärboken i kemien, Del. 1, s. 709, anført,
 att ättiksyran möjligen kan vara en kopplad oxal-
 syra, hvari kopplingen är CH^3 . Jag tror icke att
 det ännu kan afgöras om så är; men låtom oss
 antaga detta fall såsom exempel. Om då ättiksyran
 är $\text{C} + \text{CH}^3$, och deri en equivalent väte utbytes
 emot en equivalent chlor, så har man CH^3Cl , detta
 är elaylchlorur och denne hörer till de kroppar,
 som bilda kopplingar åt syror. Utbytes ytter-
 ligare en equivalent väte mot chlor, så uppkom-
 mer CHCl^3 , formylsuperchlorur, såsom koppling åt
 oxalsyran, med ännu ett utbyte hafva vi ox-
 alchlorid CCl^3 , såsom syrans koppling, d. ä. ät-
 tiksyran är förvandlad till chloroxalsyra (*Acide*
chloracetique, DUMAS). Vid försöken öfver chlo-
 rens inverkan på ättiksyran, har man drifvit
 denna ända till fulländning, det är sålunda obe-
 kant om dessa mellangrader här gifvas. Men up-
 penbart är att de kunna gifvas, och om detta är
 fallet, är det lika uppenbart att ättiksyran är

en med CH^{P} kopplad oxalsyra. Gifvas de icke, så förbytes den del af ättiksyran, på hvilken chloren inverkar, genast i chloroxalsyra, som kan, såsom sådan, från den oförändrade ättiksyran afskiljas. Då uppkommer af chloren ingen substitution, utan en destruction af ättiksyran, och detta vore då ett skäl att anse den för en syra med sjelfständig radikal. c. Då kopplingen är oxid af en sjelfständig radikal, så uppkommer, genom utbyte af väte med chlor, en oxichlorur af en radikal med mindre väte, eller då allt väte är utbytt, en oxichlorur af kol. — Det är anmärkningsvärdt huru en kropp, hvilken en gång som koppling inträdt i en förening, kan genoingå den ena sammansättnings-förändringen efter den andra, med bibehållande af sin egenskap af koppling, hvarpå indigosvafvelsyran lemnar de talrikaste exemplen. Indigoblått, såsom koppling åt svafvelsyran, undergår deri sina talrika förvandlingar af saltbildare, salpetersyra, alkalier och reducerande inflytelser, utan att släppa sambandet med svafvelsyran.

Jag skall nu från den oorganiska kemien framlägga de positiva bevis för kopplingsförändringar, som jag i det föregående åberopat.

KOLBE, som nyligen fulländat en undersökning af kolsvafslans förvandlingar genom inverkan af chlor, har visat att den kropp, som af chlor eller kungsvatten bildas af kolsvafsla, består af kolsuperchlorid och svafvelsyrlighet, $\text{CCl}^{\text{P}} + \ddot{\text{S}}$. Det är ett slags kopplad förening af kolsuperchlorid med svafvelsyrlighet. Då kaustiskt kali får på denne inverka, utbytes en del af chloren mot syret ur kalit, och man får af 2 at. $\text{CCl}^{\text{P}} + \ddot{\text{S}}$, 1 at. chlorkalium och en atom af ett kalisalt, hvars syra består af oxalchlorid och 1 at. dithyonsyra, $= \text{CCl}^{\text{P}} + \ddot{\text{S}}$. Detta är en stark syra, som

kan afskiljas och erhållas kristalliserad, den kan kallas oxalchloriddithyonsyra, och är uppenbarligen en kopplad dithyonsyra, hvori kopplingen är densamma som i chloroxalsyran.

Om man i en upplösning af denna syra inlägger metallisk zink, så upplöses metallen utan all gasutveckling, och man får i vätskan två zinksalter upplösta. En atomvigt af syran upplöser 2 at. zink och lösningen innehåller 1 at. zinkchlorur och 1 at. af ett zinkoxidsalt, hvars syra består af $\text{CHCl} + \ddot{\text{S}}$. En equivalent chlor är af zinken borttagen, och det väte, som lösgjordes vid bildningen af en atom zinkoxid till syresyrans mättning, inträdde i dess ställe i kopplingen, som nu förbytes från oxalchlorid till formylsuperchlorur, utan att lemna sin plats såsom koppling. Denna substitution har gått i omvänd ordning, emot de förut omtalade, och dervid har i kopplingen bildat sig en sammansatt radikal, som deri förut icke fanns.

Om nu denna, eller den förut omtalade syran, lika godt hvilken, upplöst i vatten blandas med en atomvigt svafvelsyra och zink inlägges, så mättas syran med zink, utan att vätgas behöfver utvecklas; efter olika använd kopplad syra, blifva 3 eller 4 atomvichter zink upplösta, och man får i lösningen 1 eller 2 at. vichter zinkchlorur, 1 at. vigt svafvelsyrad zinkoxid och 1 at. vigt af ett nytt zinkoxidsalt, hvori blott en equivalent chlor återstår, hvars syra är $\text{C}^2\text{H}^1\text{Cl} + \ddot{\text{S}}$, det är en med elaylchlorur kopplad dityonsyra. Tillsättes, vid bildningen af detta salt, mer än en atom svafvelsyra, så låter dock icke derigenom elaylchloruren sönderdela sig, utan vätgas utvecklas vid zinkens lösning i det i öfverskott tillsatta af syran.

Men hvad den genom öfverskott af svafvelsyra uppväckta föreningskraften icke kan uträtta, det förmår den elektriska strömmen. KOLBE har visat, att om kalisaltet af endera af dessa tre kopplade dityonsyror i en koncentrerad lösning, emellan amalgamerade zinkplåtar, utsättes för genomgången af en elektrisk ström från t. ex. 2 till 3 par af den Bunsenska kolzinkapparaten, så bildas genom zinkens syrsättning basisk chlorzink och ingen vätgas utvecklas förr än hela chlorhalten i syran är utbytt emot väte, och man har då fått en fjerde kopplad dithyonsyra, $\text{CH}^+\text{S}^{\ddot{\text{S}}}$, hvori kopplingen har methylenens sammansättning. Det är samma kropp, som vi förslagsvis antogo innehållas i ättiksyran, om denna är en kopplad oxalsyra.

KOLBE har visat att chloroxalsyran kan på samma sätt återföras till ättiksyra och antydt mellangrader deri, hvilket det för vetenskapen vore af den största vikt att få med bestämdhet utredt.

Dessa enkla försök i hvilka den kemiskt verk-samma oorganiska oxiden är densamma i alla sy-rorna och således af den natur, att dess beståndsdelar icke inveckla frågan om de förändringar, som kopplingen undergår genom substitution, leda till följande säkra slutsatser:

1. En koppling kan, oaktadt total samman-sättningsförändring, behålla sin plats såsom koppling.

2. När kopplingen är ett chlorkol och chlo-ren partielt utbytes emot väte, uppkomma nya radikaler af kol och väte, hvilkas chlorur eller chlorid kvarstannar såsom koppling, och då all chloren utbytes, bildas ett kolbundet väte, som intager chlorföreningens plats såsom koppling.

Det är deraf klart att, när utbytet går i omvänd ordning, eller då väte utbytes mot chlor, så måste förhållandet på ett lika sätt bedömmas.

3. Den elektriska strömmens inflytande afgifver en möjlighet att uthyta chlor mot väte, och i detta fall bildas af vätet med kolet en radikal, hvori vätet väl intager chlorens plats, men spelar icke samma role som chloren. Dessa resultat af KOLBES försök fullända vederläggningen af de metaleptiska åsigterna och fantasi-spelet med kemiska typer.

Jag är långt ifrån att vilja påstå, att det nu anförda utgör förklaring af alla fall der väte empiriskt substitueras af en saltbildare. Det inre förloppet dervid och produkterna deraf kunna vara af mångfaldigt olika beskaffenhet. Det hittills begångna felet har just bestått deri, att man velat deråt gifva en förklaring, som skulle lika passa åt alla fall. Vi hafva till och med fall der underchlorsyrlighet och underbromsyrlighet synas utgöra beståndsdelar af produkten.

Jag är icke nog förmäten för att göra mig den förhoppning, att dessa åsikter af svårigheterna för ett riktigt bedömande af organiska ämnens rationella sammansättning, skola i någon mån vinna gehör hos metalepsiens anhängare. Desse omfatta sin teori med full öfvertygelse om dess ofelbarhet, och mot blind tro fäktar man fäfängt med skäl och bevis; men jag är icke utan hopp, att hvad jag här föredragit skall vinna någon uppmärksamhet hos det stora antal kemister, som i dessa frågor tills vidare funnit sig föranlättna att icke bestämma sig för någon viss åsigt.

Undersökning om Elektricitet i fördeladt och bundet tillstånd;

af

P. S. MUNCK AF ROSENSCHÖLD.

Till Akademien inlemnad den 11 Febr. 1846.

När en kropp icke yttrar några elektriska fenomen, eller med andra ord, icke är elektriserad, så eger den, enligt SYMMERS hypotes, lika stor mängd positiv och negativ elektricitet. Man behöfver likväl icke antaga, att båda elektriciteterna, till folje af en slags kemisk frändskap, skulle ingå en förening, hvarigenom deras attraherande och repellerande verkningar upphäfdes. Ty om man endast föreställer sig, att bådas utbredning i kroppens inre är densamma, så blifva verkningarne af den positiva elektriciteten, på en inom eller utom kroppen belägen punkt, noga upphäfda af den negativa elektricitetens verkningar på samma punkt. Då således, enligt denna åsigt, alla på en af kroppens elektriska punkter verkande krafter äro i jemnvigt, kan man anse punkten alldeles fri, och häraf förklaras lätt, hvarföre äfven den minsta utifrån verkande elektriska kraft kan upphäfva kroppens neutrala tillstånd. På denna omständighet beror den så kallade elektriska fördelningen. Om nemligen en ledare för elektriciteten föres i närheten af en elektriserad kropp, ehuru icke så nära, att öfvergång

af elektricitet genom luften blir möjlig, så börja dess elektriska moleculer att röra sig, hvilket icke upphör förr, än ett nytt jemnvigtstillstånd uppkommit. På detta sätt blir den lika utbredningen af ledarens naturliga förråd på positiv och negativ elektricitet mer eller mindre upphäfd, och den yttrar sjelf elektriska fenomen. Men så snart ledarens elektriska verkan utåt börjar blifva märkbar, verkar den tillbaka på den fördelande kroppen, och förändrar, om äfven denna är en ledare, dess elektriska tillstånd, hvaraf inses, att den fördelande verkan är ömsesidig, eller att båda ledarne verka fördelande på hvarandra.

Då en ledare är utsatt för elektrisk fördelning, måste man göra noga skillnad mellan dess *isolerade* och *icke isolerade* tillstånd. Är ledaren isolerad, kan ingen del af de genom sönderdelning af det elektriska noll uppkomna motsatta elektriciteterna bortgå, och båda utbreda sig till lika myckenhet på dess yta, och kunna här undersökas medelst profskifvan. Enligt erfarenheten samlar sig den elektricitet, hvilken är olikartad med den fördelande kroppens, isynnerhet på de delar af ledarens yta, som äro vända mot denna; den likartade deremot isynnerhet på den fränvända ytan. Båda elektriciteterna öfvergå småningom i hvarandra, och äro åtskilda genom en indifferent zon eller linea, hvarest det elektriska noll ännu eger rum. Med ledarens afstånd från den fördelande kroppen förändrar sig denna linea, äfvensom hela anordningen af de båda elektriciteterna, likväl är knappt möjligt, att med afseende härå, gifva några allmänna regler.

Vidröres den för den elektriska fördelningen utsatta ledaren, hvilken jag i korthet vill kalla den *fördelade*, afledande, så försvinner hos den-

samma hvarje spår af likartad elektricitet; den olikartade deremot vinner i styrka och breder sig vidare ut, likväl äro omständigheterna mycket olika och beroende af beröringens beskaffenhet. Egentligen bör man, då isolering icke eger rum, anse ledaren, jemte den afledande kroppen, eller underlaget hvarpå den står, som ett helt, som är utsatt för den fördelande verkan. Huru långt elektriciteten i detta fall utbreder sig öfver den ledande ytan är icke möjligt att undersöka, ty den aftager småningom och undgår slutligen våra mest sensibla instrumenter. I allmänhet är den i de delar af ytan, som äro vände från den fördelande kroppen, mycket svagare än i de åtvända delarne, ehuru skillnaden blir allt ringare vid tilltagande afstånd mellan båda kropparne. Ledarens återverkan på den fördelande kroppen är större i det icke isolerade än isolerade tillståndet, i hvilket de till lika myckenhet närvarande motsatta elektriciteterna till en del upphäfva hvarandras verkningar. Man inser likväl lätt, att i det sednare fallet måste verkan af den olikartade elektriciteten, i anseende till större närhet, öfverväga verkan af den likartade.

Hvad den fördelande kroppen själf beträffar, så böra äfven tvenne fall åtskiljas; man kan nemligen anse honom som ledare eller oledare. Elektriska fördelningen skall här betraktas från båda dessa synpunkter.

Jag antager först, att den fördelande kroppen är en fullkomlig oledare, oaktadt i verkligheten alla kroppar, åtminstone på ytan, äro mer eller mindre ledande. Emedan i detta fall kroppens oledande egenskap förhindrar de elektriska fluidas rörelse, så förändras icke dess elektriska tillstånd genom ledarens återverkan, och utbred-

ningen af den genom fördelning uppväckta elektriciteten i den isolerade ledaren, hvad form den må ega, är underkastad den enda lagen, att resultanten af ledarens elektriska moleculers attraherande och repellerande verkningar på hvilken som helst punkt i ledaren, håller jemvigt med resultanten af den oledande kroppens elektriska moleculers attraherande och repellerande verkningar på samma punkt. Är ledaren icke isolerad, så gäller samma lag, men i detta fall är den ledande massan obegränsad, och ju aflägsnare man tänker sig punkten, desto mera närma sig båda resultaten till noll. Förenas ledaren med jorden genom en lång och tunn metalltråd, som i jämförelse med ledaren blott har ringa yta, kan man likväl öfverse den ringa mängd elektricitet, som är samlad på densamma, och betrakta resultanten af ledarens elektriska verkningar enahanda med den sanna resultanten. Detta är isynnerhet tillåtet, då tråden vidrör ledaren på den yta, som är vänd från den fördelande kroppen, och föres så aflägsen som möjligt från denna sednare, ty under sådana omständigheter erhåller tråden ganska obetydlig mängd elektricitet genom fördelning. Om derföre tråden aflägsnas, så förändrar sig ledarens elektriska tillstånd derigenom endast omärkligt. Då härefter blir fråga om afledande vidröring, så förutsättas alltid, att den blifvit verkställd på nyss uppgifna sätt.

Jag antager nu, att en gifven mängd elektricitet blifvit meddelad den fördelade ledaren, sedan den afledande metalltråden blifvit aflägsnad, och föreställer mig densamma utbredd i kroppens inre. Enligt nyss anförda lag, äro verkningarne af den genom fördelning i ledaren uppväckta elektriciteten för alla punkter i densamma

i jämvigt med verkningarne af den fördelande kroppens elektricitet, och häraf följer, att man kan anse moleculerna af den elektricitet, som blifvit meddelad ledaren, hvarken underkastade attraction eller repulsion till följe af den i ledaren redan för handen varande elektriska kraften. Häraf är således klart, att dessa moleculer, endast följande sina egna fränstötande krafter, måste begifva sig till ytan af ledaren, och här anordna sig alldeles så, som vore ledaren förut icke elektriserad. I anseende till den fördelande kroppens oledande egenskap, förändras icke utbredningen af dess elektricitet genom den ledaren meddelta elektriciteten, och det den förra motverkande elektriska lager på ytan af ledaren kan anses bestå oförändradt. Häraf följer, att elektricitetens täthet i en gifven punkt på ytan af ledaren efter meddelningen, är algebraiska summan af den fördelade elektricitetens täthet före meddelningen, och den meddelade elektricitetens täthet i samma punkt, då den sednare utbreder sig i den isolerade och neutrala ledaren utom den fördelande elektricitetens verkningssfer. Är den ledaren meddelade electriciteten till myckenheten lika med den genom fördelning i denna uppväckta elektriciteten, till beskaffenhet deremot densamma motsatt, så blir ledarens elektriska tillstånd alldeles detsamma, som före den afledande vidröringen. Känner man således den fördelade elektricitetens utbredning i den icke isolerade ledaren, och utbredningen af en lika mängd elektricitet i ledaren, då fördelning icke eger rum, så kan man lätt beräkna elektricitetens täthet på ett gifvit ställe i den icke afledande vidrörda ledaren. Om t. ex. den fördelade ledaren är en kula, så blir genom den meddelta elektriciteten

hvert och ett ställes elektriska täthet lika mycket ökad eller minskad. För öfrigt begripes lätt, att *meddela* positiv elektricitet är det samma som *borttaga* negativ och tvertom.

Den af den fördelande och fördelta elektricitetens verkningar oafhängiga utbredningen af den meddelta elektriciteten i den fördelade ledaren, kan tilläfsventyrs ännu mera öfvertygande härledas från den statiska grundsatsen, att då ett system af krafter är i jemvigt, så rubbas denna icke, om ett annat system af krafter, som i och för sig är i jemvigt, tillägges det förra. Som förut är anmärkt, äro alla på en gifven punkt i det inre af den fördelade ledaren verkande elektriska krafter i jemvigt. Läger man således till det elektriska lagret på ytan af den fördelade ledaren i tankarne ett annat elektriskt lager, hvars verkningar på hvilken som helst punkt i ledarens inre för sig äro i jemvigt, så störes jemvigten icke, enligt nyss uppgifna grundsats. Om således en viss mängd elektricitet meddelas den fördelade ledaren, så måste den ordna sig på ytan alldeles på samma sätt, som i det icke fördelade tillståndet, annars vore jemvigt möjlig på mer än ett sätt.

Om den fördelande kroppen sjelf är en ledare, så är fördelningsprocessen mera sammanfatt. Här kommer nemligen återverkan af den i den fördelade ledaren uppväckta elektriciteten i betraktande, och elektriciteterna i båda ledarne anordna sig på ytorna enligt den lagen, att resultanten af alla elektriska krafterna, som verka på hvilken punkt som helst, icke allenast i den *fördelade*, utan äfven i den *fördelande* ledaren, är noll. Om i detta fall den fördelade ledarens elektriska tillstånd förändras, så förändrar sig genast

elektricitetens anordning i den fördelade. Meddelas den förre en gifven mängd elektricitet, så utbreder sig visserligen äfven denna på ytan oafhængigt af de redan för handen varande elektriska krafterna, men då den meddelade elektriciteten förändrar elektricitetens anordning i den fördelade ledaren, så förändras äfven det elektriska lager, som motverkar densamma i den fördelade, och den verkliga elektriska tätheten i ett gifvet ställe på den sednares yta efter meddelningen, kan icke bestämmas på förut uppgifna sätt. Likväl kan man återföra detta fall till det föregående, om man tänker sig den fördelade ledarens elektriska tillstånd oföränderligt, och då blir hvart och ett ställes elektriska täthet, i den fördelade ledarens yta, algebraiska summan af den elektriska tätheten efter den afledande vidröringen, och den afleda elektricitetens täthet, med afseende på samma ställe, då denne utbreder sig på ledaren utom den fördelade verkningsferen. Att jemvigt i denna händelse icke kan bestå, då till elektriciteten på ytan af den fördelade ledaren lägges en gifven mängd elektricitet, som der är utbredd på samma sätt, som i det icke fördelade tillståndet, är äfven klart deraf, att denna elektricitet endast är i jemvigt för punkterna i den fördelade ledaren, då deremot den fördelade och fördelta elektriciteten hålla hvarandra i jemvigt med afseende på punkterna i båda ledarne.

Af det föregående inses, att man kan anse elektriska lagret på ytan af den fördelade och isolerade ledaren, antingen denna före närmandet till den fördelade kroppen är elektriserad eller icke, såsom sammansatt af tvenne elektriska lager, hvaraf det ena är enahanda med det lager,

som kvarstår efter den afledande vidröringen, om den fördelande kroppens elektriska tillstånd tänkes oföränderligt, och hvilket för hvarje punkt i ledaren upphäver den fördelande elektricitetens verkan. Det andra lagret deremot är så beskaffadt, att det redan för sig icke åstadkommer någon verkan i ledarens inre. Den sednare elektriciteten, alldenstund den till följe af sina egna fränstötande krafter utbreder sig fritt på ledarens yta, och genast försvinner då isoleringen upphäves, vill jag kalla ledarens *fria* elektricitet; den förra deremot, som alltid är olikartad med den fördelande kroppens elektricitet, alldenstund den liksom är fängslad af denna sednare, och endast ofullkomligt kan afledas, vill jag kalla dess *bundna* elektricitet.

På detta sätt synas mig begreppen "fri och bunden elektricitet" vara så bestämda, att knappt någon tvetydighet mera kan uppstå. Egentligen att tala, existera de fria och bundna elektriciteterna i en isolerad och fördelad ledare endast i tankarne, ty i verkligheten blanda de sig med hvarandra, och försöken med profskifvan angifva blott den verkliga elektriska tätheten i ett gifvet ställe på ytan. Man kan alltid anse de båda ifrågavarande elektriciteterna uppkomna genom sönderdelning af det elektriska noll i tvenne lika stora och motsatta elektricitetsmängder. Låt e föreställa elektriciteten i en gifven punkt på ytan af den fördelade ledaren. Man tänke sig den fördelande kroppens elektriska tillstånd oföränderligt, och låt g vara den gifna punktens elektricitet, hvilken kvarstår efter den afledande vidröringen. Om man nu i tankarne sönderdelar det elektriska noll i de tvenne lika stora, men motsatta elektriciteterna g och $-g$, och lägger dessa

till den förra elektricitetsmängden e , liksom i mekaniken med krafter är vanligt, så blir punktens elektriska verkan tydligen densamma som förut. Antag $e - g = f$, så blir $e = f + g$. Här är f punktens fria och g dess bundna elektricitet. I själfva indifferenslinien har man således $f = -g$.

Om den isolerade ledaren före närmandet till den fördelande kroppen icke är elektriserad, så äro de fria och bundna elektriciteterna till myckenheten lika, men till beskaffenhet motsatta. Den fria elektriciteten tillhör likväl icke endast de aflägsnare delarne af ledaren, utan är utbredd öfver hela ytan. Genom afledande vidröring försvinner den helt och hållet. Man kan likväl förutse, att förhållandet i detta afseende måste vara annorlunda, när afledning sker genom luften, ty, då ingen utströmning af elektricitet eger rum, från röfva luftens ledande delar, på samma sätt som den isolerade profskifvan, utan åtskillnad elektricitet från de likartadt och olikartadt elektriserade ställena, och ledarens elektriska tillstånd kan derigenom föga förändras, så vida båda elektriciteterna äro närvarande till lika mängd. Äfven den bundna elektriciteten synes vara utbredd öfver ledarens hela yta, ty i annat fall borde väl efter den afledande vidröringen finnas en indifferens-linia, och utom denna likartad elektricitet, hvilket strider mot erfarenheten. Likväl är den bundna elektriciteten på vissa ställen af den frånvända ytan vanligen ganska svag, och knappt märkbar. De efter utseendet ganska invecklade fördelningsfenomenen, som ega rum då isolerade ledare underkastas fördelning, hafva alla sin grund i den ganska skiljaktiga utbredningen af de fria och bundna elektriciteterna på ytan. Det är intet tvifvel underkastadt, att den bundna elek-

triciteten, lika så väl som den fria, verkar attraherande och repellerande. Till och med propagationsförmågan saknar den icke uteslutande. Redan den omständigheten, att den samlar sig på ledarens yta bevisar, att den har en benägenhet att bortvika, och verkligen skall bortgå, om ej luftens motstånd hindrade detta. Den öfvergår äfven till en del i isolerade ledare och ledande delar af luften, likväl kan denna förlust icke komma i fråga, ty det förlorade ersättes genast genom sönderdelning af ledarens naturliga elektriciteter, eller i icke isolerade tillståndet genom tillledning från jorden.

Som förut är anmärkt, angifva försöken med profskifvan endast den verkliga elektriska tätheten i ett gifvet ställe af den fördelade ledarens yta. Men då den bundna elektriciteten i en viss del af den frånvända ytan vanligen är ganska svag, så måste profskifvan här anbragt temligen noga mäta ställets fria elektricitet. Förenas ledaren genom en tunn metalltråd med ett elektrooskop, som är så aflägsat, att det icke antager någon märkbar mängd bunden elektricitet, så angifver detsamma ledarens fria elektricitet, om denna isolerad närmas till den fördelande kroppen. Den kallas därför äfven elektrooskopisk kraft.

Om en fullkomlig oledare, elektriserad eller icke, föres i närheten af en elektriserad kropp, så förändras naturligtvis dess elektriska tillstånd icke; likväl kan man i tankarne företaga samma delning af ytans elektriska lager i det fria och bundna. Det bundna lagret, som för hvarje punkt i oledaren håller jemvigt med den fördelande elektriciteten, är enahanda med det lager, som efter den afledande vidröringen skulle qvarstå, om kroppen vore ledande. Den fria elektriciteten i

hvarje punkt af ytan är bestämd genom eqvationen $e=f+g$. Är oledaren icke elektriserad, blir öfverallt $e=0$, och $f=-g$, d. v. s. att de fria och bundna elektriciteterna äro i hvarje punkt lika stora, men motsatta, hvilket i sig är klart. I verkligheten synes likväl knappt någon kropp gifvas, hvars yta är till den grad oledande, att verkan af den fördelande elektriciteten är alldeles omärklig.

I enlighet med hvad förut är anmärkt, verkar den fördelade ledaren tillbaka på den fördelande kroppen, till och med då den isolerad och icke elektriserad närmas den sednare, och förändrar dess elektriska tillstånd om den är ledande. Elektriska lagret på ytan af den sednare sönderfaller således i det fria och bundna, om man anser den fördelade ledaren som den fördelande, och allt hvad förut i detta ämne blifvit yttradt, gäller äfven nu. Vidröres den egentligen fördelade ledaren, så binder den tillbaka ofta en betydlig del af den fördelande kroppens elektricitet, likväl kan denna återverkan aldrig gå derhän, att all elektricitet skulle bindas i denna sednare, och denna yttrar derföre i alla punkter af sin yta likartad elektricitet. Äro båda kropparne ledare, så minskas deras elektricitetsmängder småningom genom afvexlande vidröringar, ty hvars och ens öfverskott på fri elektricitet försvinner i jorden genom vidröringen.

Om de kroppar, hvilka verka fördelande på hvarandra äro tre till antalet, och alla äro ledare, så är för jemvigten nödvändigt, att resultatet af alla tre elektriska lagrens verknin-
gar på hvilken punkt som helst i det inre af hvar och en är noll. Efter omständigheterna kan man anse blott den ena af kropparne eller tvenne af

dem som fördelande. Egentligen är likväl hvar och en af dem underkastad de båda öfrigas fördelande verkan.

Kallar man de tre kropparne A, B, C , och antager att A och B äro oledande och elektriserade, deremot C ledande och neutral, så verka de båda förra fördelande på C , och den fördelade elektriciteten anordnar sig på dennas yta enligt den lagen, att den samfälda verkan af alla tre ytornas elektriska lager på en punkt i C är noll. På samma sätt som när kropparne äro två, kan äfven här bevisas, att den elektricitet som meddelas C , sedan den förut blifvit afledande vidrörd, utbreder sig på ytan oberoende af de elektriska lager, som redan finnas på kropparnes ytor, under det den genom fördelning i C uppkomna elektriciteten kan betraktas som oföränderlig. Den fria elektriciteten i C är således den, som genom afledande vidröring försvinner i jorden, och den bundna är den, som icke afledes. Det kan bevisas, att den i C bundna elektricitetsmängden är summan (algebraiska) af de elektricitetsmängder, som A och B hvar för sig binda i C . Ty om man antager, att B aflägsnas, under det C är förenad med jorden, så äro samtliga krafterna, som härröra från elektriska lagren i A och C , med inbegrepp af den ringa elektricitetsmängden i den afledande metalltråden, och verka på hvilken som helst punkt i C eller i tråden, i jemvigt. Återföres B till sitt förra ställe och A aflägsnas, så äro samtliga från elektriska lagren i B och C och den afledande metalltråden utgående och på samma punkter som förut verkande krafter i jemvigt. Läger man således dessa krafter till de föregående, eller hvad som är det samma,

samma, sammanlägger båda elektriska lagren, som *A* och *B* hvar för sig binda i *C* och i tråden, och tänker sig *A* återförd till sitt ställe, så måste tydligen jemvigt ännu ega rum, och ingen elektricitet kan gå bort genom metalltråden. Äro *A* och *B* ledare, så gäller föregående sats ännu, men endast för det elektriska tillstånd af *A* och *B*, som är en följd af deras ställning mot hvarandra och mot *C*, ty alla tre ledarne verka fördelande på hvarandra, och när endera af *A* eller *B* borttages, förändrar sig genast den qvarstående elektriska tillstånd, och den mängd elektricitet den binder i *C* förändrar sig äfven. Här är nemligen den bundna elektriciteten i *C* den, som icke skulle försvinna genom afledning, om elektriska tillståndet i *A* och *B* vore konstant.

Om *A* ensam är elektriserad, *B* och *C* deremot äro ledare, som isolerade och neutrala närmas densamma, så är den förre egentligen den fördelande kroppen, men då de sednare inverka på hvarandra och på *A*, så fördelas elektriciteten på deras yta annorlunda, än om hvar för sig vore utsatt för den fördelande verkan. Vidröres den ena *B* af de fördelade ledarne afledande, så försvinner all fri elektricitet, och den bundna, som är olikartad med elektriciteten i *A*, verkar ensam på *C* och försvagar ofta betydligt verkan af *A* på *C*. Vidröres sedan *C* afledande, så försvinner en del fri likartad elektricitet, och endast en viss mängd bunden olikartad blir qvar, hvilken är lika med skillnaden mellan de af *A* och *B* bundna elektriciteterna. Sedan all fri elektricitet i *C* blifvit aflägsnad, upphäfver den bundna till en betydligare del verkan af *A* på *B*, och en del af den här bundna elektriciteten blir fri. Vidröres *B* ånyo afledande, försvinner således en del

olikartad elektricitet, och den qvarblifvande binder mindre elektricitet i *C*. Om derföre *C* åter afledande vidröres, försvinner likartad elektricitet, och den olikartade bundna binder mera likartad elektricitet i *B*, och olikartad sättes i frihet. Genom afväxlande vidröringar af *B* och *C*, blir således i den förra olikartad och i den sednare likartad elektricitet satt i frihet. Om *C* först blifvit vidrörd, hade förhållandet varit omvänt.

Ett särskildt hit hörande fall förtjenar att närmare tagas i öfvervägande. Detta fall eger rum, då en af ledarne *B* står i förening med jorden, eller blott blifvit afledande vidrörd, under det den andra *C* är ställd bakom *B* på så sätt, att de rätliniga verkningarne af elektriska moleculerna i *A* på *C* alla gå genom *B*, eller som FECHNER uttrycker sig, då *C* står i elektriska skuggan af *B*. Här verka de motsatta elektriciteterna i *A* och *B* båda åt samma håll på *C*, nämligen den starkare i *A* på större, och den svagare i *B* på mindre afstånd. Det är derföre icke så lätt att inse, hvilken af båda verkningarne bör vara den öfvervägande. I sjelfva verket är också den fördelande verkan i *C* så svag, att den af flera alldeles blifvit nekad, eller tillskrifven andra orsaker. Redan sedan längre tid är bekant, att en laddad Leydnisk flaska vid yttre beläggningen, icke för nära den obelagda randen, antingen icke eller mycket svagt yttrar någon verkan på ett sensibelt elektrooskop. Man har deraf slutat, att den bundna elektriciteten på den utvändiga sidan har förlorat sina förra egenskaper, och hvarken verkar attraherande eller repellerande. Sedan denna åsigt genom OHMS och RIESS's försök syntes vederlagd, har KNOCHENHAUER (Pogg. Ann. B. XLVII s. 444) ånyo sökt försvara den

äldre meningen. Han utspände ett staniolblad öfver en elektriserad hartzkaka på olika afstånd och borttog dess fria elektricitet. Då han närmade denna apparat nedifrån mot tvenne på lintrådar upphängda flädermärghkuler, divergerade de icke vid något afstånd. Han slutar deraf: 1), att då två motsatta elektriciteter fullständigt binda hvarandra på ett gifvit afstånd, så förlora de all verkan utåt och stå endast i förhållande till hvarandra, hvilket isynnerhet yttrar sig som ömsesidig attraction; 2) att öfverskottet af fri elektricitet, som finnes på den ena sidan och verkar utåt, sträcker sin verkningsssfer till den andra ytan, hvar-est blott finnes bunden elektricitet, men ej öfver densamma. FECHNER har (Pogg. Ann. B. LI s. 321) underkastat ämnet en omständlig och noggrann pröfning, och påstår, i strid med KNOCHENHAUERS erfarenhet, att i ifrågavarande fall öfverväges verkan af den fördelade eller bundna elektriciteten af den fördelande. Sednare har äfven PETRINA (Pogg. Ann. B. LXI s. 116) uppträdt på detta fält. Han nekar visserligen icke riktigheten af FECHNERS försök, men tillskrifver verkan den genom fördelning elektriserade luften.

Sjelf har jag repeterat de förnämsta af FECHNERS försök med så öfverensstämmande resultat, att, hvad mig angår, icke något tvifvel om deras riktighet kan uppstå. Likväl bemärkte jag en omständighet, hvilken, om man icke är uppmärksam derpå, lätt skulle kunna missleda. Vid några af mina försök ställde jag nemligen en metallskärm vertikal på bordet, och på ringa afstånd derifrån en temligen starkt positivt laddad Leydnisk flaska, vid den höjd, att kulan var ungefär en tum lägre än skärmens öfra rand. Då sedan en guldbladelektrometer blef anbragt bakom skärmen till lika

höjd med flaskans kula, så divergerade guldbladet svagt med positiv elektricitet; men snart märkte jag, att de på en gång starkare åtskildes, och till och med slog an mot sidorna af glaset, och sedan ånyo divergerade. Divergensen förminskades icke, då elektrometern aflägsnades från skärmen och flaskan, hvaraf inses, att den blef elektriserad genom verklig meddelning. Meddelning egde ännu rum, då så väl flaskan som elektrometern ställdes betydligt lägre, ehuru närmare skärmen. Snart öfvertygade jag mig, att hela fenomenet berodde af dam, som fästade sig på kulan, och verkade som den finaste spets, ty genom flaskans vridning upphörde detsamma vanligen. Stundom voro damdelarne till och med synbara. En dylik meddelning i rätlinig riktning genom skärmen är likväl omöjlig, och man är därför tvungen att antaga, att flaskans elektricitet går i betydligt krokiga linier öfver skärmens rand till elektrometern. Man kan efter behag frambringa samma fenomen, om man fäster litet bomull på flaskans kula, och det är märkvärdigt att se, huru elektriciteten vid stark laddning på flera fots afstånd öfvergår till elektrometern. Men om man en stund fortsätter dessa försök, så erhåller luften i rummet en betydlig mängd elektricitet, och alla fördelningsförsök bli osäkra.

Oaktadt sist anförda försök bevisa, att luften icke alltid förhåller sig som passiv mellankropp vid fördelningsförsök, så kan jag likväl icke instämma i den meningen, att de svaga elektriska verkningar, som ega rum i elektriska skuggan, då de nemligen helt och hållet bero på fördelning, och försöken äro anställda med noggrannhet, skulle härröra från luftens elektriserande. PETRINA antager, om jag förstått honom rätt, att luften vid

gränsen af elektriska skuggan blir elektrisk genom fördelning, och derifrån utbreder den fördelande verkan i skuggan sjelf. Jag tillstår, att jag icke kan inse möjligheten af en sådan luftens inverkan. Luften, serdeles den torra, är en god ledare, och motstår elektriserade kroppars fördelande verkan; men antag äfven, att en sönderdelning af luftens naturliga elektriciteter verkliggen egde rum, så måste de omvexlande positiva och negativa luftdelarne upphäfva hvarandras verknningar på kropparne i elektriska skuggan, åtminstone är ingen grund förbanden, hvarföre den med den fördelande kroppens elektricitet likartade elektriciteten alltid skulle vara den öfvervägande. Äfven gifvas försök, som alldeles icke öfverensstämma med PETRINAS mening. Jag elektriserade en elektrofor, hvars hartzkaka var gjuten i en metallform, starkt med en laddad Leydnisk flaska, och isolerade densamma med baksidan uppåt. Blef sedan locket hållet på olika afstånd från formen, och vidrördt, under det den sednare stod i förëning med jorden, fann jag den förras elektricitet öfverflyttad till en guldbladsselektrometer, motsatt kakans och så stark, att guldbladen stundom divergerade två fulla linier. En otvifvelaktig, ehuru svagare verkan, förmärktes äfven på stapelelektrometern, då formens rand blef förlängd genom en metallring af en tums bredd, oaktadt här den luftcylinder eller luftkegla, som var underkastad den fördelande verkan, helt och hållet var vänd nedåt.

Ville man deremot antaga, att luften blir elektriserad genom meddelning, och sedan verkar fördelande på ledande kroppar i elektriska skuggan, så synes mig detta antagande icke bättre grundadt, ty i detta fall borde guldbladens di-

vergens, och den fördelande verkan öfverhufvud, fortsära en stund, sedan den fördelande kroppen blifvit aflägsnad. Detta är likväl ingalunda fallet, så vida ingen verklig meddelning eger rum.

De fördelningsförsök, hvarom här är fråga, blefvo af FECHNER, och äfven af mig sjelf, vanligen så anställde, att en profskifva blef afledande vidrörd i elektriska skuggan af den med jorden förenade ledaren, och sedan isolerad förd till ett elektroskop. En anmärkning af vigt vid detta förfarande kan jag här icke förtiga. Så snart nemligen profskifvan blir vidrörd med fingern eller en annan ledare, kommunicerar den genom det ledande golfvet med den ledare, hvarpå den fördelande kroppen omedelbart inverkar, och båda tillhöra samma system af ledare. Då jag började sysselsätta mig med dessa försök, märkte jag snart, att en profskifva, som blef anbragt på ledarens baksida, och endast ofullkomligt slutade till, antog lika mycken elektricitet, som en annan lika stor profskifva, som nogare lade sig efter ytan. Sednare anställdes följande försök:

En trädtafla, 9 tum bred och 3 lin. tjock, på båda sidor belagd med stanniol, lades horisontelt på ett bord, så att 10 tum af dess längd fritt räckte framom bordskanten. Under taflan blef en måttligt starkt positivt laddad och förut uppvärmd Leydnisk flaska på $\frac{1}{4}$ kvadratfot beläggning så ställd, att kulans afstånd från taflans nedra yta var $\frac{1}{2}$ tum, och dess afstånd från främre randens vertikalyta så stort, att det parallelepipediska rummet öfver taflan var i elektriska skuggan af hela flaskan. En rund skifva af förtennt järnbleck, 1 tum 10 lin. i diameter, isolerad medelst en lång gummilackstjeln, lades på taflans öfra yta, midt emot kulan, så att den icke fullt nådde randen,

och upplyftades strax derefter. Dess elektricitet fann jag enligt förmodan negativ, och så stark, att stapelelektrometren bragtes till anslagning, och till och med guldbladen i BENNETS elektroskop svagt divergerade. En annan mindre profskifva, 7 lin. i diameter, som applicerades på den nyss undersökta ytan, temligen nära taflans rand, gaf på stapelelektrometren ett utslag af en linia. Derefter fördes genom ett hål i midten af den större profskifvan en metallstift, som räckte 5 lin. fram, hvarefter skifvan parallelt närmades den förut undersökta ytan ända till beröring af stiften. Efter skifvans upplyftning fann jag densamma lika så starkt, om icke starkare elektriserad, än i förra fallet. Sedan skifvan åter blifvit förd till sitt förra ställe, undersökte jag med den mindre profskifvan den under densamma befintliga ytan af taflan, men sån den icke märkbart elektriserad, oaktadt de närbelägna ställena gafvo tydliga spår till elektricitet. Häraf är således klart, att den underliggande ytans elektricitet genom stiften var öfvergången till skifvan. Stiften blef åter borttagen och skifvan ställd på sitt förra ställe, vid samma höjd (5 lin.) öfver taflan och vidrörd med en metalltråd. Genom försök med den mindre profskifvan, fann jag på taflans yta under den större skifvan icke något spår till elektricitet, och denna sednare var efter upplyftning, så vidt undersökas kunde, till samma grad elektriserad som i förra fallet. Då hela försöket omgjordes endast med den skilnad, att båda profskifvorna applicerades längre från randen, ungefär öfver midten af den framstående delen af taflan, så uteblef all verkan, icke allenast vid verklig beröring, utan äfven på 5 lin. afstånd, ehuru den på större afstånd var märkbar.

Utgången af detta försök var mig icke oväntad. Man kunde nemligen lätt förutse, för det första, att den bundna elektriciteten i den under skifvan befintliga ytan af taflan till följe af sin repulsivkraft måste genom stiften öfvergå till skifvan, och för det andra, att resultatet bör vara någorlunda detsamma, antingen profskifvan *omedelbart* genom stiften kommunicerar med taflan, eller *medelbart* genom en i handen hållen metalltråd, endast dess ställning mot taflan och den elektriserade kroppen i båda fallen är densamma. Enligt denna åsigt reducerar sig således den framkastade stridsfrågan till att undersöka, om i de delar af den för den fördelande verkan utsatta icke isolerade ledarens yta, som ligga i elektriska skuggan, samlar sig någon elektricitet. Att detta verkligen är fallet, kan väl knappast af någon ställas i tvifvelsmål. Enligt erfarenheten är denna elektricitet alltid motsatt den fördelande kroppens, och häraf kan förklaras, hvarföre en i elektriska skuggan ställd och afledande vidrörd profskifva alltid tillkännagifver en öfvervägande verkan af den fördelande elektriciteten öfver den fördelade. Genom utgången af föregående försök förklaras äfven, hvarföre profskifvan just öfver de ställen af ledarens baksida, hvarest den fördelade elektriciteten är märkbarast, anger den starkaste elektriska verkan. ty man kan föreställa sig, att elektriciteten går genom den ledande tråden öfver till profskifvan, och helt och hållet eller till en del försvinner från den underliggande ytan. Den bundna elektriciteten följer alltid i sin utbredning ledarens yta, men går ej genom massan. Då således en elektriserad kula blir ställd midt framför en ledande och icke isolerad skifva, så är dennas genom fördelning uppväckta elektricitet just i mid-

ten af främre ytan starkast. Derifrån aftager den mot omkretsen, och, om skifvan ej är allt för stor, kastar den sig om på baksidan, och blir här beständigt svagare mot midten. Är deremot skifvan större, så blir elektriciteten redan på framsidan, till något afstånd från randen, ganska svag; och alldeles omärklig på baksidan. Om derföre en ledare ställes icke för långt bakom skifvan, och ledande förenas med densamma, så antager den ingen märkbar elektricitet, eller med andra ord, den fördelande verkan på ledaren upphäfves nästan alldeles af skifvan. Det här anförda gäller ännu mera, om den fränvända ytan af ledaren bildar ett slutet rum, hvilket t. ex. är fallet med en ihålig kula, ty då samlar sig den bundna elektriciteten blott på den utvändiga ytan, och derföre afficieras ett sensibelt elektroscop alldeles icke af en i en närbelägen kammare i verksamhet satt elektricitetsmaschin. Detta är likväl endast ett sätt att betrakta saken, ty det är klart, att då verkan är noll i hvilken punkt som helst i det inre af en fördelad solid kula, så måste densamma äfven vara fallet med en ihålig.

Om strax före vidröringen af den i elektriska skuggan ställda ledande kroppen, den fördelade ledarens förenig med jorden upphäfves, så blir resultatet nära detsamma, blott den förra i jämförelse med ledaren sjelf är ganska liten. Jag öfvertygade mig särskildt, att profskifvan vid båda beröringssätten erhöll nära samma mängd elektricitet, så vida dess ställning mot ledarens yta i båda fallen var densamma. Annorlunda förhåller sig saken, då man experimenterar med skifvor, och den i elektriska skuggan ställda skifvan icke är betydligt mindre än den omedelbart fördelade. I detta fall erhåller den förra vid smärre

afstånd vida mindre elektricitet, då den först vidröres sedan den fördelade skifvans isolering blifvit återställd. Vid större afstånd försvinner skillnaden alldeles. Längre fram skall jag återkomma till samma ämne.

Oaktadt det icke kan nekas, att en i elektriska skuggan af en icke isolerad ledare ställd kropp verkligen blir elektriserad genom fördelning, så är likväl verkan i sjelfva verket ganska svag och i många fall omärklig. Kallar man således som förut den fördelande kroppen *A*, den afledande vidrörda ledaren *B*, och den i elektriska skuggan ställda kroppen *C*, så afviker man öfverhufvud obetydligt från sanningen, om man antager, att hvarken elektrisk attraktion eller repulsion eger rum i *C*. Efter utseendet har således den i *B* bundna elektriciteten nästan förlorat sin verkan utåt, ehuru den endast är kompenserad af den starkare verkande elektriciteten i *A*. Meddelas åt *B*, efter återställd isolering, en viss mängd elektricitet, så sönderfaller dess ytas elektriska lager i det fria och bundna. Men då resultanten af det bundna lagrets elektriska verkningar på en punkt i elektriska skuggan är nära i jemvigt med resultanten af elektricitetens i *A* verkningar på samma punkt, så kan man bortlänka sig detta system af krafter, och endast betrakta den fria elektriciteten i *B* som den verkande. Då således icke är fråga om någon stor noggrannhet, kan man föreställa sig, att den elektriska verkan af *A* endast sträcker sig till *B*, och att denna sednare endast genom sin fria elektricitet verkar på kroppar i elektriska skuggan af *B*. På samma sätt kan man föreställa sig, att verkan af *B* åt andra hållet endast sträcker sig till *A*, och att denna endast genom den elektricitet, som icke bindes af

B, verkar på kropparne i elektriska skuggan af *A*. Häraf inses således redan, att delningen af elektriska lagren på de kroppars yta, som verka fördelande på hvarandra, i de fria och bundna, som ofvanföre är visadt, oaktadt den endast sker i tankarne, likväl, i de fall då en noggrannare metod icke är användbar, med fördel kan begagnas, för att öfverse de elektriska fenomenerna och underlätta förklaringarne.

Hittills är endast i allmänhet taladt om kroppar och ledare, utan att tillägga dem någon bestämd form. I det följande antages, att de fördelande på hvarandra inverkan de kropparne äro tunna, cirkelrunda, ledande och lika stora skifvor, hvilka i parallelt läge äro så ställda, att deras medelpunkter falla i samma räta linia, hvilken är vinkelrät mot deras ytor. Äfven förutsättes, att skifvorna äro isolerade i behörigt afstånd från omgifvande kroppar.

Först betraktas det fall, då skifvorna blott äro tvenne, som jag vill kalla *A* och *B*.

Om till en af skifvorne *A* meddelas en viss mängd elektricitet, och den andra *B* förenas med jorden medelst en tunn metalltråd och närmas *A*, så tilltager mängden af bunden olikartad elektricitet i *B*, och närmar sig, enligt erfarenheten, mer och mer mängden af elektricitet i *A*. Aflägsnas deremot *B* från *A*, så aftager småningom den i *B* bundna elektricitetsmängden, och närmar sig noll. Men icke allenast mängden utan äfven utbredningen af den bundna elektriciteten ändrar sig med afståndet. Ju närmare *B* föres mot *A*, desto mera hopar den sig i den mot *A* vända ytan, och mängden af elektricitet i den fränvända blir allt mindre. Vid större afstånd blir denna olikhet mindre påfallande, och båda ytornas elek-

tricitetsmängder närma sig mer och mer till likhet. Man ser detta bäst, om man tager *B* dubbel, och åtskiljer båda skifvorna, efter återställd isolering, vid det gifna afståndet från *A*. Undersöker man med profskifvan elektriciteten på olika ställen af *B*, så finner man den temligen likformigt utbredd på främre ytan, och endast vid större afstånd märkligt tätare vid kanten än i midten. Deremot är den fränvända ytans elektricitet alltid märkbarast vid kanten och i midten nästan noll. Som förut är anmärkt, binder icke allenast *A* elektricitet i *B*, utan *B* binder tillbaka en del af elektriciteten i *A*. Denna bundna elektriciteten fördelar sig på främre ytan af *A*, likformigare än den återstående fria, och därför blir öfvervigtan af kantens elektricitet öfver midtens allt mindre, ju ringare afståndet är. Då skifvornas diameter var 6 tum, fann jag skillnaden redan vid en tums afstånd temligen obetydlig. På baksidan af skifvan *A* är elektriciteten till större delen fri, och hopar sig därför alltid mera vid kanten än vid midten.

Om *B* i isoleradt och neutralt tillstånd närmas skifvan *A*, så är den olikartade elektriciteten tätast vid midten af den främre ytan. Derifrån utbreder den sig ständigt aftagande öfver hela ytan, om man endast undantager en smal ring, nära kanten, som är likartadt elektriserad. Denna likartade elektricitet rycker midten något närmare vid större afstånd, men är alltid ganska svag. På baksidan angifver profskifvan endast likartad elektricitet, nemligen starkast vid kanten och aftagande mot midten, ehuru utbredningen blir jemnare vid större afstånd. Denna ganska skiljaktiga utbredning af de motsatta elektriciteterna på båda yterna

ytorna är likväl icke påfallande och förklaras lätt, om man endast jemför den fria elektricitetens utbredning med den bundnas. På den främre ytan är visserligen den bundna elektriciteten närvarande i större mängd, men utbreder sig mera jemt än den fria, som är betydligt tätare vid kanten. Den förre försvagas derföre i midten minst, och vid kanten mest af den sednare, och man begriper utan svårighet, att i anseende till den fria elektricitetens starkt mot kanten tilltagande täthet, kan den bundna här till och med blifva öfverväldigad. Vid större afstånd öfvergår en jemförelsevis större mängd bunden elektricitet till baksidan, och framsidans indifferenslinea aflägsnar sig något från kanten. På baksidan är den fria elektriciteten, isynnerhet vid smärre afstånd, närvarande i mycket större mängd än den bundna, och här kan endast likartad elektricitet framträda; likväl blir denna märkligt försvagad vid kanten af den vid tilltagande afstånd mellan skifvorna tillbakagående olikartade elektriciteten.

I det föregående är stillatigande antaget, att *A* inverkar på samma sätt fördelande på den isolerade och icke isolerade skifvan *B*. Likväl gifvas tvenne orsaker, som skulle kunna föranleda en olika inverkan. För det första drager sig elektriciteten i *A*, sedan *B* blifvit afledande vidrörd, mera mot främre ytan, alltså närmare *B*, och för det andra blir dess utbredning i det hela annorlunda. Den första omständigheten kan ganska li'et komma i betraktande, om skifvorna äro rätt tunna, och deras afstånd icke är ganska litet. Inflytandet af elektricitetens förändrade utbredning på ytan till folje af skifvans *B* fördelande verkan, har jag sökt bestämma på experimentel väg. Frågan reducerar sig, som nedanför skall visas, till

att undersöka hvilken verkan den icke afledande vidrörda skifvan *B* åstadkommer i *A*. Redan förut är anmärkt, att en isolerad skifvas naturliga elektriciteter genom närmandet till en lika stor elektriserad skifva blifva så åtskilda och fördelta, att den främre ytans olikartade elektricitet *afstager* från midten mot kanten, den likartade deremot på bakre ytan *tilltager* från midten mot kanten. Derföre blir närmare kanten den fränvända ytans likartade elektricitet starkare, än den olikartade på den åtvända ytan. Vid något afstånd från kanten blifva båda elektriciteterna lika starka, och närmare midten blir den olikartade allt mera öfvervägande. Om skifvornas tjocklek är omärklig mot bådassafstånd, så kan man betrakta båda ytorna såsom sammanfallande till en enda, och denna blir från midten till ett visst afstånd från kanten olikartadt, och derifrån till kanten likartadt elektriserad. Båda elektriciteterna verka fördelande på den motstående förut elektriserade skifvan, men då de äro motsatta och lika till myckenhet, så är icke sannolikt, att totalmängden af den i denna bundna elektriciteten betydligt afviker från noll. För att härutinnan genom försök vinna upplysning, lade jag en dylik skifva på locket af en guldbladelektrometer, elektriserade densamma, och närmade till henne ofvanifrån en annan lika stor, medelst en lång oledande stång isolerad skifva. Det är klart, att om elektricitetens mängd i den nedra skifvan blir ökad eller minskad genom den öfras återverkan, så måste detta genast gifva sig tillkänna på elektrometren, i förra fallet genom en minskning och i det sednare genom en tillökning af divergensen. Försöken äro svåra och måste anställas med försigtighet, så vida man ej skall bli missledd, ty den ringaste elektricitet som adhæ-

rerar till det isolerande glaströret eller lackstängen influerar genast, och resultatet ändrar sig ofta betydligt, om man meddelar den nedra skifvan och elektrometren motsatt elektricitet. Den förra elektriciteten kunde knappt öfver en ljuslåga alldeles aflägnas; men om äfven all elektricitet var afledd, så var likväl de isolerande stängernas återverkan på elektroskopet icke fullt omärklig. Det lyckades mig bäst, att förekomma främmande inverkan, då skifvan isolerades medelst långa och tunna sidentrådar, som före försöket vore väl uttorkade. På detta sätt märktes med skifvor af förtennt jernbleck, 6 tum i diameter, blott en obetydlig oscillation hos guldbladen, då den öfre skifvan flyttades fram och tillbaka, och denna oscillation var lika stor, antingen den meddelta elektriciteten var positiv eller negativ. Jag skattade minskningen i divergens, då den öfra skifvan ända till beröring närmades den nedra, endast till $\frac{1}{4}$ lin., då guldbladen divergerade 6 lin. Då en skifva af stanniol, 1 tum 10 lin. i diameter, isolerad genom en lång gummilackstjolk, närmades den nästan lika stora öfra ytan af guldbladelektrometrens lock, så märktes endast då någon verkan, när guldbladen voro nära att slå an. Till och med med mycket tjockare skifvor var verkan icke särdeles betydlig. Då diametern var 4 tum och tjockleken 2 lin. förminskades divergensen från 7 endast till $6\frac{1}{4}$ lin.

Då således en isolerad och neutral skifva parallelt närmas till en annan elektriserad lika stor skifva, så tilltager myckenheten af den på den sednares främre yta hopade elektriciteten endast obetydligt, eller, hvad som är detsamma, blott en obetydlig mängd af dess elektricitet bindes. Man kan således utan stort fel anse den förra skifvans

fördelande återverkan som noll, endast dess tjocklek icke är betydlig. Häraf kan dragas den slutsats, att om en elektriserad skifva A verkar fördelande på en annan lika stor äfvenledes elektriserad skifva B , så förändras denna inverkan endast obetydligt, om skifvans B elektriska tillstånd undergår någon förändring. För att förklara detta tydligare, antager jag först, att B före närmandet till A icke är elektriserad. I detta fall verkar A på B , och åtskiljer dess naturliga elektriciteter, som förut är visadt; deremot kan man anse skifvans B fördelande återverkan på A som noll. Om nu en qvantitet elektricitet meddelas åt B , så förändras straxt elektriska tillståndet i A , och man kan betrakta den fördelande verkan af B , liksom vore det elektriska noll i A sönderdeladt i tvenne lika stora, men motsatta elektriciteter. Dessa elektriciteter utbreda sig på skifvans yta, alldeles så, som vore A förut icke elektriserad, och upphäfva i det närmaste hvarandras verkningar på B . Alltså verkar A på B som förut, nästan endast genom det elektriska lager, som uppkommit genom elektriseringen. Strängt taget binder A likväl något mera elektricitet i den förut elektriserade, än i den icke förut elektriserade skifvan B , så vida den B meddelta elektriciteten är olikartad med elektriciteten i A , och något mindre om den är likartad; ty i första händelsen understödjer det genom den fördelande verkan af B i A uppkomna elektriska lagret verkan af A på B , och i den sednare händelsen verkar det mot densamma. Om således den icke elektriserade skifvan B blir afledande vidrörd, så bindes i densamma något mera elektricitet än förut.

Jag antager nu, att åt en af skifvorna A blifvit meddelad elektricitetsmängden E . Om då den

andra neutrala skifvan B isolerad ställes på ett gifvet afstånd från densamma, så binder A i B en viss mängd med E olikartad elektricitet, och sätter en lika stor mängd likartad i frihet. Kallar man denna sednare E' , så blir den förra $-E$. Antag att $E:E'=m:1$, så blir $E'=-mE$. Emedan $E'<E$, blir m mindre än enheten, men närmar sig densamma destomera, ju mera B närmas A . Som förut är visadt, är den fördelande återverkan af B på A i isolerade tillståndet endast obetydlig, och derföre kan man anse hela mängden af elektricitet som fri i A . Blir B afledande vidrörd, så försvinner i densamma all fri elektricitet, men som ofvanföre är bevisadt, förändrar sig, genom denna ändring af elektriska tillståndet i B , den fördelande verkan af A på B endast ganska litet. Alltså binder A nära samma elektricitetsmängd $-mE$ i B som förut, och följaktligen är mE den afledda elektricitetsmängden. Men så snart denna aflägsnas, verkar $-mE$ ensam, och binder tillbaka en del af elektriciteten i A . Tänker man sig A icke elektriserad, och kallar E'' den elektricitetsmängd, som B i detta fall binder i A , så blir uppenbart $E':E''=E':E$, alltså $E''=\frac{E'}{E}=m^2E$. Men då $-mE$ i den icke elektriserade skifvan A binder m^2E , så måste den binda nära samma mängd då A eger elektricitetsmängden E , hvilket af det föregående är klart. Alltså blir $E-m^2E=(1-m^2)E$ den fria elektricitetsmängden i A . Om nu A vidröres afledande, så försvinner i densamma all fri elektricitet, men B binder ännu nästan oförändradt samma mängd som förut. Alltså blir mängden m^2E kvar i skifvan, under det $(1-m^2)E$ afledes i jorden. Den förra elektriciteten binder nu i B elektricitetsmängden $-m^2E$, och således blir

$-mE + m^2E = -m(1 - m^2) E$ här fri. Det följande faller af sig sjelf, och jag anser icke nödigt att längre uppehålla mig dervid, då detta är en redan bekant sak. Vid afvexlande fortsatta vidröringar af båda skifvorna, blifva m^2E , m^4E , m^6E o. s. v. värdena på de i A bundna elektricitetsmängderna, och $-mE$, $-m^3E$, $-m^5E$ o. s. v. värdena på de i B bundna. Vidare äro $(1 - m^2)E$, $m^2(1 - m^2)E$ o. s. v. de fria elektriciteterna i A , och $-m(1 - m^2)E$, $-m^3(1 - m^2)E$ o. s. v. de fria i B . Så väl de bundna som fria elektriciteterna i båda skifvorna äro hvarandra således motsatta och bilda alla aftagande geometriska serier, hvilkas exponent är m^2 .

Af det här anförda inses, att den i läroböckerna framställda teori om elektrisk bindning, kommer sanningen temligen nära, oaktadt den icke kan anses fullt noggrann. Orsaken ligger deri, att den fördelande verkan af den ena af skifvorna icke förblifver fullkomligt konstant, då den andras elektriska tillstånd undergår någon förändring, en omständighet, som likväl förutsättes. Man behöfver likväl icke befara, att termerna i ofvanstående serier allt mera skulle afvika från verkliga förhållandet, ju längre serierna fortsättas. Ty antag, att den sanna elektricitetsmängden, som A , efter första vidrörandet af B , binder i denna, är $-mE$, och att det exacta värdet på den elektricitetsmängd, som B binder tillbaka i A är $m(m + \omega)E$, så blir $(1 - m(m + \omega))E$ precis den fria elektriciteten i A . Om nu A vidröres afledande, står A nödvändigt i samma förhållande till B , som B förut till A . Alltså är m^2E precis den bundna elektricitetsmängden i A , och $(1 - m^2)E$ precis den afleda fria. Då man således endast har afseende på de elektricitetsmängder, hvilka

hvarje skifva förlorar eller ännu har kvar, då den afledande vidröres, så är ofvan anförda teori fullkomligt exact, äfven om skifvornas tjocklek är betydlig. Fördelnings-coefficienten m ändrar sig endast något, då skifvornas tjocklek tilltager.

I det följande antages, att de skifvor, som verka fördelande på hvarandra äro tre till antalet, en händelse, som är vida mera komplicerad, än den föregående.

Då skifvorna blott äro två, A och B , komma endast tvenne fördelande verkningar i betraktande, nemligen verkan af A på B , och verkan af B på A . Äro deremot skifvorna tre, som jag vill kalla A , B , C , så äro dessa verkningar sex till antalet. A verkar nemligen på B och B på A . A verkar på C och C på A , och ändtligen verkar B på C och C på B . Hvar och en af skifvorna, till ex. A , är alltså på en gång underkastad de båda fördelande verkningarne af de öfriga B och C . I detta fall är den bundna elektriciteten i skifvan A , antingen denna befinner sig mellan B och C , eller icke, enligt det s. 372 framställda allmänna beviset, och med afseende på det s. 388 anförda, summan (algebraiska) af de elektricitetsmängder, som B och C hvar för sig binde i A . Kallar man således E , E' , E'' elektricitetsmängderna i A , B och C , och m , m' , m'' , fördelningscoefficienterna, som motsvara afstånden mellan A och B , B och C , A och C , så blifva $-(mE' + m'E'')$, $-(mE + m'E'')$, $-(m'E' + m''E)$, de bundna elektricitetsmängderna i A , B och C . Den fria elektriciteten i hvar och en skifva är lika med skillnaden mellan dess absoluta elektricitetsmängd och dess bundna, hvar och en tagen med sitt egna tecken. I C t. ex. är den fria elektricitetsmängden $E'' + m'E' + m''E$. och denna blir således större än E'' , om

E och E' äro likartade med E'' . Vidröres en af skifvorna afledande, så försvinner nästan endast dess fria elektricitet, ty af det föregående inses, att de andra skifvornas fördelande verkningar genom denna förändring i den förras elektriska tillstånd endast obetydligt ändras.

Det är uppenbart, att mellan fördelnings-coefficienterna m, m', m'' , ett sådant beroende måste finnas, att då tvenne äro gifna, är äfven den tredje bestämd. Alltså måste t. ex. m'' vara en viss function af m och m' . Man inser äfven, att en viss relation måste ega rum mellan afstånden och fördelnings-coefficienterna. Men hvilken är denna relation och hvilken är formen på den omnämnda functionen? Jag skall här försöka att sprida något ljus öfver detta ämne.

Ofvannföre s. 382 är anmärkt, att den elektriska verkan i elektriska skuggan af en fördelad ledare är nästan densamma, som verkan af den ledarens elektricitet, som icke är bunden af den fördelande kroppen, eller med afseende på denna är fri. Jag antager här, att B är ställd mellan A och C . Till följe af den fördelande verkan af A , blir $-mE$ bunden i B , och $+mE$ blir fri. Alltså är $E'+mE$ den elektricitetsmängd, hvars verkan på C kan anses lika med de förenade verkningsarna af elektriciteterna i A och B på C , alldenstund C helt och hållet är i elektriska skuggan af B . Men den förra elektriciteten binder $-m'E - mm'E$ i C . Ofvannföre är visadt, att A och B tillsammans binda $-m'E - m'E$ i C . Jemför man båda uttrycken, så äro redan de båda första termerna enahanda, och foljaktligen äro äfven de båda öfriga lika, eller man har $m''E = mm'E$, hvaraf $m'' = mm'$. Till följe häraf är således fördelnings-coefficienten till afståndet mellan A och C lika

med produkten af fördelningscoefficienterna till afstånden mellan A och B , och B och C . Men afståndet mellan A och C är lika med summan af afstånden mellan A och B , och B och C . Om det således är tillåtet att öfverse den lilla skillnaden mellan m'' och mm' , så är relationen mellan afstånden och fördelnings-coefficienterna af den beskaffenhet, att mot summan af de förra svarar produkten af de sednare, eller annorlunda uttryckt, afstånden äro logaritmmer till fördelningscoefficienterna. Det samma skall ännu mera öfvertygande visas på följande något afvikande sätt.

Jag antager, att B står i förening med jorden, under det C isolerad och icke elektriserad närmas densamma till ett visst afstånd, och kallar, som förut, E elektricitetsmängden i A . Genom den fördelande verkan af A på B och C , bindes $-mE$ i B och $-m''E$ i C . Elektricitetsmängden $-mE$ i B binder $mm'E$ i C , och således är $-m''E + mm'E$ den i C bundna mängden. Men då B blifvit satt i förening med jorden, och C är i elektriska skuggan af B , blir den fördelande verkan i C enligt erfarenheten ganska obetydlig. Betraktar man således den i C bundna elektriciteten som noll, blir $-m''E + mm'E = 0$, eller $m'' = mm'$, som förut.

Af det nyss anförda inses således, att för de fall, i hvilka den i elektriska skuggan af den icke isolerade skifvan B ställda skifvan C kan betraktas som icke elektriserad genom fördelning, eller nogare $m'' - mm'$ försvinner mot m, m', m'' , så är relationen mellan afstånden och fördelningscoefficienterna logaritmisk. Om alltså inom de gränсор af afstånden för hvilka detta eger rum, tvenne skifvors afstånd blir fördubbladt, tredubbladt o. s. v., så blir den motsvarande fördelnings-

coefficienten någorlunda upphöjd till andra, tredje o. s. v. digniteten. Emedan fördelnings-coefficienterna alltid äro mindre än enheten, så äro deras logarithmer alltid negativa, men man finner lätt, att det är likgiltigt antingen man anser afståndet sjelfva negativa, eller blott proportionella mot de negativa logarithmerna. Den verkliga fördelnings-coefficienten till ett gifvet afstånd kan endast finnas genom försök. Blott i tvenne fall är densamma på förhand bekant, nemligen för det oändligt lilla och oändligt stora afståndet. Det är nemligen klart, att den bundna elektriciteten är lika stor med den bindande, då afståndet är noll, deremot i jemförelse med densamma oändligt liten, då afståndet är oändligt stort, och derfore motsvarar den förra händelsen fördelnings-coefficienten 1, och den sednare noll. Detta öfverensstämmer fullkomligt med antagandet af en logarithmisk relation, ty enhetens logarithm är noll, och logarithmen till noll är det oändliga. Härvid är likväl att erinra, att den andra händelsen äfven svarar mot den omvända qvadratiske, och många andra relationer mellan afstånd och fördelnings-coefficienter. Fördelnings-coefficienten beror för öfrigt icke allenast på afståndet, utan äfven på skifvornas storlek, och blir vid tilltagande diameter större, som nedanförelse skall visas. Deremot influerar tjockleken när den ej öfverstiger en viss gräns, ganska obetydligt.

Oaktadt de bekanta värdena på fördelnings-coefficienterna för båda extremerna af afståndet, nemligen noll och det oändliga, rättfärdiga antagandet af en logarithmisk relation mellan fördelnings-coefficienter och afstånd, så inser man likväl lätt, att densamma icke en gång approximativt kan gälla i hvilket fall som helst. Ty

antag, att afståndet mellan båda skifvorna är så träffadt, att den bundna elektricitetens myckenhet är jemt hälften af den bindandes, så är vid detta afstånd, som jag vill kalla a , fördelnings-coefficienten $\frac{1}{2}$. Om ofvannämnda relation vore gällande för alla afstånd, så blefve vid dubbelt, trefaldigt o. s. v. afstånd, de motsvarande fördelnings-coefficienterna $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ o. s. v., eller för hvarje ny mångfaldig af afståndet a , fördelnings-coefficienten reducerad till hälften af förre värdet. Men antag, att afståndet blifvit mångdubbladt ända till na , hvarest n betyder ett så stort tal, att a är ganska liten mot na . Om nu afståndet ökes ännu med ett a , eller bringas till $(n+1)a$, så skulle fördelnings-coefficienten vid detta afstånd, enligt föregående relation, endast vara hälften af den förre, eller blott hälften så stor mängd elektricitet skulle bindas vid afståndet $(n+1)a$, som vid na , hvilket är orimligt, alldenstund $(n+1)a$ och na kunna passera för lika stora afstånd, och således nära lika mängder i båda fallen måste bindas.

På grund af det nyss anförda inser man således, att då afstånden mellan tvenne skifvor fortgå i arithmetisk progression, med lika tillväxter, så bilda de motsvarande fördelnings-coefficienterna ingen noggrann geometrisk series, utan en sådan, hvars exponent från term till term blir större, och småningom närmar sig enheten. Häraf följer, att den sanna fördelnings-coefficienten, vid en gifven mångdubbling af afståndet, är större än den enligt ordningen motsvarande termen i den rent geometriska serien, hvilken term står noga i logarithmisk relation med afståndet. Detta öfverensstämmer äfven med erfarenheten, ty sedan B blifvit afledande vidrörd, öfverväger alltid

den fördelande verkan af A på C verkan af B på C , och man har således alltid $m'' > mm'$. Man föreställe sig här, att na och $n'a$ äro afstånden mellan skifvorna A och B , B och C , då n och n' betyda hela tal. Antager man, att $m'' = m m$, så blir $m_1 > m'$. Men m_1 är förhållandet mellan de båda termerna i fördelnings-coefficienternas series, hvars ordningstal äro $n+n'+1$ och $n+1$, deremot uttrycker m' förhållandet mellan den term, hvars ordningstal är $n'+1$, och första termen (enheten), och derföre tilltager förhållandet mellan tvenne termer i serien (den efterföljande till den föregående), som stå lika långt från hvarandra (här n' termer), desto mera, ju högre deras ordningstal blifva; hvaraf således följer, att seriens exponent blir allt större, ju längre man fortsätter densamma.

Då således erfarenhet å ena sidan, och eftertanka å den andra, komma öfverens deruti, att mm' i sjelfva verket mer eller mindre afviker från m'' , skall här undersökas, inom hvilka gränser af afstånden, antagandet af likhet mellan båda storheterna kommer sanningen tillräckligt nära, för att utan stort fel kunna läggas till grund för förklaringen af de fördelnings-fenomener, hvarom här är fråga.

Såsom ofvanföre är erinradt, vore för hvarje fall $m'' = mm'$, och afstånden alldeles noga logarithmer till fördelnings-coefficienterna, om, som några velat påstå, den elektriska verkan i elektriska skuggan af en afledande vidrörd ledare vore fullkomligt noll. Detta är likväl, som erfarenheten visar, icke händelsen, och kan icke vara det. Här frågas alltså, på hvad sätt man från de för några särskilta fall observerade bundna elektri-

elektricitetsmängderna i skifvan *C*, sedan *B* blifvit afledande vidrörd, skall kunna göra upp några allmänna slutsatser angående ämnet. Det följande innehåller de betraktelser jag anställt öfver saken.

Om *E*, som förut, betecknar elektricitetsmängden i *A*, och *e* föreställer den i *C* bundna mängden, sedan *B* blifvit vidrörd afledande, så blir $e = -(m'' - mm') E$, eller, då man sätter $e = -\mu E$ och $m'' = mm$, $\mu = m(m_1 - m')$. Antager man i denna formel *m* som konstant, och låter *m*, och *m'* variera, så inträffar det fall, då man, utan att ändra ställningen af *A* och *B*, flyttar skifvan *C* upp och ned. Ju mera *C* närmas *B*, desto mera närma sig äfven, som man lätt inser, *m*, och *m'* till enheten, och μ blir beständigt mindre och slutligen omärklig. Men om *C* betydligt aflägsnas från *B*, så försvinner *m*, och *m'* småningom, och μ närmar sig åter noll. Således är klart, att, vid ett visst afstånd mellan *C* och *B*, ett maximum af verkan måste inträffa, hvilken omständighet fullkomligt öfverensstämmer med erfarenheten. Afståndet mellan *A* och *B* må vara hvilket som helst, så har jag alltid funnit den i *C* bundna elektriciteten i närheten af *B* omärklig. Blef *C* småningom aflägsnad från *B*, tilltog verkan långsamt till en viss storlek, blef sedan efter hand mindre och slutligen åter omärklig *). Detta sista är naturligt, emedan verkningarne af *A* och *B* vid stora afstånd hvar för sig försvinna. Men om detta

*) Då detta försök sker på fri hand, är svårt att hålla skifvan *C* noga i elektriska skuggan; jag har likväl öfvertygat mig, att en ringa afvikning från det s. 382 uppgifna läget, öfverhufvud knappt märkligt ändrar resultatet.

försök skall lyckas, är nödvändigt, att *B* och *C* icke vidröras på en gång, ty sker detta, så öfvergår, som förut är omnämndt, vid små afstånd större delen af den på fränsidan af *B* bundna elektriciteten till *C*, och verkan är just vid närmaste grannskapet störst. Den afledande tråden måste därför först vidröra *B* och sedan *C*; men då lätt kan hända, att elektriciteten i *A* under tiden aftager, så böra båda vidröringarne ske hastigt efter hvarandra. Den här yttrade åsigt angående orsaken till olikheten vid båda beröringssätten är endast ett sätt att betrakta saken. Den sanna grunden till detta fenomen är återverkan af *C* på *B*, och skall i det följande närmare förklaras.

För det andra antages, att vid orubbad ställning af *B* och *C*, endast *A* ändrar sitt läge. I enna händelse måste man i formeln $\mu = m(m, -m')$ anse m' konstant, deremot m och m , föränderliga. Om *A* föres allt närmare *B*, närmar sig m enheten, men m , till m' , och följaktligen $m(m, -m')$ till noll. Alltså blir den fördelande verkan på *C* vid mycket ringa afstånd mellan skifvorna *A* och *B* omärklig. Detta är i sig sjelf klart, ty i detta fall äro de motsatta elektriciteterna i *A* och *B* nära lika till mängd, och verka vid nästan lika afstånd på *C*. Ställer man deremot *A* ganska aflägsen från *B* och *C*, blir m ganska liten, och uttrycket $m(m, -m')$ afviker för andra gången blott obetydligt från noll. Verkan på *C* försvinner således, hvilket för öfrigt är lätt att inse. Äfven i denna händelse inträffar således ett maximum af verkan vid ett visst afstånd mellan *A* och *B*.

En tredje händelse förtjenar ännu mer än de båda föregående att närmare tagas i öfvervägande. Denna händelse inträffar, då afstån-

det mellan A och C förblifver detsamma, under det B flyttas fram och tillbaka mellan båda plåtarna. Betraktar man här formeln $\mu = m'' - mm'$, så har man m'' konstant, deremot m och m' föränderliga. Om B föres allt närmare A , så närmar sig m till enheten, men m' till m'' , hvaraf inses, att μ blir allt mindre och slutligen försvinner. Detta är äfven fallet, då B flyttas mot C , ty då närmar sig m' mer och mer till enheten och m till m'' . Då således verkan på C i båda fallen försvinner, måste nödvändigt ett maximum egrum vid en viss ställning af B mellan A och C . För att bestämma afståndet från A , för hvilket verkan på C d. ä. $-\mu E$ eller e blir ett maximum, antager jag, att hela afståndet från A till C är deladt i jemna antalet $2n$ lika delar a . Låt $p_1, p_2, p_3, \dots, p_n$ vara de beständigt tilltagande exponenterna i fördelnings-coefficienternas series, hvilka motsvara afstånden från a till och med $2na$. Emedan m'' är fördelnings-coefficienten vid afståndet $2na$, blir således $m'' = p_1 p_2 p_3 \dots p_n$. Här antages först, att B står i midten mellan A och C , alltså vid afståndet na från båda. Vid detta afstånd blir $m = m' = p_1 p_2 p_3 \dots p_n$ och följaktligen $mm' = m^2 = p_1^2 p_2^2 p_3^2 \dots p_n^2$. Jag antager nu, att B flyttas ett a närmare mot C , och således står vid afståndet $(n+1)a$ från A . För detta fall blir $m = p_1 p_2 p_3 \dots p_{n+1}$ och $m' = p_1 p_2 p_3 \dots p_n$, och följaktligen $mm' = p_1^2 p_2^2 p_3^2 \dots p_n^2 p_{n+1}$. Jemför man detta värde på mm' med det förra, så finner man, att båda värdena hafva den gemensamma factorn $p_1^2 p_2^2 p_3^2 \dots p_n^2$. Kallar man densamma R , blir vid midten mellan A och C , $mm' = Rp_n$ och vid afståndet $(n+1)a$ från A , $mm' = Rp_{n+1}$. Men p_{n+1} är större än p_n och följaktligen är mm' vid $(n+1)a$ afstånd från A , större än vid medlersta afståndet

na. Ryckes B ännu ett a närmare C , nemligen till $(n+2)a$ afstånd från A , blir $m = p_1 p_2 p_3 \dots p_{n+1}$, och $m' = p_1 p_2 p_3 \dots p_{n-1}$, och häraf fås $mm' = p_1^2 p_2^2 p_3^2 \dots p_{n-1}^2 p_{n-1} p_{n+1} p_{n+1}$. Detta värde på mm' har med det föregående, då afståndet från A var $(n+1)a$, factorn $p_1^2 p_2^2 p_3^2 \dots p_{n-1}^2 p_{n-1} p_{n+1}$ gemensam. Kallar man densamma för korthetens skull R' , så blir vid afståndet $(n+1)a$ från A , $mm' = R' p_{n-1}$, och vid afståndet $(n+2)a$ från A , $mm' = R' p_{n+1}$. Men då p_{n+1} är större än p_{n-1} , så följer häraf, att $R' p_{n+1} > R' p_{n-1}$. På samma sätt kan bevisas, att då skifvan B vidare ryckes mot C , så blir mm' beständigt större. Om B på samma sätt från medlersta afståndet na flyttas allt närmare A , så inser man lätt, att m och m' endast förbyta sina värden, och alltså blir produkten mm' vid lika afstånd i båda fallen från midten, lika stor. Häraf följer således, att mm' har sitt minsta värde då B står noga i midten mellan A och C , och följaktligen har $m'' - mm'$ vid detta skifvas B läge sitt maximum.

De här theoretiskt för de tre händelserna härledda resultaterna äro redan på experimentel väg, ehuru icke alldeles under samma omständigheter som här, framställde af FECHNER i hans intressanta undersökning om elektricitet genom fördelning (Pogg. Ann. B. LI s. 321). FECHNER fann för tredje händelsen maximum af verkan i midten, eller ungefär i midten, då han, i stället för skifvan C , ställde elektroskopet sjelf i elektriska skuggan af den icke isolerade skifvan, och flyttade denna fram och tillbaka mellan den elektriserade skifvan och elektroskopet (s. 329). Alldeles enahanda resultat har äfven jag erhållit med de tre lika stora skifvorna.

Då således teori och erfarenhet deri öfverensstämma, att m'' mest afviker från mm' , då den afledande vidrörda skifvan B är ställd i midten mellan A och C , behöfver man endast bestämma afvikningens storlek för detta fall, för att deraf kunna sluta, huruvida båda storheterna äfven vid andra lägen af skifvan B mellan A och C äro så litet skiljaktiga, att mm' kan begagnas i stället för m'' . Antager man, som förut, $m' - mm' = \mu$, så blir $m'' = mm' + \mu$. Om μ här är ganska liten mot mm' , så kan man öfverse μ , och rätt och slätt anse $m'' = mm'$. Allt beror således derpå, om förhållandet $\frac{\mu}{mm'}$ i jemförelse med enheten är ett tillräckligt litet bråk. Men att omedelbart bestämma mm' är obehvämt, och jag har derföre föredragit, att jemföra μ med m'' sjelf. I denna afsigt har jag anställt försök med skifvor af förtennt jernbleck, 6 och 3 tum i diameter, hvilka voro hamrade så jemna som möjligt. En af dessa skifvor A blef isolerad i horisontel ställning på en lackstång, som var insmält i ena ändan af ett 17 tum långt vertikalt stäldt glaströr. På denna skifva fästades genom insmältning tre smala lika höga stänger af god lackkomposition, och deröfver lades en annan skifva B . På denna blefvo på samma sätt fästade trenne med de förra lika höga stänger, och deröfver lagd en tredje skifva, C , försedd med ett långt isolerande handtag af lack. Sedan blef A elektriserad genom ögonblicklig beröring nedifrån nära kanten med kulan af en laddad och uppvärmd Leydnisk flaska, hvarpå C , sedan flaskan blifvit aflägsnad, vidrördes med en lång metalltråd. Strax derpå blef C isolerad upplyftad, och så ställd på en halmstrå-elektrometer, att midten af skifvan vidrörde dess topp.

Derefter blefvo *A* och *B* befriade från sin elektricitet, hvarpå *A* ånyo elektriserades medelst flaskan, och sedan denna blifvit aflägsnad, vidrördes först *B* och sedan *C* afledande. Efter upplyftning ställdes *C* med sin midt på locket af en guldbladelektrometer. Elektrometerns skala var på båda sidor om nollpunkten indelt i linier, och de följande divergenserna hafva afseende på dubbla linien som enhet. Vid alla dessa försök var flaskan så starkt laddad, att den elektriserade skifvan bragte den andra (mindre sensibla) halmstråelektrometern till 19° å 22° .

Om afståndet mellan skifvorna *A* och *C*, hvilkas diameter var 6 tum, utgjorde 9 lin., fann jag att skifvan *C*, då den ensam vidrördes, meddelade den andra halmstråelektrometern så mycken elektricitet, att pendlarne divergerade $13^{\circ}\frac{1}{2}$. Men om icke allenast *C*, utan äfven förut *B* vidrördes, var den till guldbladelektrometern öfverflyttade elektriciteten så svag, att guldbladen blott divergerade $0^{\circ},8$. Den förra divergensen härrörde från elektricitetsmängden $-m'E$, som *A* ensam band i *C*, ty verkan af den icke vidrörda skifvan *B* kan här betraktas som noll *). Den sednare deremot var endast en följd af skilnaden $-\mu E$ mellan skifvornas *A* och *B* verkningar, sedan *B* blifvit vidrörd. På hvad sätt man än må betrakta divergensernas och elektricitetsmängdernas beroende af hvarandra vid pendelektrometrar, så kan väl af ingen ställas i fråga, att icke de sednare åtmin-

*) Vid andra försök blef skifvan *A* utbytt mot en annan, på hvilken voro fästade stänger af den dubbla höjden, och *B* alldeles borttagen. Resultatet var, som man kunde vänta, knappt märkbart skiljaktigt från det förra.

stone tilltaga lika hastigt som de förra. Genom försök fann jag, att samma elektricitetsmängd i en af skifvorna, som bragte guldbladsselektrometren på 3° , bragte den första (sensibla) halmstråelektrometren nära på $3^\circ\frac{1}{4}$. Alltså blir $0^\circ,8$ på den förra ungefär lika med $0^\circ,9$ på den sednare. Men $13^\circ\frac{1}{4}$ på den andra halmstråelektrometren, reducerade till den förstas mått, utgöra $67^\circ\frac{1}{4}$. Häraf följer således, att $m''E$ åtminstone är 75 gånger större än $-e$ eller μE . Alltså öfverstiger bråket $\frac{-e}{m''E} = \frac{\mu}{m''}$ säkerligen icke $\frac{1}{75}$. Men det blir ännu mycket mindre, om skifvan B föres närmare A eller C , hvilket af det föregående är klart, och deraf följer, att redan vid ett afstånd af 9 lin. mellan sex tums skifvorna A och C , kan skilnaden mellan m'' och mm' , då icke är fråga om någon stor noggrannhet, negligeras emot m'' .

Härefter blef afståndet mellan A och C förminskadt till hälften af det förra. Jag fann divergensen, då endast C vidrördes, 16° på den andra halmstråelektrometren, och då både B och C vidrördes, blott $0^\circ,3$ på guldbladelektrometren. Då 16° på den andra halmstråelektrometren, reducerade till den förstas mått, utgöra 80° , deremot $0^\circ,3$ på guldbladelektrometren på nämnda elektrometer utgör ungefär $0^\circ,34$, så kan $\frac{\mu}{m''}$ säkerligen icke öfverstiga $\frac{0,34}{80} = \frac{1}{235}$, hvilket bråk är vida mindre, än det förra, nemligen $\frac{1}{75}$. Alltså begår man ett ännu vida mindre fel, om man vid $4\frac{1}{4}$ lin. afstånd mellan skifvorna A och C antager $m'' = mm'$, än vid 9 lin. afstånd.

Jag ansåg icke nödigt, att fortsätta försöken vid ännu mindre afstånd mellan skifvorna. Man finner nemligen lätt, att förhållandet $\frac{\mu}{m''}$ måste

bli allt mindre, ju mera skifvorna närmas hvarandra, ty man har $\frac{\mu}{m''} = \frac{m'' - m^2}{m''} = 1 - \frac{m}{m'}$, i hvilket uttryck m och m' vid aftagande afstånd allt mera närma sig enheten.

På helt annat sätt förhöll sig saken, då skifvorna ställdes på betydligt större afstånd. Då afståndet mellan A och C utgjorde 2 fot, var den i C bundna elektricitetsmängden, då B icke vidrördes, så liten, att guldbladen blott divergerade $1^{\circ}5$, oaktadt flaskan var lika starkt laddad som förut. Om äfven B vidrördes, gick divergensen likväl till $0^{\circ}9$, alltså till mer än hälften af den förra. Oaktadt således skillnaden mellan storheterna m'' och mm' i sig sjelf alltid är ganska liten, blir den likväl vid stora afstånd mellan skifvorna relativt ganska betydlig.

Dylika försök har jag äfven anställt med skifvor på 3 tums diameter. Här fann jag förhållandet mellan μ och m'' större än med skifvorna på 6 tum vid samma afstånd. Om flaskan var så starkt laddad, att den meddelade skifvan A en elektricitetsmängd, som bragte den andra halmstråelektrometren ungefär på 22° , så erhöll C , hvars afstånd från A var 9 lin. då den ensam vidrördes, så mycken elektricitet, att halmstråna divergerade 11° . Blef äfven B vidrörd, gingo guldbladen $1^{\circ}8$ från hvarandra. Förhållandet mellan dessa divergenser, reducerade till samma mått, utgör ungefär $\frac{1}{7}$, alltså betydligt mera, än med 6 tums skifvorna, vid samma afstånd. Blefvo A och C ställda på ett afstånd af 2 fot, försvagades den i C bundna elektriciteten, genom vidröring af B , endast obetydligt. Jag erhöll vid enkla vidröringen $0^{\circ}8$ och vid den dubbla $0^{\circ}7$ på guldblads-elektrometren. Här närmar sig således bråket $\frac{\mu}{m''}$

ganska betydligt till enheten, och detta blir ännu mera fallet vid ännu större afstånd.

Af det föregående inses således, att förhållandet $\frac{\mu}{m'}$, då B står midt emellan A och C , eller då $m=m'$, blir allt mindre, ju mera skifvorna närmas hvarandra. Deremot närmar sig $\frac{\mu}{m'}$, enligt erfarenheten, småningom enheten, då afståndet bli större och större. Detsamma kan äfven theoretiskt ådagaläggas, som nedanför skall visas. Står B icke i midten, utan närmare A eller C , så är m' olika med m , och man har $\frac{\mu}{m'} = \frac{m''-mm'}{m'} = 1 - \frac{m'}{m}$. Om B föres allt närmare A eller C , närma sig m , och m' i båda fallen till likhet, och således $\frac{\mu}{m'}$, huru stort afståndet må vara mellan A och C , till noll. Hvad förhållandet $\frac{\mu}{mm'}$ beträffar, så är detsamma vid alla de tillfällen litet, då $\frac{\mu}{m'}$ sjelf är litet, ty man har $mm' = m'' - \mu$, och följaktligen $\frac{\mu}{mm'} = \frac{\mu}{m'' - \mu}$. Om således μ kan negligeras emot m'' , så öfvergår $\frac{\mu}{mm'}$ till $\frac{\mu}{m''}$. Annorlunda förhåller saken sig, då μ börjar blifva större i jemförelse med m'' . Under det μ närmar sig m'' , försvinner nämnaren $m'' - \mu$ småningom, och $\frac{\mu}{mm'}$ närmar sig det oändliga, eller med andra ord, det omvända fallet inträffar, att mm' sjelf försvinner mot μ .

Man inser således, att när skifvornas diameter är 6 tum, kan man vid vanliga tillfällen negligera μ emot mm' , eller antaga $m'' = mm'$, om afståndet mellan de yttersta af de tre skifvorna

icke öfverstiger 9 lin. Huruvida detta äfven är tillåtet vid större afstånd, beror på omständigheterna, och måste för hvarje fall undersökas. Med skifvor på 3 tums diameter förhåller sig saken redan annorlunda än med 6 tums skifvorna, som försöken utvisa, ty här är fördelnings-coefficienten vid samma afstånd märkligt mindre. Ofvanstående resultater blifva derföre obrukbara för skifvor, hvilkas storlek betydligt afviker från de här uppgifna, så vida fördelnings-coefficienternas beroende af skifvornas diametrar icke är bekant. Jag har derföre bemödat mig, att bestämma detta beroende på följande sätt:

Jag antager, att två lika stora skifvor A och B stå midt emot hvarandra vid ett gifvet afstånd a . Om elektricitetsmängden E blifvit meddelad skifvan A , och fördelnings-coefficienten, som motsvarar a är m , så erhåller B , sedan den blifvit afledande vidrörd, elektricitets-mängden $-mE$. Tänker man sig ytorna af A och B delade i ett ganska stort antal n ganska små delar, så kan man betrakta dessa delar som enkla punkter. Alltså äro samtliga elektriska krafterna, som utgå från dessa delar, och verka på hvilken som helst elektrisk punkt P i A eller B , i jemvig. Låt vidare A' och B' föreställa tvenne andra skifvor af dubbelt så stor diameter och tjocklek, som de förra, hvilka stå midt emot hvarandra vid dubbla afståndet $2a$. Jag antager, att till skifvan A' blifvit meddelad elektricitets-mängden E , och till B' mängden $-mE$, och föreställer mig, att dessa elektriciteter äro på samma sätt utbredda på ytorna af A' och B' , som på ytorna af A och B . Tänker man sig vidare de förra ytorna på alldeles enahanda sätt, som de sednare, delade i antalet n ganska små delar, så eger hvilken som

helst af dessa delar jemt så mycken elektricitet, som den densamma till läget motsvarande del i A och B . Om således P' betecknar en punkt i A' eller B' , som med P eger ett homologt läge, så verka lika stora elektricitets-mängder vid dubbelt så stora afstånd på P' som på P . Hvar och en af de på P' verkande, från de små delarne af ytorna på A' och B' utgående elektriska krafter, är derföre fyra gånger-svagare, än den motsvarande kraft, som verkar på P , och bildar tillika med en genom P' dragen fast linea samma vinkel som den sednare kraften med en genom P dragen linea, som med den förra har ett homologt läge. Då således de på P verkande krafterna äro i jemvigt, så är detta uppenbart äfven händelsen med de krafter som verka på P' . Alltså binder elektricitetsmängden E i A' mängden $-mE$ i B' och följaktligen är m äfven i detta fall fördelnings-coefficienten. Häraf följer omedelbart, att fördelnings-coefficienten vid ett gifvit afstånd mellan tvenne skifvor är lika med fördelnings-coefficienten vid ett annat gifvet afstånd mellan tvenne andra skifvor, om skifvornas afstånd förhålla sig som diametrarne. Till följe häraf blir således lätt, att begagna ofvan anförda resultat af försöken med skifvorna på 6 och 3 tum äfven för andra dimensioner. Allt hvad som gäller för skifvorna på 6 tum vid afståndet a , gäller nemligen för de på 12 tum vid $2a$, för de på 18 tum vid $3a$, för de på 2 tum vid $\frac{1}{3}a$ afstånd o. s. v. Tjockleken kommer nemligen föga i betraktande, så vida den ej är betydlig.

Då det således är bevist, att m'' är föga skiljaktig från mm' , om afståndet mellan skifvorna A och C icke öfverstiger $\frac{1}{2}$ till $\frac{1}{4}$ af deras diameter, och detta gäller för hvarje ställning af skif-

van B mellan A och C , så är klart, att afståndet inom samma gränser utan stort fel kunna betraktas som logarithmer till fördelnings-coefficienterna. Redan den omständigheten, att fördelnings-coefficienten närmar sig till enheten, då afståndet närmar sig noll, antyder detta, ty ett dylikt förhållande är icke förenligt med någon relation mellan dessa storheter, när man undantager den logarithmiska. Kallar man således M den vid afståndet b observerade fördelnings-coefficienten, och m fördelnings-coefficienten vid afståndet a , så blir $a:b = \log m : \log M$, hvaraf $\log m = \frac{a}{b} \log M$. Betraktar man här b som afståndets enhet, blir helt enkelt $\log m = a \log M$. Denna formel, som vid små afstånd är nära exact, blir mer och mer felaktig, ju större a tages och slutligen obrukbar. Det är derföre sannolikt, att den logarithmiska relationen mellan afstånd och fördelnings-coefficienter så småningom öfvergår till en annan, som blir exact för mycket stora afstånd. Det blir icke svårt att finna denna relation. Jag antager, att den icke isolerade skifvan B är ställd på så stort afstånd från A , att bådas diameter i jämförelse mot detta kan betraktas som en försvinnande storhet. Blir A elektriserad, så verka alla från de elektriska punkterna i A utgående krafterna på en punkt P i B nästan i samma riktning vinkelrätt mot B , och deras resultant blir summan af alla krafterna. Resultanten af de elektriska krafter, som härröra från elektriciteten i B och verka på samma punkt P , verkar derföre äfven rätvinkligt mot B i motsatt riktning. Ställes nu B på dubbla afståndet, ändrar sig, som man lätt inser, riktningen af de från A utgående på P verkande krafterna icke märkbart, och de-

ras resultant verkar därför i den förra riktningen, men fyra gånger svagare. Föreställer man sig, att B numera endast innehåller $\frac{1}{4}$ af den förra elektricitetsmängden, som på samma sätt som denna är utbredd på ytan, så är klart, att resultanten af de på P verkande krafterna, som härröra från denna elektricitet, är till riktningen lika med den förra, men till storleken endast $\frac{1}{4}$ af densamma, och därför måste den noga motvägas af resultanten af de från A kommande krafterna, som verka på samma punkt. Alltså blir vid dubbla afståndet mellan A och B fyra gånger mindre elektricitet bunden, än vid det enkla, eller allmännare uttryckt, förhålla sig fördelnings-coefficienterna omvänt som qvadraterna af afstånden, då dessa äro mycket stora emot skifvornas diametrar.

Häraf kan bevisas, att vid stora afstånd mellan skifvorna A och C , försvagar den i midten inskjutna icke isolerade skifvan B knappast verkan af A på C , eller hvad som är detsamma, att förhållandet $\frac{\mu}{m''}$ ganska litet afviker från enheten, en omständighet, som redan är ådagalagd på experimentel väg. Man har nemligen för detta fall $\frac{\mu}{m''} = \frac{m'' - m^2}{m''} = 1 - \frac{m}{m_1}$. Här är m , den i C af A bundna elektricitetens förhållande till den i B bundna. Men, enligt nyss anförda bevis, är den förra vid stora afstånd fyra gånger mindre till myckenhet, än den sednare, således $m'' = \frac{1}{4}m$, hvaraf $\frac{m''}{m} = m$, $= \frac{1}{4}$. Således blir $\frac{\mu}{m''} = 1 - 4m$, hvilket uttryck ganska obetydligt afviker från 1, emedan m och äfven $4m$ här är ganska liten mot enheten.

En särskilt händelse med afseende på de tre skifvorna förtjenar att närmare undersökas, nemligen då en af skifvorna A , är elektriserad, under det de båda öfriga, B och C , äro ställda på motsatta sidor om A och förenade med jorden. Huru mycken elektricitet i detta fall bindes i B och C är icke så lätt att inse. I det föregående är visadt, att elektricitetsmängden i B är summan af de elektricitetsmängder, hvilka A och C binda i B , och elektricitetsmängden i C summan af de elektricitetsmängder, hvilka A och B binda i C . Således kan man icke omedelbart bestämma den ena af dessa elektricitetsmängder, då man icke på förhand känner den andra. Betecknar man derföre de i B och C bundna elektricitetsmängderna, såsom obekanta, med x och y , och kallar fördelningscoefficienterna, som motsvara afstånden mellan A och B , A och C , B och C , m, n, r , och E elektricitetsmängden i A , så måste B binda $-rx$ i C , och C mängden $-ry$ i B . Men A binder $-mE$ i B , och $-nE$ i C , hvaraf man erhåller:

$$x = -mE - ry, \quad y = -nE - rx.$$

Dessa båda eqvationer bestämma x och y . Om värdet på y ur den andra eqvationen införas i den första, blir $x = -mE + nrE + r^2x$, hvaraf

$$x = -\frac{m-nr}{1-r^2} \times E \dots (1).$$

På samma sätt erhåller man

$$y = -\frac{n-mr}{1-r^2} \times E \dots (2).$$

Genom de i B och C bundna elektriciteternas återverkan bindes $-mx - ny$ i A , och således blir den i A återstående fria elektricitetsmängden $E +$

$mx + ny$. Kallar man densamma z och substituerar de nyss fundna värdena på x och y , erhålles:

$$z = \frac{1 - m^2 - n^2 - r^2 + 2mnr}{1 - r^2} \times E \dots (3).$$

Emedan r i dessa formler är fördelningscoefficienten för summan af afstånden, hvilkas fördelningscoefficienter äro m och n , så lider noggrannheten föga, om man vid smärre afstånd mellan B och C , inför mn i stället för r . Vid större distanser, isynnerhet om B och C stå ungefär lika långt från A , blir $r - mn$ d. ä. μ i jämförelse med mn visserligen betydligare, men ju mindre m och n blifva, desto mer försvinner i formeln (1) nr emot m och r^2 emot 1, ty man har alltid r mindre än m och n . Om, vid oförändradt afstånd mellan B och C , endast A föres närmare B , så blir $\frac{\mu}{mn}$, som förut är visadt, allt mindre, m i täljaren af formeln (1) tager till, deremot nr af, under det nämnaren förblifver constant. Alltså blir felet beständigt mindre, då man inför mn i stället för r . Detta är likväl icke fallet, då den medleista skifvan A närmas C , ty då aftager m , och nr tilltager, och om afståndet mellan C och A är obetydligt mot afståndet mellan B och A , blir r föga skiljaktig från m . Substituerar man således m för r i formeln (1), och bortkastar r^2 i nämnaren, blir $x = -m(1 - n)E$. Blir deremot mn införd i stället för r i (1) och r^2 negligeras, öfvergår x till $-m(1 - n^2)E$. Kallar man detta värde på x för x' , blir $x : x' = 1 - n^2 : 1 - n = 1 + n : 1$, och båda värdena afvika märkbart från hvarandra. Om man således undantager detta enda fall, så kan man utan stort fel antaga $r = mn$ i formeln (1) vid hvarje ställning af skifvorna A , B och C . Hvad här blifvit yttradt om den första formeln,

gäller äfven om den andra, om man endast för-
vexlar m och n , B och C . Införes i tredje for-
meln mn för r , är felet vid hvarje tillfälle en-
dast ringa, ty vid små afstånd mellan B och C ,
är r föga skiljaktig från mn , och vid större för-
svinna n^2 och $2mnr$ mer eller mindre mot en-
heten.

Införes mn i stället för r i de tre formlerna,
så öfvergå de till följande:

$$x = -\frac{m(1-n^2)}{1-m^2n^2} \times E \dots (4), \quad y = -\frac{n(1-m^2)}{1-m^2n^2} \times E \dots (5).$$

$$z = \frac{(1-m^2)(1-n^2)}{1-m^2n^2} \times E \dots (6).$$

Emedan $n^2 < 1$, $m^2 < 1$ och $m^2n^2 < 1$, så äro täl-
jare och nämnare i alla tre formlerna positiva.
Alltså äro de i B och C bundna elektriciteterna,
som man lätt kunde förutse, olikartade, deremot
den fria i A likartad med E . Alldenstund $m^2n^2 < n^2$,
är $\frac{1-n^2}{1-m^2n^2} < 1$, och $\frac{m(1-n^2)}{1-m^2n^2} E < mE$, eller den i B
bundna elektricitetsmängden är mindre än den
mängd, som bindes i B , sedan C blifvit aflägs-
nad. På samma sätt kan bevisas, att $\frac{n(1-m^2)}{1-m^2n^2} E < nE$.
Ju mera den ena skifvan B närmas skifvan A ,
desto mera tilltager dess bundna elektricitet, ty
 m i täljaren till formeln (4) blir större, och $1-m^2n^2$
i nämnaren mindre. Deremot aftager den bundna
elektriciteten i C , ty $1-m^2$ i täljaren till formeln
(5) närmar sig noll, under det $1-m^2n^2$ i nämna-
ren närmar sig $1-n^2$. Emedan $(1-m^2)E$ i form-
len (6) är multiplicerad med $\frac{1-n^2}{1-m^2n^2}$, så följer der-
af, att den fria elektricitetsmängden i A är min-
dre än den mängd elektricitet, som blir fri i A ,
sedan C blifvit borttagen. Deraf synes äfven, att
om C närmas till A , eller aflägsnas derifrån, så

af- eller tilltager den fria elektriciteten i A i samma förhållande, som den bundna i B .

Om i formlerna (1), (2), (3), eller (4), (5), (6), m eller n antages lika med noll, så återfår man de formler, som gälla för det fall, då skifvorna äro endast tvenne. Är $n=m$, eller B och C lika långt från A , så öfvergå formlerna (4), (5), (6), till $x=y=-\frac{m(1-m^2)}{1-m^4}E=-\frac{m}{1+m^2}E$, och $z=\frac{(1-m^2)^2}{1-m^4}E=-\frac{1-m^2}{1+m^2}E$. Emedan $1+m^2 < 2$, är $\frac{m}{1+m^2}E > \frac{1}{2}mE$ och $\frac{2m}{1+m^2}E > mE$. Då således skifvorna B och C äro lika långt aflägsna ifrån A , är summan af de i båda bundna elektricitetsmängderna alltid större än den elektricitetsmängd, som endast bindes i endera, sedan den andra blifvit borttagen. Är m blott helt liten, så närmar sig $\frac{2m}{1+m^2}E$ till och med till $2mE$, och nära dubbelt så mycken elektricitet blir bunden i första som i andra fallet. Emedan $1+m^2$ tillika är nämnare i det motsvarande värdet på z , så inses, att den fria elektricitetsmängden för detta fall är större, än hälften af den fria mängden i A , om blott endera af skifvorna B och C är tillstädes. För öfrigt närmar den sig mer och mer noll, ju närmare B och C rycka mot A .

Adderar man formlerna (4) och (5), så erhålles $x+y=-\frac{m(1-n^2)+n(1-m^2)}{1-m^2n^2}E=-\frac{m+n}{1+mn}E$. Antager man här den ena n af fördelningscoefficienterna constant, och differentierar i anseende till den andra m , blir $d(x+y)=-\frac{1-n^2}{(1+mn)^2}Edm$. Emedan m icke förekommer i täljaren, så blir differentialcoefficienten aldrig noll, och hvarken maximum eller minimum inträffar. Häraf följer, att summan $x+y$ måste oupphörligt vexa, då m tilltager

från noll till 1. Men då $m=0$, blir $x+y=-nE$ och då $m=1$, blir $x+y=-E$. Alltså är summan af de i B och C bundna elektricitetsmängderna alltid större än den elektricitetsmängd, som endast bindes i en af skifvorna, sedan den andra blifvit borttagen, men mindre än elektricitetsmängden i A .

Då $n=m$, blir $x+y=-\frac{2m}{1+m^2}E$, och $d(x+y)=-\frac{2(1-m^2)}{(1+m^2)^2}Edm$. Här blir differential-coefficienten noll, då $1-m^2=0$, hvaraf $m=\pm 1$. Alltså inträffar maximum då $m=1$, eller då skifvorna B och C äro i fullkomlig beröring med A . Om i föregående formel införes enheten i stället för m , så öfvergår $x+y$ till $-E$. Men då detta värde motsvarar ett maximum, så afviker summan af de i B och C bundna elektricitetsmängderna blott ganska obetydligt från $-E$, om båda skifvorna, med bibehållande af det lika afståndet från A , ändra sitt läge i närheten af A . Antag att $m=\frac{1}{2}$, så blir $x+y=-\frac{2}{3}E$, alltså blott $\frac{1}{3}E$ mindre, än vid fullkomlig beröring.

Om skifvorna B och C isolerade ställas på gifna afstånd från A , och sedan afvexlande vidröras, så närmar sig skifvornas elektriska tillstånd småningom det tillstånd, som i ögonblicket inträder, då de på en gång afledande vidröras. Beräknar man de fria och bundna elektriciteternas successiva förändringar i skifvorna, hvilka vid hvarje beröring ega rum, under den förutsättning, att den elektricitet som bindes från ett håll i A , är overksam åt det andra, så uppstå aftagande geometriska serier, hvilkas gemensamma exponent är m^2n^2 . Genom summering af dessa serier återfår man precis de formler, som äro be-tecknade med (4), (5) och (6); men i anseende

dertill, att beräkningen är något vidlyftig, förbigås den här.

Formlerna (1), (2) och (3) gälla äfven då B och C ställas på samma sida om A , blott man fäster behörigt afseende derpå, att r för detta fall antager ett helt annat värde; ty här blir r icke fördelnings-coefficient för summan, utan för skillnaden mellan de afstånd, hvilkas fördelnings-coefficienter äro m och n . Antager man här, att C är ställd längre än B från A , så står C i elektriska skuggan af B , och formeln (2) uttrycker den elektricitetsmängd, som vid liktidig beröring af båda skifvorna bindes i C . Emedan täljaren $n-mr$ här är samma storhet, som i det föregående blifvit betecknad med μ , och nämnaren $1-r^2 < 1$, så är alltid $y > -\mu E = e$, eller mera elektricitet bindes vid den liktidiga, än vid den afvexlande vidröringen af B och C . Emedan $\frac{y}{e} = \frac{1}{1-r^2}$, så inses, att y och e äro nära lika stora, då C är så aflägsen från B , att r^2 är föga skiljaktig från noll. Men ju mera C närmas till skifvan B , desto mera närmar sig r till enheten, och $1-r^2$ till noll. Vid mycket ringa afstånd försvinner derföre e nästan alldeles mot y , hvilken omständighet äfven erfarenheten bekräftar, som förut är visadt. Emedan förhållandet $\frac{1}{1-r^2}$ är oafhängigt af m , så måste det förblifva detsamma, då B och C , utan att förändra sin inbördes ställning, närmas till eller aflägsnas från A . Erfarenheten visar, att y ganska långsamt aftager om C , vid orubbad ställning af A och B , aflägsnas från skifvan B . Orsaken ligger deri, att både täljaren $n-mr$ och nämnaren $1-r^2$ i detta fall småningom ökas. Formlen (1) anger den elektricitetsmängd, som bindes i B vid liktidig beröring af B och C . Då

$-mE$ är mängden af den vid afvexlande vidröring bundna elektriciteten, så blir $\frac{x}{-mE} = \frac{m-nr}{m-mr^2}$. Emedan $n > mr$, så är $nr > mr^2$, och $m-nr < m-mr^2$. Följaktligen är äfven $x < -mE$ d. ä. mindre elektricitet bindes i B vid liktidig, än vid afvexlande vidröring af B och C . Ju mera C aflägsnas från A och B , desto mera närma sig x och $-mE$ till likhet, ty nr och mr^2 försvinna mer och mer mot m .

Ju mera skifvorna B och C närmas hvarandra, desto mera närma sig m och n till likhet och r till enheten. Slutligen inträffar verklig vidröring, och båda skifvorna äro att anse som blott en enda skifva, hvars elektricitet är samlad på de utvändiga ytorna. Det är således klart, att om en icke isolerad skifva B' är ställd på visst afstånd från den elektriserade skifvan A , kan man föreställa sig, att den mot A vända ytan af B' är skifvan B , deremot att den fränvända är C . Om man således betraktar tjockleken af skifvan B' såsom afståndet mellan skifvorna B och C , som här antagas oändligt tunna, så blifva elektricitetsmängderna på båda ytorna af B' representerade genom formlerna (1) och (2). Om man derföre i dessa antager $m=n$, så synes det som de deraf härledda värdena på x och y skulle uttrycka dessa mängder desto nogare, ju tunnare skifvan är. Men då $m=n$, är äfven $r=1$, och ofvannämnda formler öfvergå till $x = -\frac{c}{o}$, $y = -\frac{c}{o}$. Sätter man i formeln (2) $n=mm$, så blir $y = -\frac{m(m,-r)}{1-r^2}E$, i hvilken formel m , desto mindre afviker från enheten, ju närmare B och C stå intill hvarandra. Antag att $1-r=\omega$ och $1-m=\omega'$, så blir $r=1-\omega$ och $m=1-\omega'$. Om dessa värden införas i den sista for-

meln, och expressionen på högra sidan upplöses i factorer, så öfvergår den till $y = -\frac{m}{2-\omega} \cdot \frac{\omega-\omega'}{\omega} E$. Här är värdet på factorn $\frac{m}{2-\omega}$ alltid bestämdt, och endast den andra $\frac{\omega-\omega'}{\omega}$ öfvergår till $\frac{0}{0}$, då $r = 1$. Ju mera r närmar sig enheten, desto mindre blir, som icke är särdeles svårt att inse, ω' mot ω . Alltså måste förhållandet $\frac{\omega-\omega'}{\omega}$, under det ω och ω' öfvergå till noll, nå en gräns, som är mindre än enheten, och följaktligen är gränsvärdet på $\frac{\omega-\omega'}{\omega} = 1 - \frac{\omega'}{\omega}$ inneslutet mellan noll och enheten. Kallar man q gränsen af $\frac{\omega'}{\omega}$, och y' det värde på y , som motsvarar denna gräns, så blir $y' = -\frac{m}{2}(1-q)E$, alltså $y' < -\frac{m}{2}E$. Ofvananförda öfverensstämmer ganska väl med erfarenheten, ty huru tunn än skifvan B' må vara, så är likväl, vid icke allt för stora afstånd, elektricitetsmängden i den fränvända ytan alltid mycket ringare, än i den åtvända, och förändrar sig icke märkbart, då tjockleken aftagit öfver en viss grad. Den förra blir därför för detta fall ganska nära uttryckt genom $-\frac{m}{2}(1-q)E$, i hvilken expression $1-q$ vanligen är mycket mindre än enheten, och följaktligen q temligen nära densamma. Ju närmare skifvan B' föres intill A , desto mera tilltager ω' och närmar sig till ω , och följaktligen $1-q$ till noll. Vid mycket små afstånd kan man således anse den på fränsidan af B' samlade elektriciteten som noll. Blir afståndet ökad, så aftager ω' beständigt, under det ω förblifver constant, och den förra försvinner nästan alldeles mot ω vid stora afstånd. Alltså aftager gränsen q

småningom, och den på fränsidan af B' bundna elektriciteten närmar sig till $-\frac{m}{2}E$. Detsamma följer äfven af formeln $y = -\frac{n-mr}{1-r^2}E$, ty om B och C äro betydligt aflägsna från A , kan man antaga m och n lika stora, oaktadt r märkbart afviker från enheten. Inom de gränсор af afstånden, mellan B och C , för hvilka detta är tillåtet, blir således $y = -\frac{m(1-r)}{1-r^2}E = -\frac{m}{1+r}E$, hvilket uttryck kommer $-\frac{m}{2}E$ så mycket närmare, ju mindre r afviker från enheten. Men då hela mängden af den i B' bundna elektriciteten är $-mE$, så är den åtvända ytans elektricitetsmängd äfven $-\frac{m}{2}E$, och följaktligen närma sig elektricitetsmängderna i båda ytorna så mycket mera till likhet, ju mera B' är aflägsen från A . Detta bekräftas äfven af erfarenheten, som redan är anmärkt s. 384.

Om man i formeln (1) gör samma substitutioner som i (2), så öfvergår den till $x = -\frac{m}{2-\omega} \cdot \frac{\omega+\omega'-\omega\omega'}{\omega}E$. Här är den ena factorn $\frac{m}{2-\omega}$ alltid bestämd, liksom i föregående fall, och endast den andra $\frac{\omega+\omega'-\omega\omega'}{\omega}$ öfvergår till $\frac{\sigma}{\sigma}$ då ω och ω' försvinna. Under det afståndet mellan B och C blir allt mindre, så försvinna småningom $\omega\omega'$ emot ω och ω' , och ω emot 2, deremot uppnår $\frac{\omega'}{\omega}$ gränsen q , som är mindre än enheten, och följaktligen är gränsvärdet till $\frac{\omega+\omega'}{\omega} = 1+q$ alltid >1 , men <2 . Kallar man värdet på x , som motsvarar denna gräns, x' , så blir $x' = -\frac{m}{2}(1+q)E$, och således är elektricitetsmängden i den åtvända ytan af B' alltid större än hälften af hela den

mängd, som blir bunden i B' . Vid mycket små afstånd mellan B' och A , är 1 gränsen till $\frac{\omega'}{\omega}$, och vid mycket stora öfvergår den till noll. I första fallet blir således $x' = -mE = -E$, eller all elektricitet samlar sig på främre ytan af B' , och i andra fallet blir $x' = -\frac{m}{2}E$, eller lika med hälften af hela elektricitetsmängden i B' , som man lätt kunde förutse.

Summerar man de båda transformerade värdena på x och y , så blifver $x+y = -\frac{m(2\omega-\omega\omega')}{(2-\omega)\omega}E = -\frac{m(2-\omega')}{2-\omega}E$. Då B och C äro hvarandra ganska nära, så försvinna ω och ω' emot 2, och man erhåller $x+y = -mE$. Stå de deremot ganska långt från hvarandra, så kan man antaga ω och ω' lika med enheten, och man erhåller å nyo $x+y = -mE$. För alla andra afstånd är deremot $x+y > -mE$, ty $\omega > \omega'$, och foljaktligen $\frac{2-\omega'}{2-\omega} > 1$. Men alldenstund ω och ω' närma sig mer och mer till likhet, ju större de blifva, så inses, att $\frac{2-\omega'}{2-\omega}$ vid tilltagande afstånd föga kan afvika från enheten, och således $x+y$ föga från $-mE$. Då således C vidröres afledande i grannskapet af den icke isolerade skifvan B , kan man föreställa sig, att en del af den sednares elektricitet öfvergår till C , såsom redan förut är anmärkt.

I det föregående är förutsatt, att de ledande skifvorna ega en cirkelrund form. Skulle de deremot vara fyrkantiga, eller annorlunda formade, så äro fördelningsfenomenerna, som erfarenheten visar, i hufvudsaken desamma, om skifvorna blott äro lika stora och så ställda, att de rätta linier, som förena lika belägna punkter äro vinkelräta

mot ytorna. Till och med då ytorna äro krokiga, är den s. 389 framställda theorien och till och med equationerne (1)....(6) ännu användbara, om blott afståndet mellan tvenne motstående ytor är obetydligt och öfverallt detsamma. Om den elektriserade skifvan är en oledare, så verkar den nästan på samma sätt som en ledande, fördelande på de afledande vidrörda skifvorna, blott dess elektricitet är någorlunda jemt utbredd på ytan, ty vid små afstånd utbreder sig elektriciteten äfven på ytan af en ledande skifva jemt, och vid större afstånd är utbredningen nästan likgiltig.

Den ofvanföre med afseende på tre skifvor framställda fördelningstheori innehåller grunden för förklaringen af elektroforens fenomen, som här i korthet skall visas. Elektroforen består, som bekant är, af tre delar, nemligen den elektriserade hartzkakan, den nedra beläggningen eller formen, och en ledande skifva kallad locket. Hartzkakan står här i midten, och verkar fördelande så väl på formen, som locket. Således är klart, att detta fall är analogt med det fall, då skifvorna *B* och *C* äro ställda på motsatta sidor om *A*. Jag antager derföre, att *A* föreställer hartzkakan, eller snarare dess öfre yta, *B* dess nedre beläggning, och *C* locket, som jag anser vara af samma, eller nära samma storlek med hartzytan och nedra beläggningen.

Jag antager, att negativ elektricitet genom gnidning som vanligt blifvit uppväckt i hartzkakan, hvilken elektricitet jag betecknar med $-E$. Denna binder i nedra beläggningen elektricitetsmängden mE , och mE binder tillbaka i öfra hartzytan $-m^2E$. Alltså blir här fri $-(1-m^2)E$.
Blir

Blir locket isolerad t på hartzkakan, kan man föreställa sig, att endast den fria elektriciteten $-(1-m^2)E$ verkar fördelande på detsamma, emedan de bundna elektriciteterna i B och A i det närmaste upphäfvat hvarandras verkningar på C , som ofvanföre är visadt. I locket blir således $n(1-m^2)E$ bunden, hvilken elektricitet blott ganska litet afviker från $(1-m^2)E$, emedan n i anseende till det ringa afståndet kan antagas lika med enheten. Förutsatt detta, blir $-(1-m^2)E$ fri i locket. Blir locket afledande vidrördt, bortgår negativ elektricitet, och de bundna elektricitetsmängderna i nedra beläggningen och locket representeras genom formlerna (4) och (5), när tecknet ombytes på högra sidan. Men då $n=1$, blir $x=0$ och $y=E$, hvaraf synes, att den bundna elektriciteten i nedra beläggningen nästan försvinner genom vidröringen, då deremot lockets bundna mängd blir lika stor med hartzkakans elektricitetsmängd. Då således locket förlorar negativ och den nedra beläggningen positiv elektricitet, kännes ett elektriskt slag genom dessa motsatta elektriciteters plötsliga förenig, om de förra ledande förenas med handen. Upplýstes locket isolerad t, blir dess bundna positiva elektricitet E fri, och det slår en stark gnista till en närmad ledare.

Om elektroforens basis innan lockets påsättande är isolerad, bindes i detta sednare som förut $(1-m^2)E$ och $-(1-m^2)E$ sättes i frihet. Vidröres locket ensamt, så försvinner dess fria elektricitet $-(1-m^2)E$ och den kvarblifvande bundna binder tillbaka i hartzkakan $-(1-m^2)E$, och således blir här all elektricitet bunden. Men då $(1-m^2)E$ i locket och $-(1-m^2)E$ i hartzytan upp-

häfva hvarandras verkningar i nedra beläggningen, så verkar endast $-m^2E$ i hartzytan fördelande på densamma, och binder $+m^3E$. Men hela kvantiteten bunden elektricitet i nedra beläggningen är mE , och således blir här $mE - m^3E = m(1 - m^2)E$ fri. Upplyfter man nu locket isoleradt, så blir endast dess bundna elektricitet $(1 - m^2)E$ satt i frihet, och locket befinnes således vida svagare elektriseradt än i förra händelsen. Sätter man locket åter isoleradt på hartzkakan, och vidrör nedra beläggningen och locket på en gång, så är elektriska tillståndet i alla tre elektroforens delar precis detsamma, som före isoleringen af dess basis. Om således locket isoleradt upplyftes, blir $+E$ fri i detsamma, men strax binder $-E$ i hartzytan $+mE$ i nedra beläggningen och $-mE$ sättes i frihet. Häraf inses, att ju tjockare hartzkakan är, desto mindre är den nedra beläggningens fria negativa elektricitetsmängd i jämförelse med det upplyftade lockets fria positiva. Emedan de motsatta elektriciteterna mE och $-mE$ i nedra beläggningen nära upphäfva hvarandras verkningar, så blir nästan hela elektricitetsmängden i hartzkakan fri, sedan locket blifvit upplyftadt, hvilket skönjes deraf, att densamma slår vida starkare gnistor mot närmade ledare, än då elektroforens basis icke är isolerad.

Om locket icke är i noga beröring med hartzytan, eller beröringen är upphäfd genom små oledande kroppar, som med afsigt blifvit lagda mellan ytorna, så kan n och ännu mera n^2 märkligt afvika från enheten, och elektriciteter i det afledande vidrörda och sedan isoleradt upplyftade locket uttryckes, då elektroforens basis icke är isolerad, genom $\frac{n(1-m^2)}{1-m^2n^2}E$. Antager man här $n = 1 - \omega$, och substituerar detta värde på n i föregående

expression, så förvandlas den, när ω^2 bortkastas, till $\frac{(1-\omega)(1-m^2)}{1-m^2+2\omega m^2}E$. Om n här är så nära enheten, att icke allenast ω kan negligeras mot densamma, utan äfven $2\omega m^2$ mot $1-m^2$, så öfvergår expressionen i det närmaste till E och en ännu fullkomligare beröring mellan locket och hartzytan förökar icke verkan märkbart. Men om m själf icke betydligt afviker från enheten, så kan ω vara ganska liten mot densamma, oaktadt likväl $2\omega m^2$ jemförd med $1-m^2$ är betydlig nog. Här af följer således, att den icke fullt noga beröringen mellan locket och hartzytan skadar elektroforens verkan desto mera, ju tunnare hartzkakan är. För öfrigt gifver en tunnare kaka, vid god beröring mellan ytorna, äfven så mycken elektricitet, som en tjockare, och är, i anseende till den ringare mängden fri elektricitet, mera skickad att bibehålla sin kraft.

Till slut vill jag endast bifoga en kort tillämpning af det föregående på elektriska laddglasen. Om E betecknar den elektricitetsmängd, som den ena beläggningen A af en belagd glasskiva erhåller genom förenig med konduktören af en i verksamhet satt elektrisk machin, då den andra beläggningen B är isolerad, så blir $(1-m^2)E$ den föras fria elektricitet, då den sednare, efter afbruten förenig med konduktören, vidröres afledande, förutsatt nemligen, att m är den fördelningscoefficient, som motsvarar glasets tjocklek. Förenas A ånyo med konduktören, under det B står i förenig med jorden, antager A vida mera elektricitet, och tillströmningen slutar ej förr, än den fria elektriciteten åter är E . Detta är nemligen klart deraf, att den fria elektricitetens utbredning i konduktören och A , är nära oberoende af de i A och B bundna elektriciteterna. Kallar man

E' hela mängden tillströmmad elektricitet i A , så blir $E = (1 - m^2) E'$, hvaraf $E' = \frac{E}{1 - m^2}$. Till följe

här af blir $-\frac{m}{1 - m^2} E$ den elektricitetsmängd, som E' binder i B . Jag antager nu, att en med den förra alldeles lika belagd glasskifva blir så lagd på densamma, att de inre beläggningarna noga betäcka hvarandra. Om nu de båda yttre beläggningarna ledande förenas, så uppkommer ett dubbelt laddglas, i hvilket den elektricitet, som meddelas de inre beläggningarna, verkar fördelade åt båda hållen, och binder motsatt elektricitet i de båda yttre. Förenas de förra med machinens konduktör, då de sednare äro isolerade, så erhålla de elektricitetsmängden E . Vidrör man, efter afbruten förenig med konduktören, de yttre beläggningarna afledande, så blir, då glaset äro lika tjocka och lika till beskaffenhet, $\frac{1 - m^2}{1 + m^2} E$ de inre beläggningarnas fria elektricitet.

Förenas dessa åter med konduktören, då de yttre fortfarande icke äro isolerade, så antaga de ny mängd elektricitet till dess den fria elektriciteten åter är E . Om således E'' betecknar hela mängden af elektricitet i de inre beläggningarna, så blir $E = \frac{1 - m^2}{1 + m^2} E''$, och $E'' = \frac{1 + m^2}{1 - m^2} E$.

Men, som s. 412 är visadt, är $-\frac{2m}{1 + m^2} E'$ summan af de bundna elektricitetsmängderna i de båda yttre beläggningarna. Införes här i stället för E' dess värde $\frac{1 + m^2}{1 - m^2} E$, så öfvergår uttrycket på förutnämnda summa till $-\frac{2m}{1 - m^2} E$. Men då den bundna elektriciteten i den enkla glasskifvan vid beläggningen B var $-\frac{m}{1 - m^2} E$, så är klart, att i det dubbla

laddglaset bindes jemt dubbelt så stor mängd elektricitet, som i det enkla, hvaraf således följer, att verkan bör bli dubbelt så stor.

En dylik inrättning af elektriska laddglas synes mig vara fördelaktig vid stora elektriska batterier. Om nemligen flera dylika par glasskifvor ställas tätt intill hvarandra, så kan en betydlig qvantitet belagdt glas inneslutas inom ganska litet rum.

Fyra nya arter af Sötvattens-Crusta- céer från södra Afrika,

beskrifna af

S. LOVÉN.

Till Akademien inlemnadt den 11 Febr. 1846.

Tab. III—VI.

De underrättelser vi hittills ega om främmande verldsdelars Branchiopoder och Entomostraceer äro ganska få och ofullständiga, synnerligen i jämförelse med dem vi hafva ur Crustaceernas högre ordningar. Också äro de förra, ej blott i vårt klimat, utan, som det vill synas, äfven under söderns luftstreck, i allmänhet så små och obetydliga, att de lätt undfalla den mindre uppmärksamme forskaren.

De hittills kända exotiska arterna af sötvattens-Branchiopoder äro snart uppräknade. De äro: *Apus Guildingii* THOMPS., Vestindien, *A. caudatus* SAY, Florida, *Limnadia mauritiana* GUÉR., Mauritius, *L. coriacea* HALD., Nord-America, *Cyzicus Bravaisii* AUD., Algier, *Estheria Dabalacensis* RUEPP., Nubien, "*Branchipus stagnalis* LAMK." GOULD, Massachusetts. Men i denna korta förteckning se vi likväl ingen för Europa främmande släktform, ty *Estheria* och *Cyzicus* äro synonyma, och den art, som AUDOUIN först erhöll från Bona är *Isaura cycladoides* JOLY, hvilken äfven lefver i södra

Frankrike. Och om vi härtill lägga, att *Daphnia* och *Cypris* äro återfunna i Nordamerika, och *Cyclops* på Mauritius, och att bland högre Crustaceer släktet *Astacus* visar sig i alla verldsdelar, *Thelphusa* åtminstone i nästan hela gamla världen, så synes det, att sötvattnens Crustaceer, liksom deras Mollusker, äro utbredda öfver jordytan med en enformighet, som blir särdeles märkbar när den jemföres med den omvexlande mångfald af dessa djurklasser, som hafvet öfverallt erbjuder.

De fyra arter jag här skall beskrifva, förete i detta hänseende ingen betydande afvikelse. De äro en *Cyzicus*, ganska lik *C. Bravaisii* och *Dahalacensis*, en *Limnetis*, ett nytt släkte liknande *Limnadia*, en *Branchipus* som nära slutar sig till sina hittills kända samslägtingar, och en *Broteas* ett nytt genus af *Cyclopernas* familj, som föga afviker från *Cyclopsina*. Dessa äro alla af Herr J. WAHLBERG fångade i Natal-landet, lat. s. 26½°, long. ö. 29°, i några gölar med klart vatten nära den vanliga vägen från Port Natal till Makkalis bergs saltpanna, mellan Krokodil- (Åali) och Ap-floden (Tjoane).

CYZICUS AUD.

Audouin, Ann. de la soc. entomologique, VI, 1837, Bulletin p. x. (Febr. 1837). — *Estheria* RUEFFEL, Museum Senkenbergianum II, 119 (1837). — *Isaura* JOLY, Annales des sciences naturelles, seconde série, XVII, 293.

C. australis n. sp.

Tab. III.

C. rostro producto, spinigero; pedum paribus 21, setis antennarum exteriorum 10—11-articulatis, cauda aculeis circa 13 inæqualibus armata. Long. 3,45 millim., altit. 2,25.

Descr. maris. Caput (fig. 1 a, fig. 2) rostratum, securiforme, deflexum, extra testam vix prominens, postice carinato-scutatum, supra oculos gibbum, antice compressum, laminaceum, angulo acuto terminatum spina armato. — Oculi medii, reniformes, approximati. — Antennæ interiores (primi paris) (fig. 1., b) graciles, sigmoideæ, rostri lateribus insertæ, e pedunculo brevi, et articulis numerosis antice papillis setosis præditis. Antennæ exteriores (fig. 1., c) validæ, sub margine scuti medio capiti insertæ, pedunculo præditæ crasso circ. 13-articulato, art. basali majore, reliquis brevissimis, et setis terminatæ binis, pedunculum superantibus, postice longius setigeris, antica brevior, ex articulis decem, posteriore ex articulis undecim majoribus. — Truncus compressus, triangularis. — Thorax a capite sulco discretus, dein gibbus et annulos præbens nonnullos parum distinctos, tum vero in testam productus bivalvem, (fig. 1, d., fig. 3), compressam, oblongam, natibus præditam prominulis, striisque incrementi octo, imbricatis, dense pilosis, margine piloso. — Annuli pediferi 21 (22?), quorum circiter 16 in dorso distincti, (fig. 1., e, fig. 4), spinisque armati uncinnatis quinque, in annulo 6 et 7 majoribus, media semper eccellente. — Pedes (fig. 5, 6, 7) laminacei, duabus constitutæ partibus, interna et externa. Illa articulis quatuor composita, quorum primus (1) basalis, brevissimus, appendice auctus hamato a, piloso, apice cirriferio; secundus (2) in lobos duos l. tres subdivisus (b, c) laminaceos, margine longe ciliatos. Tertius (3) in pedibus binis anticis copulatoriis (fig. 5, d) major, subquadratus, angulo interno inferiore in capitulum productus setosum (d), cui inseritur appendix digitiformis brevissima (e); in reliquis pedibus (fig. 7) hic articulus

minor, capitulo (d) e majore parte constitutus, longe setoso, et appendice digitiformi (e) longa, styliformi aucto. Articulus quartus (4) in pedibus branchialibus (fig. 7) gracilis, simplex, lanceolatus, laminaceus, margine longe setosus, in pedibus copulatoriis (fig. 5, 6) vero validior, teres, ex articulo basali brevi, crasso, et ramis binis (f) hamatis l. curvis apice brevi-setosis. Pars pedis externa e lamina longa, triangulari (g), medio sinuata, superius acuminata, inferne obtusa, margine longe setosa; inter quam et articulum basalem internum processus teres (h), erectus, digitiformis. — Cauda (fig. 1 f., fig. 4) brevis, oblique truncata, bifida, aculeis inæqualibus 13—14 utrinque armata, superne cirris binis prædita, inferne in spinam recurvam producta, addita utrinque subtus appendice mobili, uncinnata, longiore.

Hab. in paludibus terræ Caffrorum Natalensium, unde specimina duo retulit J. WAHLBERG.

Tab. III, fig. 1, *Cyzicum australem* repræsentat, detracta valva sinistra — fig. 2, caput, antice; — fig. 3 valvam sinistram; — fig. 4 caudam; — fig. 5 pedem primum ♂; — fig. 6 articulos infimos pedis secundi ♂; — fig. 7 pedem quartum.

Limnetis n. g.

Limnadiæ et *Cyzico* affine. Antennæ internæ biarticulatæ; cauda brevis, truncata, appendicibus mobilibus facie inferiore destituta.

L. Wahlbergii n. sp.

Tab. IV.

Descr. feminæ. Caput (fig. 2, 3, a, fig. 6) validum reliqui corporis æquans, deflexum, extra testam prominens, scuto tectum magno ad medium verticali, tum reflexo, postice compresso, subcarinato, lateribus sinuato, sub medio forni-

cato, antice expanso, dilatato, alato. — Oculi pone medium positi, pellucetes, bini, reniformes, approximati, inter quos sulcus scuti incipit (fig. 3 b), profundus ad finem anticam usque productus, sensim latior. Ante oculos utrinque area oblonga (fig. 3, 4, c) paullum impressa, pilis obsita, sub qua organum cernitur (fig. 2, 4, d, fig. 5) internum, opacum, niveum, cellulis magnis, nucleatis circumdatum, cujus usum et structuram penitiorum speciminum raritas extricare vetat. — Labrum superius (fig. 6, 7, e) magnum, postice deflexum, subcarinatum, compressum, rostrato-acuminatum. — Antennæ interiores (primi paris) (fig. 6, 7, f.) minutæ, ex articulis duobus, quorum secundus clavatus, breviter setosus. — Antennæ externæ (secundi paris) (fig. 6, 7, g) validæ, ex articulis sex, basali crasso, lato, secundo-quarto brevissimis, inermibus, quinto æque longo ac lato, ultimo paullum longiore; setis terminatæ binis ex articulis 16—17 postice longe plumosis. — Mandibulæ (fig. 6, 7, 8, h) robustæ, superne angulo scuti articulatæ, parte inferiore inflatæ, inflexæ, acie cristis circ. 20-dentata (fig. 8, 9). — Maxillæ binæ (fig. 6, 7, 8, i, fig. 10) minutæ, biarticulatæ, articulo ultimo lato, margine interno recto, setis plumosis armato. — Labrum inferius (fig. 8 k) sulco præditum aculeis tecto. — Truncus robustus, subtriangularis, dorso arcuato. — Thorax a capite sutura discretus profunda, robustus, annulis constitutus parum numerosis, quorum anteriores, non distinguendi, in testam magnam expansi (fig. 1, 2, 3, 11), bivalvem, tumidam, ovatam, antice obtusam, in dorso per spatium dimidiam longitudinem vix æquans canaliculato-impressam (l), strato duplici constitutam, interno membranaceo, e cute thoracis dorsali nato, et

externo corneo, lævissimo, nitido, nec nisi juxta depressionem dorsalem strias præbente. Inter quæ strata massa cellulosa branchialis, medio canales fovens concentricos quatuor (fig. 11 m). Musculi adductores valvarum (n), antici, validi. — Articuli pediferi duodecim, breves. — Pedes (fig. 12—15) versus caudam sensim decrescentes, eo ut primus ultimo quintuplo major, duabus constituti partibus, interna et externa. Pars interna in omnibus habet articulos quatuor (1—4) in primoribus satis dissimiles; primum (1), basalem, lobo auctum adscendente (a), libero, obovato, apice cirro prædito, margine externo setoso; secundum (2) in lobos rotundatos divisum duos (b, c) duplici serie setosos, setis plumosis; tertium (3) stylis binis præditum (d, e) æqualibus, posterius setigeris, setis externis longioribus raripilosis, internis brevioribus versus apicem pectinatis (fig. 16); quartum (4) his similem, styliformem (f, fig. 17). In pedibus posterioribus (fig. 14, 15) magis magisque rotundatis, laminaceis, articuli magis magisque inter se similes, rotundati, lobiformes. Pars pedis externa lamina prædita branchiali, in pedibus primoribus (fig. 12, 13), superne (g) elongata, lanceolata, acinaciformi, margine setis prædita, versus caudam sensim decrescente, in pede decimo (fig. 14), rotundata, in duodecimo (fig. 15) evanida; inferne (g') in processum descendentem continuata, distincte articulatum, setigerum, in pedibus primoribus majorem, recurvum, versus caudam sensim diminutum, sed persistentem. Inter quam laminam et partem pedis internam inseritur appendix adscendens (h) digitiformis teres arrecta, in pede primo lamina brevior, in sequentibus eandem æquans, cum ea a sexto pede sensim diminuta, in nono et decimo (fig. 14) iterum ma-

jor, crassior, recurva, in undecimo et duodecimo suppressa. — Cauda (fig. 18) brevissima, conica, bifida, superne cirris prædita binis, postice brevi-mucronata, lateribus ciliata. — Long. 3 millim. Alt. 2,3 millim.

Habitat cum præcedente. Vidi specimina tria.

Tab. IV, fig. 1 Limnetin Wahlbergii representat magnit. acuta, a latere; — fig. 2 eandem detracta valva sinistra; — fig. 3 eandem a dorso, omissis antennis pedibusque; — fig. 4 frontis partem cum oculis; — fig. 5, organum internum, incertum; — fig. 6 caput a latere sinistro; — fig. 7 capitis faciem inferiorem; — fig. 8 mandibulas; — fig. 9 mandibulæ aciem; — fig. 10 maxillam; — fig. 11 valvæ dextram; — fig. 12 pedem primum; — fig. 13 pedem sextum; — fig. 14 pedem decimum; — fig. 15 pedem ultimum; — fig. 16, 17 spinas pedum; — fig. 18 caudam.

BRANCHIPUS. SCHOEFF.

B. Cafer n. sp.

Tab. V.

B. thorace inermi, lamina pedum superiore externa majore, integra; mas: fronte in rostrum lunatum producta, antennis primariis longis flexuosis, ad basin intus appendice lacinulata, brevi. Long. 15 millim.

Descriptio maris. Caput (fig. 2, 3, 4, 5) oblongum, annulis tribus compositum, quorum primus (a) transversus, antice rostro angusto (d), deflexo auctus apice lunato-bimucronato, antenas portat primarias (e) in hoc sexu validissimas, triarticulatas, longas, flexuosas, quarum articulus basalis ad basin interne appendice brevi (fig. 4, f) lanceolata, lacinulata præditus, et apice extus cirro longo simplici; articulus tertius bifidus, ramo interno cirriformi, flexuoso, externo lato furcato. — Annulus secundus capitis (b) antenas gerit secundarias (g, fig. 6), laterales, di-

stantes, graciles, primorum articulum basalem vix superantes, apice mucronatas et bisetosas; oculum simplicem impari (h), in vertice situm, minutum, sessilem, pigmenti subcutanei macula subquadrata distinctum, et oculos compositos binos (i), pedunculatos, laterales, solitæ structuræ. — Labrum superius (fig. 7, k, fig. 8) ex eodem anulo ortum, magnum, prominens, recurvum, medio compressum, postice arcuato-truncatum, et appendice auctum linguiformi recurva. — Mandibulæ (fig. 7, l, fig. 9) robustæ, annuli margini posteriori affixa, acie e cristis tenerrimis, creberrimis denticulata. — Annulus capitis tertius (fig. 2, c) brevis transversus, superne fere divisus, aream scil. præbens trigonam, dein utrinque in pleuram productus brevem rotundatam. Sub hoc annulo pedum maxillarium duo paria, quorum primores (fig. 7, m, fig. 10) basi lobis binis aucti (palpo? flagello?), biarticulati, inflati, apice setis longis arcuatis, uniseriatis, bis spiniferis præditi; posteriores (fig. 7, n, fig. 11) minuti, inflati, basi antice setis tribus crassis, brevibus, plumosis præditi, et apice unica longiore. — Thorax ex annulis pediferis undecim. Pedes ad medium ejus magnitudine aucti, dein decrescentes, duabus constructi partibus, interna et externa (fig. 12—13). Interna articulos præbet quatuor (1—4), basalem (1) brevissimum, muscularem, secundum (2) et tertium (3) membranaceos, illum bilobum (a, b), lobo superiore longe majore, margine longe-pilosum (fig. 14), tertium basi intus lacinias tres minutas (fig. 15) dentiformes pilosas gerentem, inferne late reniformem, margine spinosum (fig. 16), extus medio emarginatum. Articulus quartus (4) præcedentis margini externo insertus, in pedibus primoribus (fig. 12) medio, in posterioribus

(fig. 13) superne, late lanceolatus, margine setosus, versus caudam sensim longior. Pars externa pedis ex appendicibus vesicularibus duabus (c, d) formata, superiore rotundata, foliacea, inferiore tereti, pendula, in pedibus posterioribus majore, inflata. — Abdomen ex annulis novem, quorum medii breviores, octavus longior, nonus brevissimus laminisque auctus binis lanceolatis, ciliatis (fig. 17). Genitalia externa mascula (fig. 18), in annulo abdominis primo, inferius producto, sunt cirri bini longi, graciles, curvati, ex articulo basali brevi inflato, interne processu recurvo, postice serrato munito, secundo longiore, mutico; tertio brevi basi interne inflato, quarto longissimo extus dentium serie continua serrato, intus spinis armato, apice breviter rostrato, bispinoso.

Femina differt capite (fig. 19) annulis distinctis duobus (ab et c) formato, primo suppresso, ita ut antennæ primariæ proxime ante secundarias insertæ, breves, crassæ (fig. 7, e), subclavatæ, apice mucronatæ. Saccus ovigerus (fig. 20) ex annulis duobus primis abdominis ortus, medio latiusculus, postice sensim constrictus et abrupte recurvus, caligæ formam imitans, ova continet rosea et ad basin utrinque (a) corpus album, globulis glomeratis repletum, ductu adscendente cum partibus genitalibus internis connexum, an sperma, a mare depositum?

Habitat cum præcedentibus.

Tab. V, fig. 1. Branchipod. castrum repræs. ♀; — fig. 2 capitis ♂ faciem superiorem; — fig. 3, a latere sinistro; — fig. 4 a fronte; — fig. 5 a latere sinistro omitta antenna; — fig. 6 antennæ secundariæ apicem; — fig. 7 capitis ♀ faciem inferiorem; — fig. 8 labrum a latere; — fig. 9 mandibulam; — fig. 10 maxillam primam; — fig. 11 max. secundam; — fig. 12 pedem primum; — fig. 13 ped. medium; — fig. 14—16 spinas pedum; — fig. 17 caudam; — fig. 18 genitalia externa mascula; — fig. 19 capitis ♀ faciem superiorem; — fig. 20 saccum ovorum ♀.

Broteas n. g.

Cyclopinæ M. Eow. et Euchetæ Paul. affine. Annulis thoracis quinque; antennis primariis multiarticulatis; secundariis biramibus; pedibus natatoriis octo, bifidis, ramo externo 3-, interno 2-articulato, pedibus quinti paris dissimilibus, pluriarticulatis, pedibus maxillaribus tertiis longissimis apice falciferis; abdomine in mare annulis sex, in femina tribus.

B. falcifer n. sp.

Tab. VI.

Descriptio. Corpus gracile, subcylindricum. — Cephalothorax ex annulis quinque, cephalico impressione transversa bipartito, fronte declivi, subtriangulari. — Antennæ primi paris in femina (fig. 1) inter se similes, longæ, ex articulis 27 passim setiferis, quorum basales 10 breviores; in mare (fig. 2) antenna dextra copulatoria forma diversa (fig. 3), ex articulis circ. 24, in tres partes fere divisa: basalem (a), cujus articuli circ. 15 inæquales, passim setigeri; mediam (b) incrassatam, ex articulis quinque, quorum secundus et tertius medio appendice pulvinata, hamata (fig. 4, a), quartus et quintus appendice squamiformi (b, c), striata, præditi; apicalem (fig. 3, c) ex articulis quatuor, gracilibus, elongatis, primo arcuato, præcedenti per gynglymum inserto, et squama, quali in illo, armato, secundo elongato, recto, in medio spinifero, ultimis minutis setosis. — Antennæ secundi paris (fig. 6, a, fig. 7) triarticulatae, ultimo dilatato, setoso, flabelliformi, primo postice ramum (palpum?) gerente graciliorem, ex articulis setigeris septem, quorum secundus et ultimus elongati, primo brevior, mediis quatuor brevissimis. — Inter antennam primariam et secundariam utrinque foramen minutum (fig. 6, b) rotundatum; annon organorum auditus pars externa? — Labrum (fig. 6 c, fig. 8, 9 a, 10 a) magnum, transversum arcibus sufful-

tum utrinque binis, plagisque pilosis ornatum symmetricis, lamellis supra tectum pluribus, ut videntur, immobilibus; postice medio impressum et papillarum serie præditum. — Mandibulæ (fig. 6 d, fig. 11) robustæ, acie dentibus sex, superiore remoto majore, addita inferne appendice minuta, spinosa; palpi (fig. 6 e.) validi birames, ramo interno bi-, externo tri-articulato. Mandibulæ, quoad partem anteriorem inflexam in interstitio positæ (fig. 9 c.) profundo inter labrum superius et inferius (?), cujus locum occupare videntur processus bini conici (fig. 6 f, fig. 9 b, 10 b, 12) antrorsum vergentes, apice obtusi et externe papilla aucti, intus seriebus pilorum pluribus ornati, suprema scopacea, antice ad basin stylo brevi armati. — Pedum maxillarium paria tria inter se valde dissimilia. Pes maxillaris primus (fig. 6 g, fig. 13) articulo constitutus basali magno, laminaceo, rotundato, postice setis rectis longissimis marginato, cui insidet, interne, lobus ovatus, paululum inflatus, pilis obsitus, margine spinis validis brevibus curvis armatus; antice lobus minutus trispinosus, extus vero articulus secundus brevis cylindricus, lobo antice acutus illi simili, bispinoso, et in ramos duos abiens setosos, superiorem bi-, inferiorem uni-articulatum. — Pes maxillaris secundus (fig. 6 h, fig. 14), validus cylindræus, antrorsum curvatus, e pedunculo basali robusto, in quatuor articulos subdivisus, quorum quisque spinis tribus armatus, et articulis apicalibus quatuor spinigeris, primo magno, sequentibus minutis. — Pes maxillaris tertius (fig. 6 i) longissimus, antennam non multum cedens, articulis quinque compositus, primo elongato, cylindrico, pedem præcedentem crassitie æquante, longitudine superante, antrorsum levi-

ter curvato, antice breviter spinoso; secundo longiore, utrinque attenuato, inflexo, medio longe spinigero; tertio brevissimo bispinoso; quarto brevi, clavato, trispinoso; quinto brevi, in digitos tres falcatos longissimos intus dense pectinatos producto. — Annuli thoracici quatuor, sensim decrescentes, quorum tres primi invicem similes, pediferi, quartus utrinque cornutus, et, præter pedum par quartum, appendices gerens copulæ inservientes (fig. 2). Pedes omnes similes (fig. 6, k), primi minores, quarti longissimi; articulo constituti basali, angulo interno spinigero, et secundo brevi, extus emarginato, quem sequuntur rami duo setosi, externus subbrevior tri —, internus biarticulatus. — Appendices copulatoriæ, in femina (fig. 15) similes et æquales, pede ultimo breviores, ex articulo basali minuto, cui inseruntur rami duo teretes, inferior brevior uniarticulatus, apice bispinosus, superior robustus, longior, apice articulo auctus minuto, trispinoso. In mare (fig. 16) appendices invicem diversæ, forma et magnitudine. Dextra longior, articulis constituta quatuor, validis, basali minuto, secundo paullo majore, crasso, apice interne spina aucto, tertio graciliore, breviusculo, quarto præcedentes simul fere æquante, curvato, apice spina longa arcuata et mucrone minuto laterali. Appendix sinistra brevior articulos habet primos duos fere eosdem, tertium vero et quartum connatos, inferius pulvinatos, apice spina interna minore armatos et externa majore incurva, oblique pectinata. — Abdomen in mare (fig. 2) annulis formatum sex, gracilibus, primo brevissimo, secundo dilatato, utrinque producto, tertio — quinto cylindraceis, hoc longiore, sexto bifido laminisque aucto binis, spinis armatis quinque incurvis, ciliatis,

addito superne cirro gracillimo. In femina (fig. 1) abdomen crassius annulos habet tres, primum minutum, secundum longum utrinque in processum cornutum efformatum, cui affixus est saccus ovorum subreniformis supra concavus; tertium elongatum, sensim dilatatum, bifidum, laminis ut in mare auctum. — Long. 4 millim.

Habitat cum prioribus.

Tab. VI, fig. 1, *Broteam falciferum* n. repræsentat ♀, a dorso visam; — fig. 2 ♂ a latere visum; — fig. 3—5 antennam dextram maris; — fig. 6 animalis supinati partes anteriores, pressione aliquantum expansas; — fig. 7 antennam secundariam; — fig. 8 labrum; — fig. 9, 10 labrum superius et inferius a latere visa; — fig. 11 mandibulæ partem anteriorem; — fig. 12 conum labri inferioris; — fig. 13 pedem maxillarem primum; — fig. 14 ped. max. secundum; — fig. 15 pedes 5ti paris ♀; — fig. 16 eosdem ♂.



THE HISTORY OF THE
CITY OF BOSTON
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE PRESENT TIME
BY NATHANIEL BENTLEY

IN TWO VOLUMES.
VOL. I.
FROM THE FIRST SETTLEMENT
TO THE YEAR 1700.

LONDON:
PRINTED BY J. BELLAMY, IN ST. MARTIN'S LANE.
1787.

**Ornithologiska iakttagelser under en
resa i Ume, Pite och Lule Lapp-
marker, sommaren 1843;**

af

C. G. LÖWENHJELM.

Till Akademien inlemnad den 11 Mars 1846.

Då Akademien redan emottagit några likartade anteckningar af min hand från en äldre Lappsk resa, verkställd sommaren 1843, anser jag mig kunna hembjuda äfven dessa iakttagelser från en sednare och mera vidsträckt resa åt, till en del, samma trakter, företagen i sällskap med Professor **P. F. WAHLBERG** och Mag. **N. J. ANDERSON**, hvilka äfven deltog i den förra resan.

Innan jag går till det egentliga föremålet för dessa meddelanden, må kastas en hastig blick på resans gång och omfattning.

Ifrån Ume stad, som vi lemnade den 2 Juni, togs vägen åt Lycksele Lappmarks socken, i hvars kyrkby det första längre uppehållet skedde efter 13 mils färd utmed Ume- och Vindel-elfvarna. Naturen saknade ännu karakter af Lappmark; fast-mera liknade denna trakt det nyligen lemnade Vesterbotten. Den 10 Juni fortsattes resan åter på och utmed Ume-elf, samt sedan på Juckt-ån,

hwarefter vägen togs öfver land till Vindel-elfven, som, ehuru med många afbrott, befors till Sorsele, i hvars prestgård vi inträffade den 15 Juni. Här visar sig landet såsom lappskt. Vid den majestätska floden se vi ett och annat mindre fjell, och i skogarna höres Riptuppens muntra, skrattlika läte.

Resan, som hitintills till det mesta gått mot nordvest, ställdes nu nästan i norr. Från Sorsele anlände vi, efter 4 mils vandring och efter rodd på den stora, holmuppfyllda Udjaure, den 18 Juni till det genom P. LESTADIUS så bekante Arjeploug, i hvars gästfria prestgård vi emottogos.

Härifrån företogs en utfart den 23 Juni längs efter Horn-avan, till dess öfre ända, der fjellet Peliekajsi (öronfjellet) bestogs och undersöktes, hvarjenite excursionen förlängdes till Adolfströms f. d. silfverhytta vid Lais-elf. Vårt tåg gick nästan hela tiden inom björkregionen, uti hvilken *Sylvia svecica*, *Fringilla montifringilla* och *Fr. linaria* samt *Lagopus subalpina* förekommo till större mängd, än jag på något annat ställe sett. Återvändande från denna särdeles rikhaltiga färd, inträffade vi åter i Arjeploug den 1 Juli; men lemnade åter detta ställe den 3, då kosan ställdes rakt i norr. Genom skogar, öfver fjell och sjöar tillryggalade vi 13 mil och ankommo till Quickjock den 8 Juli. Bland de nästan dagliga fjellexcursionerna, som här företogs, förtjenar den till Alkavare från den 24 till 29 Juli att nämnas såsom särdeles inbringande, ehuru den under hela sommaren förherrskande ogynnsamma väderleken ej eller under denna färd förnekade sig; mängden af de erhållna foglarna, så svåra att förvara och konservera under ett vistande på fjellen, tvang mig att återvända till Quickjock förr, än jag hade ämnat.

I Qvickjocks prestgård hade jag nöjet qvarstanna till den 13 Aug., då vi återvände till Arjeplog, som vi lemnade den 19 Aug. och togo vägen öfver Arvidsjaur till Skellefte, der vi efter denna långa vandring inträffade den 1 Sept.

Förteckning på de Fogelarter, som häckande förekomma i Ume och Pite Lappmarker, samt Jockmocks och Qvickjocks socknar af Lule Lappmark *).

1. *Falco gyrfalco*: en hona fälldes vid fjellet Peliekajsin i Pite Lappmark den 25 Juni.
2. — *peregrinus*: sällsynt; vid fjellen. (Jemf. Vet. Akad. Handl. för 1843, p. 387).
3. — *subbuteo*: sällsynt. (Jemf. Vet. Ak. Handl. 1843, p. 388).
4. — *lithofalco*: allmän i grannskapet af fjellen.
5. — *tinnunculus*: här och der; vid Lycksele och Arjeplogs kyrkobyar samt på fjellen vid sjöarna Tjeggelvas och Wihrijaur.
6. — *palumbarius*: här och der i barrträdsregionen **).
7. — *fulvus*: här och der i hela barrskogsregionen.
8. — *albicilla*: ett exemplar sågs vid Hornavan den 30 Juni.
9. — *haliaëtus*: allmän; äfven sedd vid Wihrijaur den 29 Juli af Mag. ANDERSON.

*) Om de med bokstäfver utmärkta fogelarter förekomma några anmärkningar längre fram.

**) Regionernas indelning är tagen efter Nilssons fauna, 2 Del., pag. 104.

10. *Falco buteo*: sällsynt; ehuru förekommande i hela Vesterbotten, öfverstiger denna art knappt Lappmarksgränsen.
11. — *lagopus*: allmän, så väl i skogsregionen, som ock långt inåt fjellen, t. ex. Alkavare d. 27 Juli.
12. *Strix nyctea*: allmän på fjellen vissa år, nemligen då fjellmössen anställa sina tåg; deremellan sällsynt.
13. — *nisoria*: allmän i skogsregionen; uppstiger äfven i björkregionen på fjellen.
14. — *bubo*: här och der i barrskogsregionen.
15. — *brachyotus*: sällsynt; på fjellen har jag dock sett denna art.
16. — *lapponica*: i synnerhet under Lemmelår, annars sparsam. Från trakten af Jockmock har jag fått exempl. både 1843 och 1845.
17. — *liturata*: här och der i den nedre skogsregionen.
18. — *Tengmalmi*: här och der ända till fjellen.
19. *Cuculus canorus*: allmän i hela skogsregionen; förekommer äfven på fjellen. (Se Nilss. Fauna 1, pag. 114).
20. *Picus martius*: här och der i den nedre barrskogsregionen.
21. — *major*: här och der i barrskogsregionen.
22. — *leuconotus*: sällsynt; sågs en gång under resan 1843 i Augusti, vid Randijaur i Jockmocks Lappmark.
23. — *minor*: här och der i hela barrskogsregionen; hade nyss kläckt d. 30 Juni vid fjellet Issjak vid Horn-Avan.
24. — *tridactylus*: Lapplandsskogarnas allmänaste Hackspett; går äfven upp på sidorna af fjellen, så långt barrskog växer.

25. *Corvus corax*: här och der; i större antal på fjellen.
26. — *cornix*: här och der i barrskogsregionen; sparsam vid Qvickjock, allmän vid Sorsele.
27. — *pica*: (a) i nedre barrskogsregionen; sällsyntare än föregående art.
28. *Garrulus infaustus*: allmän i hela den uppgifna traktens skogsregion, går på fjellens sidor upp i björkregionen; hade flygga ungar den 11 Juni i Lycksele Lappmark.
29. — *glandarius*: sporadiskt förekommande; "om hösten vid Lycksele-Quickjock." ("Inom polcirkeln finnes hon icke." Se NILSS. Fauna I, pag. 187).
30. *Caprimulgus europæus*: sällsynt. I trakten af Sorsele omtalades för Prof. WAHLBERG en fågel, som efter beskrifningen ej kunde vara annan än denna.
31. *Cypselus apus*: allmän; synes äfven på fjellen.
32. *Hirundo rustica*: allmän i hela skogsregionen. Denna art var den enda i sitt slägte, som förekom vid Adolfström d. 27 Juni.
33. — *urbica*: ännu allmännare än föregående. I mängd häckande så väl vid husen och kyrkorna, som ock i fjellbranter.
34. — *riparia*: här och der; på vissa ställen talrik; Lycksele-Quickjock.
35. *Muscicapa grisola*: här och der; Lycksele, Horn-Afvan, Quickjock.
36. — *atricapilla*: här och der till foten af fjellen; Lycksele, Peliekaisins fot vid Horn-Afvan, Quickjock.
37. *Lanius excubitor*: här och der i skogarna närmare fjellen; mellan Horn-Afvan och Tjeggelvas, vid Quickjock m. fl. st.

38. *Turdus viscivorus*: vid Lycksele den 4 Juni.
(Jemf. Vet. Acad. Handl. 1843).
39. — *pilaris*: allmän i synnerhet på fjellen i
björkregionen; äfven vid Wilrijaur (Mag.
ANDERSON).
40. — *musicus*: (b) på åtskilliga ställen, t. o.
m. på fjellens sidor, dock sparsamt.
41. — *iliacus*: allmän, så högt barrskog växer.
42. — *torquatus*: (c) ej sällsynt i grannskap af
fjellen, på hvilka han äfven finnes till
egentliga kölen, och stundom herrskande
i trakter belägna ofvan all vegetation.
43. — *merula*: (d) högst sparsamt.
44. *Cinclus aquaticus*: i skogsregionen i grannskap
af fjellen. Uppgifves vara i Lappmar-
ken synlig både vinter och sommar.
5. *Motacilla alba*: allmän, ända till fjellen, så långt
åkerbruk drifves och svenskar bosatt sig.
46. — *flava*; var: *capite maris nigricante*: all-
männare än föregående art, går den må-
hända något längre upp.
47. *Anthus pratensis*: *) allmän på alla fjellplatåer,
går upp i öfversta videregionen och stund-
om högre.
48. — *arboreus*: här och der i skogsregionen;
Lycksele, Qvickjock.
49. *Saxicola oenanthe*: allmän långt in på fjellen,
förekommer äfven i hela barrskogsre-
gionen.
50. — *rubetra*: (e) sparsamt; vid Qvickjock träf-
fades äfven ett par på denna resa.
51. *Sylvia hortensis*: sparsamt; på båda resorna en-
dast hörd vid foten af fjellen i der be-

*) Denna art hade, likasom *Motacillæ*, börjat allmänt
flytta den 20 Aug.

- lägna yppigt bevuxna dalar t. ex. vid Adolfström, Quickjock och Horn-Afvan vid Peliekaisin.
52. *Sylvia svecica*: allmän i grannskapet af fjellen och på deras sidor i mängd, i björk- och videregionen; går långt in bland fjellen t. ex. Tuokin vid Wihrijaur (ANDERSON).
 53. — *phoenicurus*: allmän i hela barrskogsregionen, ända upp på sidorna af fjellen.
 54. — *trochilus*: allmän; går på fjellen upp i björkregionen.
 55. *Accentor modularis*: sparsamt; Quickjocksfjellen i skogsregionen.
 56. *Parus major*: sparsamt; synes mera tillhöra det lägre skogslandet såsom Jockmock, Arvidsjaur o. s. v.
 57. — *sibiricus*: allmän i hela skogsregionen från gränsen af Lycksele Lappmark till fjellen, på hvilka han förekommer upp i björkregionen. På hösten såg jag denna art folja oss ända till Stafva träsk i Skellefte Socken.
 58. — *palustris*: ehuru sparsamt, förekommer denna art dock vid Quickjock och åtskilliga andra ställen. Synes aftaga alltså föreg. i mängd tilltager mot norden.
 59. *Regulus cristatus*: sparsamt. (Jemf. Vet. Acad. Handl. 1843, p. 395).
 60. *Alauda arvensis*: (f) om våren sporadiskt förekommande vid Quickjock och Lycksele. Flera par hördes och sågos häckande vid Badstuträsk i Stensele Socken (65° n. b.).
 61. — *alpestris*: Quickjock, sällsynt. (Jemf. Vet. Acad. Handl. 1843, pag. 395).
 62. *Emberiza citrinella*: allmän; Lycksele, Adolfström, Quickjock m. fl. st.

63. *Emberiza hortulana*: allmän, som föregående.
64. — *schoeniclus*: allmän, i synnerhet närmare fjellen och på deras sidor i björk- och vide-regionen.
65. — *nivalis*: allmän på alla fjell inom snö-regionen, alltid högre upp än följande art.
66. — *lapponica*: (q) talrikt i videregionen på de lägre och jemna fjellen, belägna på afstånd från den högre fjelltrakten, på denna i ringa antal. I skogsregionen förekommer hon ej om sommaren.
67. *Fringilla domestica*: här och der vid gårdarna; Lycksele, Sorsele, Arjeplog, Tjömotis, m. fl. st. Vid foten af fjellen har jag ej sett denna art *).
68. — *coelebs*: sparsamt, dock ända till fjellen.
69. — *montifringilla*: allmän; på fjellens sidor upp i björkregionen.
70. — *linaria*: allmän; bland fjellen går hon långt in, och förekommer upp bland öfversta videt.
71. — *spinus*: sparsamt i skogsregionen; Lycksele, Sorsele, Quickjock.
72. *Pyrrhula vulgaris*: sparsamt i barrskogsregionen, äfven vid Quickjock.
73. *Loxia curvirostra*: allmän i hela skogsregionen — Lycksele, Adolfström, Quickjock.
[*Columba*: se anm. (q)].
74. *Tetrao bonasia*: sparsamt; till foten af fjellen vid Quickjock äro familjer anträffade.
75. — *urogallus*: i hela skogsregionen om sommaren temligen allmän, om vintern stundom i stor mängd ("Flytt-ljäder"). Går

*) *Fringilla montana* och *F. flavirostris* har jag ej observerat i Lappland.

på fjellen så långt upp, som tallen bildar skog *).

76. *Tetrao tetrix*: sällsynt i Lappmarkens högre delar, mot Vesterbotten temligen allmän. Finnes ej utmed Lule elf längre än till Jockmock.
77. *Lagopus subalpina*: (h) allmän i synnerhet i grannskap af fjellen, samt på dessa i största mängd i björkregionen. — Finnes vid Wihrijaur (ANDERSON).
78. — *alpina*: (i) på fjellen i vide- och snö-regionerna.
79. *Charadrius hiaticula*: sedd några gånger vid sjöarna i barrskogsregionen; talrik här och der på fjellen vid sjöar och bäckar samt vid kanterna af de eviga snöfläckarna; åtminstone ända till Kölen.
80. — *morinellus*: här och der på höga, jemna fjellhedar; stundom i skock högt i snö-regionen. Skocken utgjordes af endast gamla foglar, mest honor.
81. — *apricarius*: i stor mängd på alla fjell i hela vide-regionen.
82. — *helveticus*: häckar troligen, ehuru sparsamt, långt in på fjellen i trakterna af Alkavare och Sulitjelma.
83. *Grus cinerea*: kläcker på flere myror i Lycksele och Arvidsjaur's socknar; går ock norr om Lule elf.
84. *Numenius phaeopus*: finnes, fast i ringa antal,

*) Enligt egen erfarenhet och de uppgifter, som kunnat insamlas, går Tjädern mot norr och mot fjellen längre än Orren.

”Tjädern är allmän vid Enare träsk och Orren kläcker nordligast vid Kittilä.” (67° 30' n. br.). MALM i Kröjers Tidskrift 1 Bind 2 Häfte.

- både i skogsregionens kärr och å fjellmyror, som äro mindre högt belägna.
85. *Tringa Temminckii*: här och der på de högre fjellens gräsbevuxna platåer bland det låga videt vid sjöar och bäckar.
86. *Totanus hypoleucos*: mycket allmän till foten af fjellen.
87. — *calidris*: på samma ställen som *Tringa Temminckii*, allt talrikare ju mera man närmar sig kölen — således långt öfver björkregionen. Under 1843 års resa syntes ingen individ af denna art.
88. — *glareola*: allmän ända till fjellen.
89. — *glottis*: (k) här och der i hela skogsregionen; men i synnerhet på myrorna vid fjellens fot.
90. *Scolopax gallinago*: på myrorna ända upp i videregionen.
91. — *gallinula*: ganska sparsamt sedd endast på myror i grannskap af och på fjellen i videregionen.
92. *Phalaropus hyperboreus*: skall finnas, ehuru jag ej sett något häckande par. Fälles vår och höst. (Se Vet. Akad. Handl. 1833.)
93. *Sterna hirundo*: flera par sågos på Udjaur den 18 Juni.
94. *Larus canus*: (l) har synts, ehuru sparsamt, på flera af de stora sjöarna; på de högre fjellen observerades flera par.
95. *Lestris Buffonii*: (n) på de högre fjellhedarna vissa år i stor mängd; t. ex. 1845. Året förut fanns den också, ehuru ej i sådan mängd; men 1843 såg jag ingen.
96. *Cygnus musicus*: (n) på myrorna i skogstrakten; i större antal längre mot norr.
97. *Anser segetum*: (o) på samma ställen som *Cygnus*.

98. *Anser albifrons*: (p) i stor mängd i vissa sjöar närmast kölen.
99. *Anas clypeata*: (q) sällsynt häckande vid Qvickjock.
100. — *boschas*: här och der vid skogssjöar.
101. — *acuta*: (r) här och der, ej sällsynt.
102. — *penelope*: allmän ända till fjellen.
103. — *crecca*: allmän till fjellens fot.
104. *Fuligula cristata*: (s) allmän till fjellen.
105. — *marila*: (s) i vattendragen närmare fjellen.
106. — *fusca*: (s) allmänt herrskande till fjellen.
107. — *nigra* (s) ännu allmännare än föregående.
108. — *clangula*: mycket allmän till fjellen.
109. — *glacialis*: (t) vid fjellen, men isynnerhet på dessa i högt belägna sjöar.
110. *Mergus merganser*: allmän vid de större vattendragen i skogsregionen.
111. — *serrator*: ännu allmännare, går upp i björkregionen på fjellen.
112. *Colymbus arcticus* (u) allmän på de större vattendragen — går äfven högt upp bland fjellen såsom vid Alkajaur och Wibri-jaur.
113. — *septentrionalis*: allmän — lika med föregående.

*Anmärkningar vid några af de förut uppräknade
Fogelarter, och tillägg af några i förut nämnde
trakter sporadiskt förekommande species.*

Caryocatactes guttatus. Det stora tåg af dessa foglar, som hösten 1844 öfversvämmade medlersta och södra delarne af Skandinaviska halfön, lär äfven hafva sträckt sig öfver dess nordligaste. Vid Lycksele kyrka påträffade jag fjädrar efter en individ. I Sorsele och i Qvickjock visades mig uppstoppade nötkräkor, som der i trakten

blifvit fällda i Oktober 1844. De hade ådragit sig uppmärksamhet genom sin färgteckning och sin snålhet efter kött.

Sturnus vulgaris observerades på denna resa i Ume stad, der några par den 1 Juni hade på knutarna af husen tillredt sina bon.

- a) *Corvus pica* fanns vid Lycksele, var sällsynt vid Sorsele, sågs på förra resan i Jockmocks "kyrkostad"; men fanns hvarken i Qvickjock eller Arjeploug. På sistnämnde ställe hade den dock varit sedd under våren detta år, och sades hafva förr funnits i mängd, men för trenne år sedan på en gång alldeles försvunnit. Under resan från Arjeploug öfver Arvidsjaur till Skellefte sågs ej Skatan förr, än i den inom Pite Lappmark sist belägna byn, Glommersträsk.
- b) *Turdus musicus* hördes på denna resa flera gånger, nemligen vid Lycksele den 6 Juni; vid Sibmitspoult nära Udjaur den 17 Juni; vid foten af Peliekaisin vid Horn-Afvan den 28 Juni; i den yppigt bevuxna dalen vid foten af Akkaspakte i trakten af Tjeggelvas sjungande hela natten den 4 Juli samt vid Qvickjock på holmarna den 8 Juli.
- c) *Turdus torquatus* har jag funnit häckande endast i fjelltrakter; men der i de flesta större stenskrafvel, belägna så väl vid fjellens fot ner uti barrträdsregionen, som ofvanpå dessa bland den eviga snön, isynnerhet der något vatten funnits i grannskapet.

Vid sjön Wihrijaur lærer den ock hafva förekommit vid Mag. ANDERSONS besök derstädes den 29 Juli. Såsom vanligt var denna fogel utomordentligt skygg, ehuru den hade små ungar; deras räddningsmedel var alltid, liksom ungarnas af stensqvättor och ängpip-lärkor, att krypa långt in mellan stenblocken.

- d) *Turdus merula* trodde jag mig knappt finna under så nordlig breddgrad, dock hördes denna fogels herrliga sång den 10 Juni nära Katisafvan i Lycksele Lappmark, och den 30 Juni vid Horn-Afvens strand vid foten af fjellet Östra Issjak.
- e) Jag kan ej underlåta att nämna, huru angenämt förvånade vi flera gånger blefvo öfver vår vanliga Busksqvätta (Sax. rubetra), hvilkens sång i dessa trakter bestod af klarare, fylligare och långt vackrare toner, än deras, som man ständigt om våren, ja! hela näterna igenom, får höra i medlersta Sverige. Några

exemplar måste fallas, för att öfvertyga mig, att det verkligen var *Saxicola rubetra* som sjöng.

Sylvia abietina hördes sjungande på flera ställen under resan från Ume stad till Lycksele Lappmark den 2—3 Juni; samt den 29 Aug. i trakten af Skellefte, der äfven *Sylvia rubecula* sågs.

f) *Alauda arvensis* höres tidigt om våren vid Lycksele; men sades sedan försvinna; ett denna vår vid Qvickjock fäldt exemplar visades mig. Det enda ställe inom Lappmarken der jag sett denna fogel, är Badsträsk, en by i Stensele Socken (65° n. br.). Här hördes flera ex. öfver åkertegarna från höjden neddrilla sin sköna sång den 12 Juni.

g) *Emberiza lapponica* har jag funnit häckande endast på fjellen; förekom i mängd på Peliekaisin, der den gick ända upp i öfversta videt; sedan fann jag den talrikast vid vår öfvergång af fjellen Gajtsats och Skeldavare, belägna mellan sjöarna Tjeggelvas och Saggat, den 5 Juni. På de högre fjellen, såsom Walli och vid Alkavare har jag endast sett den i ganska litet antal. På förra resan såg jag två kullar på nämnde ställen, och på denna har jag blott sett en familj på Wallifjellet.

I motsats till *Emberiza nivalis* synes Lappsparfven företrädesvis älska att bebo jemna gräsrika fjellplaner, hvilkas höjd knappt uppnår snögränsen, men hvars sumpiga videregion är så mycket vidsträcktare. På dylika ställen kläckte han i sällskap af 4—7 par i hvart och ett salictum, och ehuru fogeln hade ägg, var den dock ganska skygg. Flera gånger har jag sett honom med ryckvis fladdrande vingslag höja sig högt i luften, derunder neddrällande sina klara och fylliga toner. Ej en gång i öfversta delen af björkregionen har jag funnit denna art bosatt. (Se NILSSONS fauna).

Enligt de underrättelser, mig under resan blifvit gifna, finnes ej *Columba Palumbus* och ännu mindre *Col. Oenas* hvarken i Westerbotten eller Ume Lappmark. *Columba turtur* är fälld vid Qvickjock (se 1843 års resa) och sedermera sedd äfven alla följande årens höstar, enl. underrättelser af Pastor BJÖRKMAN.

h) *Lagopus subalpina* tyckes i Augusti, då ungarna blifvit flygga, draga sig från skogen upp i videregion-

nen *). Härtill slutar jag deraf, att, då på Wallifjellet vid Qvickjock jagt med rapphönshund anställdes i fyra dagar efter hvarandra, och då äfven 20 st. fälldes hvarje dag, någon minskning bland riporna ej förmärktes, ehuru detta år ej ansågs vara rikt på ripor, och ehuru jagten alltid anställdes på samma trakt af fjellet, nemligen i ett revier, som var omkring $\frac{1}{2}$ mil långt och några bösshåll bredt. Stora nya kullar funnos alltid på samma ställen, der jagten dagen förut gått fram. Invånarna i dessa trakter tro, att de så besvärande myggorna och knotten föranleda denna flyttning uppåt fjellet.

De unga riporna trycka sig väl för stående hund, ej så de gamla, som dock "hålla hårdare" ju mera försigkomna ungarna äro. (Jemf. Jägarf. Tidskr. 1833, pag. 647.)

- i) *Lagopus alpina* förekom i år högst sparsamt. Endast en ensam hanne och en hona med kull sågos på samma ställen, der 1843 10 st. under gåendet uppskrämdes.

Båda riparterna hade kläckt omkring 8 dagar tidigare i år än 1843.

- k) *Totanus glottis* **). Hennes 4 päronformiga ägg äro gulaktigt hvita, tätt öfverströdda med rödbruna fläckar och punkter.

Scolapax rusticola sågs i Westerbotten nära Lappmarksgränsen på vägen mellan Ume stad och Lycksele sträckande utefter skogshöjderna den 3 Juni i solnedgången.

- l) Den 12 Aug. fälldes den ena af ett par *Larus fuscus*, som uppehöll sig å Saggatjaur vid Qvickjock. Både denna art och *Larus canus* lära om våren och i synnerhet vid de under denna tid och i dessa trakter så vanliga vestanstormarna, dels parvis, dels i större flockar förekomma å de stora sjöarna i Lappmarkerna.

(I Vet. Akad. Handl. 1843, pag. 403, har jag begått ett misstag uti att kalla *Lestris* för Skaoli, hvilket lappska namn tillhör måsarna).

- m) *Lestris Buffonii* (BOJE), *Lestris Cephus* (BRUENN; KEYSERL. et BLASIIUS). Denna fogel, som af både Lappar och i Lappmarken boende Svenskar är väl be-

*) Jemf. NILSS. fauna.

**) Jemf. MALMS "Ornith. bidrag", i Kröjers tidskrift, 1 Bind, 2 Käfte.

kant under namn af *Skaiti* och som, enligt deras uppgift, alla år förekommer på hedar och myror i grannskap af större eller mindre vattendrag på högfjellen, söktes af mig redan under förra resan, ehuru då förgäfvets; men mina ifriga önskningar i afseende härpå gingo denna gång bättre i fullbordan, och jag fick många gånger tillfälle att studera denna intressanta fogels lefnadssätt.

På den inom snöregionen belägna vidsträckta heden på fjellet *Pelickaisin* anträffades det första exemplaret, som, utan att visa någon skygghet och liggande på släta marken, fälldes. Denne, som var en hanne, var, såsom det tycktes, alldeles ensam. Sedermera såg jag ingen *Skaiti* förr, än då jag på resan till *Alkavare* den 25 Juli hade framträngt omkring 6 mil in på fjellen och kommit till fjelldalen *Wassja*; då träffades åter några par, som der flögo omkring. Allt efter som vårt tåg vidare framskred mot kölen, allt talrikare förekommo dessa foglar, som vid *Alkavare* syntes i största antal. Under framtåget öfver sumpiga fjellplaner vid bäckar, sjöar och myror lika väl som på torra steniga fjellkullar, ja! på sidan af fjellspetsarna uppe bland eviga snön förekom denna fogel parvis kringflygande och noga bespejande hvarje ovanligt föremål, i händelse några af de många kamraterna skulle ha kunnat lemnat något, som kunde tjena att tillfredsställa denna fogels stora glupskhet och rofgrighet. Oupphörligen såg man dessa lätta luftseglare med sin hoppande flygt klyfva rymden och göra de vackraste och ledigaste kastningar eller vändningar, för att antingen slå ned på sitt utsedda byte, eller förfölja och undvika sina kamrater. Härunder och under det de förföljde oss, af ömhet för sin afföda, läto de ständigt, hvilken tid på dygnet som helst, höra sitt sträfva, ilskna skrik *i-i-i-äh, je-äh — je-äh — je-äh!* och nalkades oss så nära under flygten, att vi kunde kasta stenar och käppar på dem, och jag kunde nedskjuta dem med finaste spårshagel. Ungarne gömde sig så väl, att ej mer än en sågs.

De skjutna *Skaiti* voro mycket feta och deras magars contenta bestodo i bär af *Empetrum nigrum*, en stor art *Harkrank* (*Tipula speculum*), ostyckadt slukade fjellmöss, fogelägg och skalinsekter såsom *Nebriæ*. Ehuru måsar funnos, såg jag ingen *Lestris* anfalla någon sådan; men väl såg jag en *Skaiti* nedslå och straxt

uppkomma häftigt förföljd af en Fjellriphona, som bortjagade fredsstöraren och frälste sina många små ungar.

Ingen af de Skaiti, som jag såg och sköt, var till färgen lik de *Lestris parasitica*, hvaraf jag sett och eger många exemplar. De förra hafva nedra kroppsdelen hvita, de sednare gråbruna. Flera gånger sköt jag hannen med sin hona, hvilka voro till färgen hvarandra fullkomligen lika*). De förlängda medlersta stjertpennorna äro stundom 13 tum långa och räckta 7—9 tum utöfver de öfriga stjertpennorna. (På den vanliga *Lestris parasitica* är hela stjertens längd 8 tum och de medlersta pennorna blott 3 tum längre än de andra). Tarsens färg är på *L. Buffonii* blygrå med der och hvar svarta fläckar; simhuden svart.

Dessa fjell-labbars utseende öfverensstämmer alldeles med diagnosen i KEYS. och BLASIUS, "Die Wirbelthiere Europas," pag. 240, på *L. Cephus*, utom deruti, att fötterna der sägas vara gula.

- n) *Cygnus musicus* kläcker i alla de tre angifna Lappmarkerna och tillhör ej så mycket fjellen, som fast mera den skogiga med myror och träsk uppfyllda delen. "Vid fjellvatten"**) har jag aldrig sett den, ej heller fått någon sådan underrättelse, men väl kläcker och ruggar denna fogel i "stora ödemarker" på "långt från människors boningar" belägna kärr och sjöar *nedanför* fjellen i det vidsträckt skogslandet af Lappland. I ett bo i trakten af Badstuträsk funnos den 13 Juni 8 st. ägg.

Anser cinereus fallas någon gång, fast sällan, om våren, i sällskap med följande art.

- o) *Anser segetum* har jag träffat under hela resan från Stöttingsfjellet till Lule elf, och förekommer hon på de flesta större myror, som ligga något aflägsse i de stora ödsliga skogarna; men i stor mängd lär hon först förekomma norr om Lule elf på de stora milslånga myrorna i Gellivare Socken till ex. Stora Mudus. I de trakter jag besökt, går hon aldrig upp på egentliga fjell och tyckes dela samma vistelseorter, som *Cygnus musicus*. I Lule stad såg Prof. WAHLBERG under förra resan en tam sädgås, som gick på torget och betade med vanliga gäss.

p)

*) Jemf. NILSSONS fauna.

**) Jemf. NILSSONS fauna.

p) *Anser albifrons* *) förekommer om sommaren endast på högsfjellen på myror, hedar och gräsbrinkar, så belägna, att hon kan vid öfverkommande fara i hast kasta sig i vattnet och genom simmande eller dykande (under fällningstiden) undkomma sina fiender. I stora flockar uppehålla de sig på Wihrijaur vid Sirkasbukt, Staddajaur, Kasakjaur, som af gässens Lappska namn *kasak* erhållit sin benämning. Här i de stora för människor nästan ogenomträngliga videskogarna, gömma de sig och fälla sina vingpennor i slutet af Juli; den vecka, då detta pågår som bäst, kallas af Lapparna äfven *kasak*, emedan då är tid att med hundar jaga dem. Härvid bitas de antingen af hunden eller utdrifvas ur videt och ihjälslås af Lappen, som tagit position i förväg vid sjön, viss om, att gässen skola söka sin räddning i vattnet. Härunder lära de springa ganska fort. Att på en jagt döda ett dussin, räknas ej för stort.

Ingen *Anser leucopsis*, ingen gås med svarta fötter kan man påminna sig någonsin blifvit skjuten vid Qvickjock eller på alla de många ställen der jag anställt efterfrågningar; deremot beskrifvas de båda ofvan anförda arterna väl.

- q) *Anas clypeata*. I Qvickjock visades mig fötter och cranium af en denna vår der fälld *A. clypeata* ♀, hvars hanne äfven beskrefs ganska noga. Föregående året hade man ofta sett detta eller ett dylikt par, som invid stället haft ungar. (Jemf. Jägarf. Tidskrift 1832, pag. 293). Ehuru i ringa antal, häckar dock denna art inom polcirkeln.
- r) *Anas acuta*. Bland denna fogels födoämnen ingå ock bären af *Vaccinium myrtillus*. Vid Arvidsjaur sköt jag den 10 Aug. en ♂, som i sällskap med flera andra kamrater skrämdes upp ur skogen, der de troligen varit för att proviantera; ty den fälldes hade hela oesophagus fylld med blåbär.
- s) *Fuligula cristata, marila, fusca* och *nigra* (i Qvickjocks-trakten kallade: Småvig, Storvig, Storsvärta och Lillsvärta) äro gemensamma för de tre Lappmarkerna. Af dessa var *Ful. marila* minst allmän. *Ful. fusca* såg jag äfven på fjellsjöar belägna inom björk-

*) Ett tryckfel i Vet. Akad. Handl. 1843, pag. 404, rättas härmed; orden *leucopsis* och *albifrons* böra byta plats.

regionen, och den påstods der både kläcka och rugga; annars förekom den i större mängd på sjöarna i skogslandet.

- t) *Fuligula glacialis* har jag ej sett annat än i grannskapet af egentliga fjellen och långt inpå dessa i små sjöar och kärr i videregionen i grannskapet af kölen. En stor flock sågs på Alkajaur — och nykläckta ungar sågos i grannskapet den 26 Juli.

Phalacrocorax Carbo lärer denna vår till ett antal af 5 st. varit synlig vid Arjeplougs prestgård, och dylika foglar lära observeras här och der inom Lappland om våarna.

- u) *Colymbus arcticus* sågs vid Päuraure i Lule Lappmark sinnande med sina två ungar sittande på modrens rygg, och då Lommen blef skrämnd och dykte, medföljde också de små under vattnet, qvarsittande på sin trygga plats.

Man kan tänka sig, hvilken mängd af flyttande sjöfoglar om våren finnes i fjellens grannskap, då en man kan vid islossningen med sin lodbössa nedlägga 170 st. gäss, svanor, änder. Detta hände i våras vid Adolfström och man besinne, att hvarje skott ej dödar mera än högst tvenne stycken.

Biografi

öfver

NILS GABRIEL SEFSTRÖM.

PROFESSOR, F. D. FÖRESTÅNDARE FÖR FAHLU BERGSSKOLA,

R. AF K. N. O.

NILS GABRIEL SEFSTRÖM föddes den 2 Juni 1787 i Ilsbo socken af Norra Helsingland. Hans fader JACOB GABRIEL SEFSTRÖM, då komminister i Rogsta och Ilsbo, sedermera i Norrbo och Bjuråker, härstammade från trakten af Upsala; modern ANNA BROMAN var af en prestsläkt, som länge haft sitt hem i Rogsta och Ilsbo.

Efter att hafva åtnjutit den första undervisningen i sina föräldrars hus, intogs SEFSTRÖM vid 12 års ålder i Hudiksvalls trivialskola. Sedan han genomgått densamma, blef han i Oktober månad 1804 lärjunge vid Hernösands gymnasium. Utom de vanliga studierna njöt han under denna tid äfven särskilt undervisning i matematik. I Juni 1807 blef SEFSTRÖM student vid universitetet i Upsala. De nästföljande tvenne åren tillbragte han dels hemma, biträdande sin fader vid presterliga göromål, dels i Hudiksvall, sysselsatt med barnundervisning.

Under denna sistnämnda vistelse fick den unge SEFSTRÖM den riktning och håg för studier, som blef afgörande för hela hans lefnad. Af sin

fader ämnad att blifva prest, hade han likväl till dennes missnöje städse visat föga håg för detta kall, och då han i Hudiksvall fick tillgång till böcker i fysik och kemi, uppgick för honom på en gång ett ljus öfver hans egentliga kallelse. Han lemnade snart allt annat för att med ifver öfverlemna sig åt dessa studier, och begaf sig om våren 1809 till Stockholm, der han kom i åt-
 -bjutande af BERZELII undervisning i theoretisk och praktisk kemi. För att i sina knappa omständigheter kunna uppehålla sig i hufvudstaden, måste han först biträda en äldre landsman vid en af denne inrättad privatskola, och sedan 1½ år bestrida en lärare-befattning i ett enskilt hus. Emellertid hade han under sina öfningar på Carolinska Mediko-kirurgiska institutet allt mer väckt sin lärares, d. v. Kemi Professorn BERZELII uppmärksamhet, och slutligen förvärfvat sig hans välvilja till den grad, att BERZELIUS om våren 1811 tog SEFSTRÖM till sig, och icke allenast underviste, utan äfven underhöll honom, samt sedermera försträckte honom en del af kostnaderna för genomgåendet af hans akademiska kurs.

I November 1810 undergick SEFSTRÖM Medico-filosofiska examen, i Juni 1812 Medicine kandidat-examen, i April 1813 Medicine licentiat-examen. I Maj s. å. disputerade han pro Gradu Medico under Professor ÅKERMANS præsidium, och i Juni s. å. promoverades han till Medicine doktor.

Efter att sålunda hafva fulländat sin akademiska kurs, började SEFSTRÖM sin bana såsom praktisk läkare. Han tjenstgjorde från Okt. 1813 till Okt. 1817 såsom underläkare vid Kongl. Serafimer-Ordens Lazarettet, under tiden äfven ofta upptagen af enskilt praktik. Men denna bana

afbröts snart: det var icke läkare-konsten förbehållet att längre uteslutande sysselsätta SEFSTRÖMS håg och krafter. Han egnade sig allt mer åt de kemiska vetenskaperna, och såsom lärare i dem har han tillbragt större delen af sin verksamma lefnad.

I Jan. 1812 blef Doktor SEFSTRÖM antagen såsom lärare i kemi och naturalhistoria vid *Kongl. Krigs-Akademien å Carlberg*; i Okt. 1813 erhöll han denna tjänst på ordinarie stat och hi-behöll densamma till April 1820.

I Febr. 1812 konstituerades han till E. O. kemie adjunkt vid *Carolinska Medico-Chirurgiska Institutet*, blef stipendiat i Nov. s. å. och ordinarie kemie och farmacie Adjunkt i Mars 1813. Under Professor BERZELIUS frånvaro 1818 och 1819 förestod Dr SEFSTRÖM hans profession och utförde under denna tid alla de kemiska försök, som voro erforderliga för utarbetandet af Svenska pharmacopæen och medicinal-taxan. År 1818 erhöll han Professors fullmakt. Han lemnade Institutet 1820.

Det förtroende SEFSTRÖM vunnit såsom lärare, visade sig allt vidare, då, vid *Kongl. Artilleri-Läroverkets* inrättande vid Marieberg år 1817, han dervid blef förordnad till lärare i fysik och kemi, hvilken befattning han äfven bibehöll till 1820.

Med detta sistnämde år öppnade sig för Prof. SEFSTRÖM den bana, der han skulle utveckla sin förnämsta verksamhet och förvärfva sig ett oförgätligt namn i Svenska bergshandteringens häfder. Behovet att på vetenskapliga grunder bygga denna handtering, Rikets andra modernärning och hufvudkällan till dess export, hade alltmåra gjort sig gällande och föranledt planen till en bildningsanstalt, hufvudsakligen för blifvande

tjenstemän vid bergsstaten. När Kongl. Maj:t i Dec. 1820 nådigst förordnade att en *Bergsskola* skulle inrättas i *Fahlun*, blef Prof. SEFSTRÖM, utan förslag, utnämnd till dess förste lärare. Prof. SEFSTRÖM hade dessförinnan deltagit i puddlingsförsöken vid Skebo bruk under Herr Direktören C. D. AF UHRS ledning, och dervid fått första impulsen till sin verksamhet för bergshandteringen.

Sedan alla förberedande arbeten blifvit fulländade, öppnades Bergsskolan i *Fahlun* år 1822 under Prof. SEFSTRÖMS ledning. Det nit, den omtankan och den rastlösa arbetsamhet han utvecklade under utförandet af denna ansvarsfulla och mödosamma befattning, kunna af alla, som under den tiden lärde känna honom, icke nog lofordas, och hafva i talrika lärjungars hjertan och verksamhet lemnat varaktiga spår.

De ansträngningar han denna tid, dels såsom Lärare, dels under ihärdig forskning i Bergsvetenskapen gjorde, undergräfvade småningom hans helsa, och denna försvagades, sedan han genomgått flera svåra sjukdomar, slutligen till den grad, att han, efter sexton års verksamhet, måste söka endtledigande från sin befattning, hvilket han äfven erhöll i slutet af år 1838, men förestod dock enligt särskilt förordnande samma befattning till årets slut. Såsom ett tecken af sin tacksamhet läto hans elever öfver honom prägla en guldmedalj om 40 dukater, och tillställa honom den i tvenne exemplar jemte en äreskänk.

Ännu i ett annat afseende bereddes under tiden för Prof. SEFSTRÖM tillfälle att verka för Bergsvetenskapens befrämjande. Redan år 1820 hade *Bruks-Societeten*, emot ett öfverenskommet arvode, åt honom uppdragit redaktionen af *Jern-*

Kontorets Annaler, och han fortfor med detta bestyr ända till sin död. Annalerna blefvo under hans ledning både högst värderika till sitt innehåll och utvidgade till sitt omfång samt af honom försedda med supplementer. Bruks-Societeten lät med anledning deraf år 1826 tillstålla honom Jern-Kontorets stora medalj i Guld, "såsom ett ytterligare vedermäle af sin tacksamhet." År 1830 blef SEFSTRÖM utnämnd till Riddare af Nordstjerneorden, och år 1836 erhöll han K. Ryska St. Annæ-ordens andra klass.

I början af år 1839 flyttade Prof. SEFSTRÖM till Stockholm och emottog der Bruks-Societetens uppdrag att tillhandagå dess fullmäktige med upplysningar m. m. mot ett årligt arvode af 2000 R:dr Banko. Detta var hufvudsakligen afsedt att bereda honom tillräcklig utkomst för framtiden och fördenskull ämnadt att utgå såsom pension, sedan hans helsa och krafter ej mera tillåto honom att lemna det nämnda biträdet — ett beslut, som både visar värdet af SEFSTRÖMS förtjenster och huru Bruks-Societeten förstod att erkänna dem.

I Mars 1839 blef Prof. SEFSTRÖM i nåder förordnad att förestå *Kongl. Bergs-Collegii Mineral-Kabinett, Laboratorium Chemicum och Bibliothek*, och i April s. å. emottog han Kongl. Maj:ts nådiga förordnande att vara Adjungerad ledamot i *Kongl. Bergs-Collegium*, med rättighet att tjenstgöra så ofta han funne sin helsa och sin tid det medgifva. I denna tjenstgöring fortfor Prof. SEFSTRÖM nitiskt ända till sin död.

I Jan. 1843 blef Prof. SEFSTRÖM utnämnd till ledamot i Direktionen öfver *den nya Elementarskolan*, och i Nov. 1844 förordnad att deltaga i kommittéen för utrönande af tillståndet inom *Teknologiska Institutet*.

Äfven har han varit ledamot i *kommittéen för artilleri-pjesers förbättring*, samt någon kortare tid i styrelsen öfver *Götha kanal och Motala verkstad*.

Utom det stora antal mil, Prof. SEFSTRÖM rest för vetenskapliga ändamål inom fäderneslandet, företog han 1829 och 1830, hufvudsakligen för jernhandteringen, resor i Tyskland och Österrikiska staterna, och har han, som till dessa resor erhöll understöd af Jern-Kontoret, till samma kontor ingifvit en vidlöftig och sakrik beskrifning öfver dem. År 1836 företog han åter en resa i Tyskland och England, hvaröfver äfven beskrifning är ingifven till Jern-Kontoret.

Alltsedan han redan 1817 genomgått en långvarig nerf-feber, var hans helsa mycket svag, och han blef ofta anfallen af svåra sjukdomar. Sjukdomen förmådde dock icke stäcka hans verksamhetslust och han arbetade sålunda mellan dess anfall lika rastlöst, ända till dess han, efter att dagen förut hafva fullgjort sina vanliga värf, om morgonen den 30 November 1845 fanns orörlig och mållös af slag, hvilket tillstånd fortfor tills han samma dag på aftonen slutade sin i så hög grad verksamma och gagnarika lefnad.

Prof. SEFSTRÖM har efterlemnat en sörjande Maka, EMILIE NORDENSTRÖM, dotter af Lagmannen EMANUEL NORDENSTRÖM. Med henne hade han i Sept. 1827 ingått en lycklig förening; deras enda barn, dottren GABRIELA, föddes ej förr än en månad efter fadrens död.

Af följande in- och utländska Akademier och Samsfund var Professor SEFSTRÖM Ledamot: Helsing Landtmanna-sällskap sedan Jan. 1813, Kongl. Vetenskaps-Akademien i Stockholm (i klassen för

fysik och kemi) Apr. 1815, dess præsens Apr. 1840 – Apr. 1841, Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala Febr. 1832, Naturforskande Sällskapet i Heidelberg Aug. 1837, Kongl. Vetenskaps-Akademien i Berlin (i fysiska och matematiska klassen) Mars 1841, Svenska Bergsmanna-Föreningen (Heders-ledamot) Maj s. å., Sällskapet för spridande af nyttiga kunskaper Oct. s. å., Kongl. Landtbruks-Akademien (i hushållnings- och slöjdfördelningen) Nov. s. å., Svenska Fornskrifts-sällskapet Febr. 1844., Kongl. Krigsvetenskaps-Akademien (hvars föredragande i artilleri-afdelningen han blef 1838), Kongl. Patriotiska Sällskapet, Naturhistoriska Föreningen i Dalarne m. fl. Dessutom var han stiftande ledamot af Svenska Litteratur-sällskapet och af Svenska slöjdföreningen.

Prof. SEFSTRÖM var af mer än vanligt stor kroppsbyggnad; hans resliga växt och det manliga allvaret i hans anletsdrag gäfvö åt hela hans väsende uttrycket af en ovanlig kraft och enkelhet. I sednare åren antydde en stark blekhet hans ständiga sjuklighet. Hans porträtt, ritadt af DIEZ och lithografieradt af WOELYLE, är temligen troget i detaljerna, men man saknar uttrycket i det hela: detsamma måste sägas om hans bild på ofvan omtalade medalj. Hans karakter var öppen och redlig, hans umgänge vänligt och i hög grad lärorikt. Han skydde icke mödan: han älskade henne tvertom, och hvarken sjukdom eller trötthet kunde besegra den ihärdighet, med hvilken han fullföljde ett påbegynt arbete. Trofast mot sina vänner, uttalade han mot dem, som icke delade hans åsikter, sin tanke utan skoning, någon gång med stränghet. Detta drag i hans karakter, hvarigenom han ofta ådrog sig ovänskap,

kom hufvudsakligen af den öppenhet, som låg i botten på hans väsende, och som med ett äkta fornnordiskt sinnelag kom honom att ej sky något eller någon, då han skulle uttala hvad han fann vara orätt. Hårtill kom under sednare åren en viss retlighet i lynnet, som utan tvifvel var en följd af hans sjuklighet.

Bland hans utmärkande egenskaper var den oegennyttia, med hvilken han för enskilt och allmänt gagn uppoffrade alla sina krafter. Städsse färdig att med upplysningar och råd i de mest olikartade ämnen bistå hvem som helst, som deraf var i behof, företog han ofta, när något nyttigt var i fråga, för andras skull betydliga arbeten, lika beredd att för dem, som för sina egna forskningar, uppoffra tid, penningar och helsa.

Såsom *Lärare* var han outtröttlig och omfattade sina elever med den mest oinskränkta välvilja; han förvärfvade sig ock af de flesta bland dem en outplånlig tillgifvenhet. En stor del af Svenska bergshandteringens nuvarande ledare och idkare hafva honom att tacka för sin bildning till detta yrke, och han har i den vetenskapliga anda han hos dem väckt, lemnat fäderneslandet ett dyrbart arf.

Men den *Svenska Bergshandteringens* förbindelse till Prof. SEFSTRÖM består icke blott deri, att han danat de flesta af dem, som nu arbeta för dess förkofran; han har äfven sjelf gifvit den en ny riktning, nemligen den vetenskapliga, och sålunda i Sverige tändt en bergsmannafackla, som aldrig skall slockna. Det vetenskapliga i bergshandteringen var det ock, som han vanligen, mot dem som derifrån ville afvika, måste försvara och någon gång försvarade med en så skarp penna, att han derigenom gjorde sig fiender. Genom

sina *slaggförsök*, anställda vid Bergsskolan åren 1826 och 1827, lade han grunden till en rationel behandling af både masmästeri och smide, och de afhandlingar i dessa ämnen han inlemnade till Kongl. Bergs-Kollegium torde vara det mest vetenskapliga, som i denna väg finnes. Hans praktiska method att *pröfva jern- och koppar-malmer* är otvifvelaktigt den mest ändamålsenliga. Den *Sefströmska Ässjan*, af honom inrättad förnämligast till jernprofvens anställande, har blifvit allmänt antagen, och kallas ofta af Tyskarne *das Teufelsfeuer*, i anledning af den starka hetta, som derigenom åstadkommes. SEFSTRÖMS *Rostugn* torde ock förtjena att här ihågkommas, såsom utan tvifvel den, hvilken är konstruerad på de mest vetenskapliga principer — flera andra förbättringar att förtiga.

Prof. SEFSTRÖM ansågs i sednare tider vara den, som ville motverka nya försök och införandet af förbättringar i den Svenska jernhandteringen; men de som hyst denna föreställning, hafva helt och hållet missförstått honom. Ingen kunde varmare än han arbeta för uppfinning af nya metoder eller förbättringar af de gamla; men han ville att dessa metoder skulle vara afpassade efter våra behof. Han bestridde aldrig t. ex. *puddlingsjernets* egenskap af *jemnhet*, men han ansåg att det, såsom tillkommet genom en *vällnings- eller sammanhäftnings-process*, aldrig kunde få samma *täthet* som vårt efter gamla metoden tillverkade jern. Han ville att vi af våra goda malmer med trädkol borde fortfarande tillverka sådant jern, som Engelsmännen icke kunna åstadkomma af sina orena malmer med stenkol, och att vi borde söka förbättra våra egna, eller uppfinna andra metoder, men icke införa så-

dana som försämrade vårt jerns kända godhet. Han föreslog ock sjelf en ny tillverkningsmetod, ehuru den icke hann under hans lifstid utföras (se Jern-Kont. Ann. för år 1825 sidd. 193—195, för år 1832 sidd. 408—413, samt för år 1842 sidd. 384—386). I afseende å det tekniska i Svenska Bergshandteringen egde han en böjelse för konservatism, som naturligen foljde af hans stora erfarenhet, i det han ofta förutsåg följder, om hvilka den mindre erfarne icke hade någon aning. I statsekonomiskt afseende höll han den äldre lagstiftningens grundsatser för vår Svenska bergshandtering lämpligare, än de till större frihet syftande stadganden, som i sednare tider gjort sig gällande.

Såsom *Kemist* har Prof. SEFSTRÖM äfven förvärfvat sig ett aktadt namn. Härtill hafva bland annat hans undersökningar för att bestämma *Quick-silfrets* atomvigt, hans undersökning om *Graft*, som han visade vara blott kol, äfvensom upptäckten af *Vanadium*, en metall som han fann i stångjern från Taberg i Småland, hufvudsakligen bidragit.

Slutligen har Prof. SEFSTRÖM äfven inom *Geologien* gjort en af de vackraste upptäckter, i det han fann, att de *Refflor*, hvaraf våra berg i allmänhet äro färade, hafva en bestämd riktning, hvilken han undersökte, och hvilken gaf honom anledning att förklara refflornas sannolika uppkomst från en forntida flod.

Prof. SEFSTRÖM har från trycket utgifvit följande skrifter: *Jernkontorets Annaler*, från och med 1820 (5:te årgången) till och med 1845, således för ett fjerdedels sekël, äro, såsom redan nämnt, af honom redigerade. Af dessa värderika Annaler har

har Prof. SEFSTRÖM själf författat en icke obetydlig del. Det skulle blifva för vidlyftigt att här uppräknat de många afhandlingar deri, som äro af hans egen hand; dock kan man icke underlåta att särskilt nämna: hans årliga berättelser om göromålen vid Bergsskolan i Fablun (särdeles den om ofvannämde slaggförsök i Annal. för åren 1828 och 1829), hans "Försök till en elementär framställning af läran om vattendrifter, deras beräkning och fördelaktiga användande," samt "Om Geodetiska instrumenters beskaffenhet och justering."

I *Kongl. Vetenskaps-Akademiens Handlingar* har Prof. SEFSTRÖM låtit införa följande afhandlingar:

1) Om Vanadium, en ny metall, funnen uti stångjern, som är tillverkad af malm från Taberget i Småland (V. A. H. 1830).

2) Undersökning af de Refflor, hvaraf Skandaviens berg äro med bestämd riktning fårade, samt om deras uppkomst (V. A. H. 1836).

3) Om ett sätt att vid barometer-observationer göra sig oberoende af ofullkomligheten uti barometerns vacuum (V. A. H. 1841, prisbelönt).

I *Öfversigten af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar* finnes, i 2:dra årg. 1845, ett anförande af Prof. SEFSTRÖM, innehållande några resultater af hans undersökningar om Magnetnålens missvisning i åtskilliga orter i Sverige.

I *Läsning för Folket* finnes, i 8:de årgången, af Prof. SEFSTRÖM en uppsats under titel: "Om sättet att refva jord i Dalarne."

Följande efterlemnade arbeten af Prof. SEFSTRÖM äro efter hans fränfälle utgifna:


"Om det i nyare tider antagna uppfostrings- och undervisnings-sättet och dess inflytande på


samhälsskicket." Tal vid Presidii nedläggande i Kongl. Vetenskaps-Akademien den 7 April 1841.


"Åsichter i frågan om fri kolhandel och skogshushållning i Sverige." Anförande till Kongl. Bergs-Kollegii Protokoll.

Då man känner huru vacklande Prof. SEFSTRÖMS helse var, åtminstone de sednare 30 åren af hans lefnad, kan man icke annat än beundra det myckna han uträttat, och än mer hans ovanligt vidsträckta och mångsidiga kunskapsförråd, hvarom man först får ett begrepp, då man ser de massor af strödda anteckningar, som han efterlemnadt i en mängd ämnen. Och då man vet hvilka ytterst knappa inkomster han hade under de första åren af sin bana, och huru dessa äfven de sednare åren ingalunda öfverstego hvad ett hushåll för sin tarfliga utkomst behöfver, måste man förvånas öfver de betydliga uppoffringar han gjort för anskaffandet af böcker, instrumenter o. m. d. för sin vetenskap, äfvensom vörda den patriotism, som förmådde honom att afslå de från främmande länder gjorda mycket fördelaktiga anbud, och i stället de sednaste 6 åren af sin lefnad tjenstgöra i Kongl. Bergs-Kollegium utan allt arfvode. Hans oegennyttia och hans uteslutande verksamhet för allmänt gagneliga föremål gick så långt, att han försummade sina ekonomiska fördelar, hvilket äfven ofördelaktigt inverkade på hans makas framtida utkomst. Den lilla förmögenhet hon egt, hade han den olyckan att i en konkurs förlora.


Men hvad en stark vilja och ett rent uppsåt förmå, det ser man i Prof. SEFSTRÖMS exempel. I detta afseende skall hans efterdöme länge blifva en ledning för Svenska vetenskapsmän, lika visst som hans minne skall oförgängligt lefva hos Svenska Bergshandteringens idkare.











INNEHÅLL.

	Sid.
<i>Om Indianstammarna i Plata och Oriental-Republikerna jemte beskrifning och ritning af en till Sverige hemförd individ af Puelchesstammen, af J. TARRAS</i>	1.
<i>Nya Svenska Homoptera, af C. H. BOHEMAN. Försök till bestämmande af chromens atomvigt, af N. J. BERLIN</i>	21. 65.
<i>Om betydelsen af tecknen x^y $\text{Log}_b(x)$, $\text{Sin } x$, $\text{Ces } x$, $\text{Arcsin } x$, $\text{Arccos } x$, i Analytisk matematik, af E. G. BJÖRLING</i>	75.
<i>Angående Svenska Tabellverket, och om folkmängden m. m. i Riket under de ifrån 1815 sistförflutne 25 åren, af J. A. LEYONMARCK</i>	157.
Af trycket utgifna Qvinquennii- och årsberättelser sedan år 1815	sid. 161.
Tabellformulärernes beskaffenhet och i dem vidtagna ändringar	165, 207.
Cirkulär med dithörande förklaringar och föreskrifter	sid. 178.
Kontroll å inkommande Tabeller, i hvad mån den är möjlig	" 179.
Folkmängdens tillväxt ifrån år 1790, under hvardera 25-åriga perioden särskildt.	" 187.
Jemförelse emellan folkmängdens förhållande åren 1815 och 1840:	
Till gifta eller ogifta efter stånd och klasser (Tab. N:o 2)	" 195.
— olikhet i åldern	" 210.
— yrken och näringar	" 197.
— antal särskildt i städerna (Tab. N:o 4).	" 211.
Förhållandet emellan den närande och tärande folknummern året 1840	" 218.
Hushållens antal i riket	" 220.

Under åren 1816 med 1840:	
Antalet ingångna äktenskap	sid. 226.
Barnaföderskor	„ 229.
Nativiteten	„ 230.
Dödfödda	„ 232.
Mortaliteten	„ 234.
Vaccinationens framsteg	225, 238.
Olyckshändelser	sid. 239.
Resumée af denna berättelse	„ 241.
Om Svenska Tabellverkets organisation „	242.
Statsverkets påkostnader sedan år 1802, då det första gången erhöll egen stat „	249.
Hindren för det närvarande för dess vi- dare fullkomnande	„ 259.
<i>Methodisk öfversigt af Idislande djuren, Linnés</i>	
<i>Pecora, af C. J. SUNDEVALL</i>	265.
<i>Åsigter rörande den organiska sammansättnin- gen, af J. BERZELIUS</i>	331.
<i>Undersökning om Elektricitet i fördeladt och bun- det tillstånd, af P. S. MÜNCK AF ROSEN- SCHÖLD</i>	361.
<i>Fyra nya arter af Sötvattens-Crustacéer från Södra Afrika, af S. LOVÉN</i>	427.
<i>Ornithologiska iakttagelser under en resa i Ume, Pite och Lule Lappmarker, sommaren 1845, af C. G. LÖWENHJELM</i>	441.
<i>Biografi öfver Professoren N. G. SEFSTRÖM</i>	459.

— — —

FÖRTECKNING

på Författarne till de i 1845 års Hand-
lingar införda afhandlingar.

BERLIN, N. J., Försök till bestämmande af chromens atomvigt	sid. 65.
BERZELIUS, JAC., Åsigter rörande den organiska sammansättningen	„ 331.
BJÖRLING, E. G., Om betydelsen af tecknen x^y , $\text{Log}_b(x)$, $\text{Sin } x$, $\text{Cos } x$, $\text{Arcsin } x$, $\text{Arccos } x$, i Analytisk matematik	„ 75.
BOHEMAN, C. H., Nya Svenska Homoptera	„ 21.
LEVONMARCK, J. A., Angående Svenska Tabellverket, och om Folkmängden i Riket under de ifrån 1815 sistförflutne 25 åren	„ 157.
LOVÉN, S., Fyra nya arter af Sötvattens-Crustacéer från Södra Afrika	„ 427.
LÖWENHJELM, C. G., Ornithologiska iakttagelser under en resa i Ume, Pite och Lule Lappmarker, sommaren 1845	„ 441.
ROSENSCHÖLD, P. S. MUNCK AF, Undersökning om Elektricitet i fördeladt och bundet tillstånd	„ 361.
SUNDEVALL, C. J., Methodisk öfversigt af idislande djuren, Linnés Pecora	„ 265.
TARRAS, J., Om Indianstammarne i Plata och Oriental-Republikerna jemte beskrifning och ritning af en till Sverige hemförd individ af Puelches-stammen	„ 1.

Rättelser:

Pag. 242, rad. 18 *står:* som 100 till 16 *läs:* som 16 till 100

„ — „ 19 „ som 100 till 28 „ som 28 till 100

15

